



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

ReDormin®

Филмирани таблетки

Билков лекарствен продукт

Какво представлява ReDormin® и как се употребява ?

ReDormin® съдържа стандартизирани екстракти от валерианов корен и хмел. Стандартизирането гарантира постоянно качество на този билков лекарствен продукт.

Двете утвърдени лекарствени растения валериановия корен и хмелът се допълват взаимно. Те имат сънотворен ефект и позволяват спокоен сън посредством меко успокояващо действие. Следователно ReDormin® е подходящ за прилагане при следните оплаквания: трудно заспиване, недостатъчно продължителен и неспокоен сън.

Какво друго трябва да се съблюдава ?

В случаи на проблеми със съня трябва да се избягва консумацията на стимулиращи напитки (кафе, черен чай), никотин и обилна храна вечер. Да се привикне към редовен ритъм на спане. Заспиването се подпомага с кратка разходка на свеж въздух, успокояваща баня или четене на книга в спокойна обстановка. Трябва да се има предвид, че продължителността на съня, от който се нуждае едно лице показва индивидуални различия и намалява с възрастта.

Ако вашите проблеми със съня продължават по-вече от един месец, би трябвало да се консултирате с вашия лекар.

Кога не трябва да се взема ReDormin®

Таблетите не трябва да се вземат в случаи на свръхчувствителност към валериан, хмел или някоя от помощните съставки в таблетите.

ReDormin® не трябва да се използва при болни с тежка бъбречна недостатъчност, с нарушена чернодробна функция поради липса на съответни клинични данни.

ReDormin® не трябва да се прилага при деца под 12 години.

Кога ReDormin® трябва да се употребява с предпазливост?

ReDormin® потенцира действието на алкохола и други седативни продукти. Съдържащите се в ReDormin® хидрогенирано рициново масло и макрогол могат да предизвикат гадене, повръщане, колики, със силно слабително действие (при високи дози), диария. ReDormin® не трябва да се прилага при чревна непроходимост.

Може ли ReDormin® да се взема по време на бременност и кърмене?

Няма данни за употреба на ReDormin® таблетки по време на бременност и кърмене. ReDormin® таблетки биха могли да бъдат използвани по време на бременност или кърмене само под лекарско наблюдение.

Оказва ли влияние ReDormin® върху способността за шофиране и работа с машини?

Вземането на ReDormin® таблетки непосредствено преди шофиране или свързана с риск работа с машини не се препоръчва.

Как да вземате ReDormin®?

Възрастните вземат две таблетки с малко течност преди лягане. Децата на възраст над 12 години вземат половин доза, т.е. една таблетка. Придържайте се към дозировката, която е посочена на опаковката или предписана от лекаря. Ако имате впечатление, че лекарството е твърде слабо или твърде силно, консултирайте се с вашия лекар.

Какви нежелани лекарствени реакции може да предизвика ReDormin®?

Много рядко може да се наблюдават прояви на свръхчувствителност, респ. кожни реакции и непоносимост към миризмата на валериан.

Какво друго трябва да се съблюдава?

ReDormin® трябва да се пази от влага и топлина. Лекарството не трябва да се използва след изтичане на срока на годност, посочен на опаковката. Да се съхранява на недостъпно за деца място. Допълнителна информация ще получите от вашият лекар или аптекар.

Какво съдържа ReDormin®?

1 таблета съдържа :

Valerianae radices extractum siccum 250mg (methanol 45% (4-6 : 1)

Lupuli strobili extractum siccum 60mg (methanol 45% (5-7:1)

Помощни вещества: оцветител (Е 132); ванилова есенция; силициев диоксид, колоидален; хидрогенирано Рициново масло; хипромелоза; макрогол 400, 6000, 20000; магнезиев стеарат; микрокристална целулоза; пропиленгликол; титаниев диоксид (Е 171); соеви полизахариди.

Къде може да се намери ReDormin®?

Какви опаковки се намират?

Без лекарско предписание.

Опаковки съдържащи 20 и 60 таблетки.

Производител и дистрибутор

Max Zeller Sohne AG,
Seeblickstraasse
CH-8590 Romanshorn
Switzerland

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

Ewopharma AG
Vordergasse 43
CH-8200 Schaffhausen
Switzerland

Дата на (частична) актуализация на текста

Септември 1996 г.