



## Информация за пациента

### **DERMOCORT cream 0,1 %** **ДЕРМОКОРТ крем 0,1 %**

#### **СЪСТАВ**

**Лекарствено вещество:** Betamethasone valerate 1,22 mg в 1 g крем екв. на Betamethasone 1,00 mg.

**Помощни вещества:** пропиленгликол, бутилхидроксианизол, глицерил стеарат, ПЕГ 100 стеарат, цетилов алкохол, течен парафин, натриев дехидроген фосфат, фосфорна киселина, лимонена киселина, динатриев едетат, натриев бензоат, пречистена вода.

#### **ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА**

Крем по 15 g в туби.

#### **ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА** **НИХФИ АД**

София 1797, бул. "Кл. Охридски" 3

#### **ДЕЙСТВИЕ**

Дермокорт крем е лекарствен продукт, съдържащ кортикостероид с противовъзпалително, противосърбежно и съдосвиващо действие. При прилагане върху кожата потиска освобождаването на вещества, които причиняват възпалението.

#### **ПОКАЗАНИЯ**

Дермокорт крем е показан за лечение на кортикостероид-чувствителни дерматози: екзема, включително атопична, ювенилна и дискоиден тип; пруриго; псориазис, с изключение на генерализирана форма; невродерматози, включително обикновен лишей и плосък лишей; себореен дерматит; контактни дерматози; автоимунни заболявания на кожата; към системната терапия от кортикостероиди при генерализирана еритродермия; реакции на повишено дразнене, на мястото на ухапване от насекоми; реакции на зачервяване на кожата на места с повишена влажност.



## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Розацеа, акне, кожна туберкулоза; кожни прояви на сифилис; кожни реакции след ваксиниране; първични кожни изменения на бактериална, вирусна и гъбична основа, паразитози; повишена чувствителност към лекарственото вещество или към други кортикостероиди, както и към някои от помощните съставки на крема.

Продуктът да не се прилага върху клепачите поради риск от глаукома.

## **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

Дермокорт крем се прилага само по лекарско предписание! Предназначен е за външно приложение върху кожата! Да се пази от контакт с очите (възможно е да предизвика повишено вътреочно налягане и очно дразнене)!

Дълготрайното прилагане на крема под превръзка да бъде под лекарско наблюдение! В случай, че не се наблюдава подобрене след двуседмично лечение с Дермокорт, обърнете се към Вашия лекуващ лекар!

Деца са по-чувствителни от възрастните при лечение с кортикостероиди и рискът от нежелани лекарствени реакции при тях е по-голям. При деца да се избягва продължително лечение с крема и да се прилага само при строги показания за кратък период от време!

Моля, съобщавайте на лекаря за всяка нежелана кожна реакция по време на лечение с Дермокорт крем!

Кремът съдържа бутилиран хидроксианизол, който има дразнещ ефект върху очите, кожата и лигавиците. Бензоатите са слаби дразнителни на кожата, очите и лигавиците. Те могат да повишат риска от жълтеница при новородени.

## **Употреба при бременност и кърмене**

По време на бременност Дермокорт крем се назначава при строги показания. При кърмещи майки продуктът се прилага само по строго предписание от лекаря и за кратък период от време.

## **Влияние върху способността за шофиране и работа с машини**

Няма данни за повлияване на активното внимание и реакциите.

## **ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Няма данни за лекарствени и други взаимодействия при прилагане на Дермокорт крем. Съобщавайте своевременно на Вашия лекар за всички лекарства, които използвате.



## **ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА**

Дермокорт крем се използва предимно при влажни или мокрещи екзематозни лезии.

Начинът на приложение и продължителността на лечение се определят от лекуващия лекар. Ако не е предписано друго приложение, тогава засегнатият участък се намазва 2-3 пъти дневно. Кремът се нанася с леко разтриване върху кожата. При липса на подобрение до 2 седмици се консултирайте с лекуващия лекар!

При някои кожни заболявания Дермокорт може да се прилага с превръзка, която се сменя на 24-72 часа, но само по преценка на лекаря и под негово наблюдение. След преминаване на обективните изменения Дермокорт се прилага еднократно още няколко дни.

Препоръчаната доза за приложението на Дермокорт крем при деца е подобна на този за възрастни. При деца под 1 година се препоръчва приложение на по-ниска доза – 1 път дневно, не повече от 5 дни. Дермокорт не се препоръчва за приложение при кърмачета.

## **НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

Най-честите кожни нежелани лекарствени реакции са: чувство на парене и сърбеж. По-рядко се срещат повишена сухота на кожата, променена чувствителност, акне, косопад и възпаление на очната лигавица. При прилагане на Дермокорт под превръзка се наблюдават: усилване на симптомите на дразнене и възпаление, сухота, фоликулити, акнеподобни изменения, намалена пигментация на кожата, дерматити около устата, алергични контактни дерматити, вторични инфекции, изтъняване на кожата (кожна атрофия), стрии и разпръснати мехурчета по кожата.

Деца са подложени на по-голям риск от възрастните от потискане на хипоталамо-хипофизарно-надбъбречната система и Къшинг синдром, когато се третират с локални кортикостероиди. При тях е по-голям рискът от надбъбречна недостатъчност по време и/или след прекъсване на лечението. Неправилната употреба на локални кортикостероиди при деца може да доведе до образуването на стрии.

Недостатъчност на хипоталамо-хипофизарно-надбъбречната система, Къшинг синдром, забавяне на растежа на височина, забавяне на натрупването на маса, повишено вътречерепно налягане са наблюдавани при деца, получаващи локални кортикостероиди за лечение.



Продължителната употреба на кортикостероиди при децата може да смути растежа и развитието на детето.

### **СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

### **СРОК НА ГОДНОСТ**

3 години

Да не се прилага след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката!

Последна редакция на листовката: 01.2003 год.

