



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Prefemin® таблетки

Префемин

Билков лекарствен продукт

Състав

Лекарствено вещество:

Една таблетка съдържа: Agni casti, fructus extractum siccum 40mg
(Agni casti dry extract, contains 20 mg of native extract) (3-6:1)

Сух екстракт от плодове на Аврамово дърво

Екстрахиращ разтворител: алкохол 60% (m/m)

Помощните вещества: лактоза; силициев диоксид, колоиден; хипромелоза; макрогол 400; макрогол 20'000; магнезиев стеарат; микрокристална целулоза; пропилен гликол; титаниев диоксид (E-171).

Лекарствена форма

Таблетка филмирана.

В блистери/опаковки по 1x30 и 3x30 (90) таблетки.

Производител

Max Zeller Söhne AG,
Seeblickstrasse 4,
CH-8590 Romanshorn,
Switzerland

Притежател на разрешението за употреба

Ewopharma AG
Vordergasse 43
CH-8200 Schaffhausen
Switzerland

Фармакотерапевтична група

АТС код: G02CX



Показания

Prefemin® е показан за лечение на симптомите, които започват до две седмици преди менструацията и изчезват със започване на кървенето. Тези симптоми се характеризират с физически и психически оплаквания като главоболие, кожни проблеми, слабо усещане на напрежение в гърдите, коремен дискомфорт, променливо настроение, раздразнителност, нервно напрежение, депресивни състояния, уморяемост и проблеми със съня, които затрудняват ежедневната активност.

Prefemin® може да бъде използван от жени, които вземат хормонални противозачатъчни таблетки и страдат от пременструален дискомфорт. Prefemin® е подходящ за диабетици.

Дозировка и начин на употреба

Вземайте една таблетка Prefemin® дневно (също и в дните без симптоми). За предпочитане е таблетката да се взема с малко вода по едно и също време на деня, напр. сутрин след ставане или преди сън независимо от приема на храна. Препоръчва се лечението да продължи най-малко три месеца.

Придържайте се към дозировката определена в листовката или предписана от лекаря. Ако имате впечатление, че лекарството е твърде слабо или твърде силно консултирайте се с вашия лекар или аптекар.

Противопоказания

Пациенти със свръхчувствителност към някоя от съставките или плодовете на дървото на Аврам не трябва да приемат Prefemin®! Уведомете вашия лекар или аптекар, ако имате лекарствена, битова или професионална алергия или ако тези оплаквания са лекувани с други лекарства.

Prefemin® не трябва да се използва при болни с тежка бъбречна недостатъчност, с нарушена чернодробна функция, хипофизарни тумори, карцином на млечната жлеза поради липса на клинични данни.

Специални предпазни мерки при употреба

При напрегнатост, усещане за набъбване на гърдите и при смущения в менструалното кървене, трябва първо да се консултирате с лекар и да се направят съответните изследвания за уточняване на диагнозата.



Този лекарствен продукт съдържа 40 mg лактоза и е неподходящ при хора с лактазна недостатъчност, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция(нарушено усвояване на глюкозата и галактозата в червата).

Лекарствени взаимодействия

При едновременен прием на Prefemin® с антагонисти на допаминовите рецептори може да настъпи взаимно намаляване на ефекта.

Бременност и кърмене

Няма нужда да се взема Prefemin® по време на бременност, защото при липса на менструация не се наблюдават пременструални симптоми. Няма данни за употреба на Prefemin® по време на кърмене и поради това не трябва да се употребява в този период.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са наблюдавани такива ефекти при употреба на обичайната дозировка.

Нежелани лекарствени реакции

Не са наблюдавани сериозни нежелани лекарствени реакции от Prefemin®, когато е използван в съответствие с указанията.

Ако се появят кожен обрив или сърбеж, лечението трябва да бъде преустановено и да се потърси консултация с лекар.

В единични случаи в началото на лечението с Prefemin® някои отделни симптоми от пременструалния синдром може временно да се засилят. Ако няма подобрение или симптомите се влошат, консултирайте се с лекар.

Предозиране

Симптоми на предозиране не са наблюдавани.

Условия за съхранение

Prefemin® трябва да се съхранява под 25°C.

Да се пази от влага и светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!



Срок на годност

3 години

Да не се употребява след датата на изтичане срока на годност, посочен върху опаковката.

Дата на (частична) актуализация на текста

Май 1999 г

