



**INBIOTECH**  
BULGARIA

BIOCARDIN tabl. coat. 25 mg

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА *05.12.2017*

**І.В.ІІ. ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА НА  
ПРОДУКТА**



BIOCARDIN tabl. coat. 25 mg

## Информационна листовка за пациента

### Biocardin/Биокардин

Тази листовка Ви предоставя полезна информация за Вашето лекарство. Прочетете внимателно листовката, преди да започнете лечението.

Пазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново;  
Ако имате въпроси, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт;  
Това лекарство е изписано лично на Вас и никога не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, дори ако симптомите им са същите като Вашите.

#### Какво представлява Biocardin – обвити таблетки

Biocardin съдържа лекарственото вещество Dipyridamole – 25 mg. в една обвита таблетка.

Съдържа и следните неактивни (помощни) вещества: млечна захар, микрокристална целулоза, царевично нишесте, магнезиев стеарат, захар, колоиден силициев двуокис, талк, титанов двуокис, оцветители (E122, E124 и E110) и др.

#### Как действа Biocardin

Biocardin променя способността на така наречените “кръвни плочици”, които нормално са отговорни за съсирването на кръвта, например при нараняване. При различни заболявания или след операции те могат да доведат до съсирване на кръвта и образуване на съсиреци. Biocardin противодейства на образуването на такива съсиреци.

#### За какво се използва Biocardin

Профилактика на тромбоемболични усложнения, самостоятелно или в комбинация с аспирин при исхемична болест на сърцето; при мозъчно-съдова болест за намаляване риска от инсулт; след сърдечни операции - аорто-коронарен байпас.

**INBIOTECH**  
BULGARIA**BIOCARDIN tabl. coat. 25 mg**

**Притежател на разрешението за употреба и производител**

**Притежател на разрешението за употреба:**

INBIOTECH Bulgaria, София 1000, ул. Триадица N 5-A

**Производител:**

INBIOTECH Bulgaria, София 1000, ул. Триадица N 5-A  
Pharma-AD, Дупница, ул. Неофит Рилски №13

**Преди да приемете Biocardin**

Вие можете да започнете да приемате Biocardin само след консултация с лекар.

**Не трябва да приемате Biocardin, ако:**

- Имате свръхчувствителност към дипиридабол и/или сте проявили някаква необичайна или алергична реакция към някоя от неактивните съставки на таблетките;
- Имате доказана тежка генерализирана склероза;
- Имате инфаркт на миокарда в остър стадий;
- При деца под 12 години;

**Информирайте Вашия лекар преди да започнете да приемате Biocardin**  
**ако:**

- Имате установено заболяване на сърцето – стенокардия;
- Имате установено стеснение на аортата;
- Скоро сте прекарвали инфаркт на миокарда;
- Имате установена високо-степенна сърдечна недостатъчност;
- Имате установена myasthenia gravis (парализа на напречно-набраздената мускулатура);
- Имате увреждане на кръвообръщението на сърцето;
- Имате много ниско кръвно налягане;
- Вие сте бременна или имате основателни причини да считате, че сте забременели, или ако кърмите, тъй като лекарството преминава в кърмата;
- Имате сериозно заболяване, свързано с кръвене (хемофилия) или повишена склонност към кръвене;



**INBIOTECH**  
BULGARIA

**BIOCARDIN tabl. coat. 25 mg**

- Планирайте манипулация, която може да се отрази върху склонността Ви към кървене – напр. амбулаторна операция, изваждане на зъб и др..

**Лекарства или вещества, които могат да се отразят на действието на Biocardin**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт за всички лекарства, които планирате да приемете по време на приемането на Biocardin. Може да се наложи да промените дозировката или дори да спрете някои от лекарствата.

- Biocardin може да усилва съдоразширяващия ефект на аденозин, да повиши неговата токсичност, което да се прояви с повръщане, понижаване на кръвното налягане. Може да усилва ефекта на аценокумарол, ацетилсалицилова киселина и хепарин;
- Biocardin не трябва да се употребява едновременно с нестероидни противовъзпалителни средства като: ибупрофен, напроксен, кетопрофен, индометацин, пироксикам, поради увеличаване на риска от кървене от стомаха;
- Не трябва да се употребява едновременно с някои антибиотици: cefamandole, carbenicillin (карбокиспеницилини), cefoperazone;
- Едновременното приложение на Biocardin с теофилин, аминофилин или кофеин, може да отслаби неговия ефект.
- Не трябва да се употребява едновременно с депакин и други производни на валпроената киселина, поради увеличаване на риска от кървене.
- Високи дози dipyridamole повишават токсичността на метотрексат.
- Dipyridamole повишава излъчването на флуороурацил през бъбреците и понижава плазмените му нива.

**Как правилно да се приема Biocardin**

Обвитите таблетки се приемат с малко количество вода 1 час преди или 2 часа след хранене. Дозировката и продължителността на лечението с Biocardin се определя от Вашия лекар.

**Каква е обичайната доза**

Препоръчваната доза за възрастни като профилактично антиагрегантно средство е 3-4 обвити таблетки (75-100 mg), 3 пъти дневно, приеман перорално 1 час преди или 2 часа след хранене с малко вода.



**INBIOTECH**  
BULGARIA

**BIOCARDIN tabl. coat. 25 mg**

При деца над 12 години дозата се определя от лекар. При комбинирано приложение с аспирин в доза до 325 mg дневно, dipyridamole се прилага в доза 2 обвити таблетки (50 mg) 3 пъти дневно. Тази терапия може да продължи много дълго.

**Какво е необходимо да направите, ако пропуснете да приемете една доза**

Ако сте пропуснали да приемете една доза, вземете я веднага щом си спомните. Ако остават около 4 часа до приемането на следващата доза, пропуснете забравената и продължете по предписаната Ви схема. Не приемайте двойно по-голяма доза.

**Какво трябва да направите при предозиране**

- Незабавно информирайте Вашия лекар или потърсете спешна помощ;
- Незабавно трябва да се преустанови приемането на Biocardin,
- Проявите на интоксикация са резултат на изразената хипотония (спад на кръвното налягане). Възможно е да се появи загуба на равновесие, повръщане, неясен говор, диария, понижена двигателна активност.


**Какви са възможните нежелани реакции на Biocardin**

- Прекратете приема на това лекарство и потърсете спешна медицинска помощ ако почувствате проява на алергична реакция (затруднено дишане, отток на устните, езика или лицето; поява на обриви);
- По-често срещани могат да бъдат леки нежелани реакции: унесеност, стомашен дискомфорт, гадене или повръщане, диария, главоболие, обриви. Продължете приема на лекарството, но обезателно се свържете с Вашия лекар;
- Могат да се появят и други нежелани реакции, различни от посочените. Те могат постепенно да изчезнат с времето, тъй като Вашият организъм свиква с приема на лекарството. Независимо от това, информирайте Вашия лекар, ако те продължат и Ви притесняват.

**Друга информация**

**Условия на съхранение**

- Да се съхранява при температура под 25 ° C
- Да се пази от светлина и влага
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

 <b>INBIOTECH</b> BULGARIA	<b>BIOCARDIN tabl. coat. 25 mg</b>
--	------------------------------------

### Срок на годност

- 4 години от датата на производство;
- Да не се употребява след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.

### Опаковка

Първична опаковка: блистер от PVC/алуминиево фолио по 30 обвити таблетки.  
Вторична опаковка: картонена кутия, съдържаща един, два, шест или четиридесет блистера, заедно с листовка за пациента.

### От кого да получите допълнителна информация

Ако имате каквито и да е други въпроси относно Вашето лекарство, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

**Последна редакция на листовката**  
28 октомври 2002