

Traumaplant Траумаплант

Състав

100g Traumaplant крем съдържа:



Лекарствено вещество:

**Symphyti herbae recens succus liquidum(2-3:1),
extr. solvent Ethanol 30 % 10,0g**
(Symphytum concentrate ex Herba Symphyti recente 25,0g)

Помощни вещества:

макрогол-20-глицерол моностеарат; глицерол моностеарат;
октилдодеканол; изопропил миристат; диметикон; пропилен
гликол; розмариново масло; сорбинова киселина; лимонена
киселина, безводна; α -токоферол ацетат; 2-хидроксиетил
салицилат; пречистена вода до 100,00 g

Лекарствена форма и съдържание:

Крем в алуминиеви туби със съдържание:

50,00 g

100,00 g

Производител:

Gehrlicher Pharmazeutische Extracte GmbH
Robert-Koch-Str.5
D-82547 Eurasburg/ Obb
Germany

Притежател на разрешението за употреба



HARRAS PHARMA CURARINA ARZNEIMITTEL GmbH
Am Harras 15
D-81373 München
Germany

Фармакологично действие

Комплексът от лекарствени вещества в Траумаплант крем се добива от пресните надземни части на

Symphytum uplandicum Nyma (Boraginaceae) - Чер Оман
Посредством изключително прецизен процес, от прясно получен (чрез пресоване) растителен сок се изолира комплекс с висока концентрация на фармакологично активни вещества.

Холин, розмаринова киселина и алантоин са съставките осигуряващи противовъзпалителен, антиексудативен и ранозаздравяващ ефект.

Холинът предизвиква вазодилатация, посредством парасимпатиковите нервни окончания и по този начин подобрява перфузията на възпалената тъкан. Възпалителните ексудати и метаболитни продукти се отстраняват.

Розмариновата киселина има противовъзпалителен ефект.

Алантоинът стимулира клетъчната пролиферация и спомага за регенерацията на увредената тъкан. и ускоряване зарастването на раните.

Показания

Контузии ; навяхвания (спортни травми и травми при злополуки) ; ставни и мускулни болки ; трудно заздравяващи рани.

Противопоказания

Не се прилага при свръхчувствителност към лекарственото вещество или към някоя от съставките на продукта

Лекарствени и други взаимодействия

Няма данни за взаимодействие с други лекарства.

Специални предупреждения за употреба

В случай,че симптомите продължат или се задълбочат след 7- мия ден от приложението , пациентът трябва да потърси консултация с лекар.

Бременност и кърмене

Няма ограничения по отношение приложението на продукта в периода на бременността и кърменето.

. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма данни за промяна в способността за шофиране и работа с машини.

Режим на отпускане

Без лекарско предписание

Дозировка и начин на употреба

За прилагане върху кожата:

Ако не е назначено друго лечение, един или няколко пъти дневно върху кожата се нанасят от 3-10 cm от крема, в зависимост от големината на засегнатия участък.

Времето между отделните приложения може да бъде най-малко 4-5 часа.

Кремът е особено подходящ при използване на оклузивни превръзки.

Продължителност на употреба

2 до 3 седмици

Нежелани лекарствени реакции

В редки случаи е възможна появата на еритема (зачервяване на кожата), особено при пациенти с изключително чувствителна кожа или склонност към алергични реакции спрямо някоя от съставките.

При поява на тези нежелани лекарствени реакции употребата на препаратa трябва да се прекрати и да се потърси съвета на лекуващия лекар.

Срок на годност

5 (пет)години

Срок на годност след първоначално отваряне на опаковката :

6 (шест) месеца

Специални условия на съхранение

Да се съхранява при температура под 25°C !

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се употребява след обявения на опаковката срок на годност!

Дата на последна редакция на листовката

Февруари 2004