


Листовка за пациента



VIATROMB
ВИАТРОМЪ
Heparin sodium

Състав

1 g от дермалния спрей съдържа 2 400 IU Heparin sodium
Помощни вещества: фосфолипон®80, етанол 96%, калиев дихидрогенфосфат, натриев хидроксид, пречистена вода.

Лекарствена форма

Дермален спрей, 20g; 25g; 40 g

Фармакотерапевтична група

Антитромботични лекарствени продукти за приложение върху кожата.

Притежател на разрешението за употреба

ЦСЦ Фармасютикъл Лтд - България ЕООД, ул. Асен Йорданов 10, София

Производители

PHARBIЛ Wаltrop GmbH, D-45731 Waltrop, Germany

ЦСЦ Фармасютикъл - България ЕООД, ул. Асен Йорданов 10, София

Терапевтични показания

Заболявания на повърхностните вени като варикозни синдроми и свързаните с тях усложнения и по-точно: тромбофлебити, постфлебитни синдроми, разширени вени, оток, вследствие на обездвижване, язва на подбедрицата. Повърхностни посттравматични хематоми, причинени инфекции или венозни инфузии хематоми. Повърхностни травми вследствие на спортни дейности. Отоци, причинени от контузии, разтягане или възпаление на сухожилията.

Противопоказания

Доказана свръхчувствителност към лекарственото или някое от помощните вещества.

Приложението върху големи участъци от кожата при бебета и малки деца е противопоказано.

Не трябва да се впръсква в очите, устата или носа.

Директно приложение върху отворени рани или лигавици е противопоказано.

Да не се прилага при пациенти с хеморагична диатеза или тромбоцитопения.

Специални предупреждения при употреба

Да се избягва третирането на големи участъци от кожата при бременни жени.

Приложението на Viatromb при кръвоизливи трябва внимателно да се прецени.

Viatromb не може да се прилага по време на кръвотечения, при открити рани или при инфекции, възникнали по време на нагнояване.



При продължително лечение с локални продукти може да възникне свръхчувствителност. В такива случаи е необходимо лечението да бъде спряно и да започне подходяща терапия.

Лекарствени и други форми на взаимодействия

До момента не са наблюдавани.

Приложението на Heparin sodium може да увеличи протромбиновото време при пациенти, приемащи антикоагуланти.

Дозировка и начин на приложение

Ако не е предписано друго, 3 – 4 апликации с масажирание на засегнатите и съседни части, 3 пъти дневно.

Масажите на долните крайници трябва да започват от долната част на крайника. В случаи на болезнени венозни тромбози или флебити, масажиранието е противопоказано.

Продължителността на лечението е до 14 дни, в зависимост от регресията на симптомите.

Не превишавайте препоръчаната доза.

Предозиране

Не са регистрирани данни за предозиране.

В случай на предозиране, ефектът може да се антагонизира с protamine sulfate
Гастроинтестиналната абсорбция е нулева при перорално приложение Heparin.

Нежелани лекарствени реакции

До момента няма данни за нежелани лекарствени реакции на Viatromb.

Алергичните реакции от приложението на Heparin sodium върху кожата са много редки. В изолирани случаи могат да възникнат реакции на свръхчувствителност като зачервяване на кожата и сърбеж, които изчезват бързо след преустановяване на лечението.

Уведомете своя лекар или фармацевт, ако се появят нежелани лекарствени реакции.

Срок на годност

Срок на годност след отваряне на опаковката – 6 месеца

Не използвайте лекарствения продукт след срока, означен на опаковката.

Да се съхранява при стайна температура.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА: Април 2006 г.

