

Информация за продукта

Лактажин – Хигиенен продукт за подобряване на вагиналната микрофлора

Име на продукта

Лактажин (капсули) # 10

Всяка желатинова капсула съдържа 4 милиона активни клетки на капсула
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus,
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

Помощни вещества: лактоза, суроватка на прах, магнезиев стеарат, аскорбинова киселина.

Показания

Лактажин се използва като богат източник на млечни бактерии и за предпазване от вагинални инфекции чрез възстановяване, нормализиране или стабилизиране на вагиналната микрофлора.

Лактажин се препоръчва за профилактика на вагиналната дисбактериоза при бременност, менопауза, след възпалителни заболявания и след антибактериална терапия.

Противопоказание

Остро дразнене и язви по вагиналната лигавица.

Механизъм на действие

Лактобацилите са част от нормалната микрофлора на влагалището от пубертета до менопаузата. Чрез ферментацията на въглехидратите и особено на гликогена, те осигуряват поддържането на кисела среда и запазват балансираната микрофлора на вагината. Всяко нарушение на този баланс може да причини дразнене и възпаление на вагиналният канал, съответно да доведе до инфекция. Лактобацилите образуват природна бариера, която предпазва от нахлуването на патогенни и вредни бактерии. Лактажин е отличен източник на млечни бактерии, които подобряват вагиналният микробен баланс, предотвратява инфекциите на влагалището и може да се прилага за възстановяване и поддържане на нормалната вагинална микрофлора.

Начин на приложение и дозировка

1 капсула се поставя дълбоко във вагината в легнало положение. Прилага се веднъж дневно в продължение на 10 дни, препоръчително вечер.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Лактажин може да се прилага след антибактериална терапия за възстановяване на нормалната вагинална микрофлора.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Лактажин е хигиенен продукт, който може да се прилага комбинация със сулфаниламида, антибиотици, метронидазол и други.

Бременност и кърмене

Лактажин може да се прилага по време на бременност и кърмене.

Нежелани реакции

Възможна е свръхчувствителност към желатиновата капсула или помощните вещества.

Предозиране

Предозирането е невъзможно.

Несъвместимости

Не са описани.

Срок на годност

3 години

Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2 – 8 °C).

Опаковка

Бели полиетиленови бутилки с бяла полиетиленова капачка, # 10.

Pharmascience Inc.

6111 Royalmount Avenue, Montreal, Quebec H4P 2T4, Канада.