

Информация за пациента

Зимафлуор® капки/Zymafluor drops 20 ml

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 07.11.06г.

Моля, прочетете внимателно тази листовка, преди да вземете Зимафлуор, тъй като тя съдържа полезна информация за вас.

Този лекарствен продукт се отпуска без рецепта. Независимо от това вие трябва да използвате Зимафлуор® внимателно, за да получите възможно най-добри резултати.

- Запазете тази листовка. Може да ви се наложи да я прочетете отново.
- Попитайте вашия фармацевт, ако се нуждаете от съвет.
- Обърнете се към лекар, ако симптомите се влошат или не се подобрят.

В тази листовка:

1. Какво е Зимафлуор® и за какво се използва
2. Преди да употребявате Зимафлуор®
3. Как да вземате Зимафлуор®
4. Възможни нежелани ефекти
5. Съхранение на Зимафлуор®
6. Допълнителна информация

Зимафлуор® капки/Zymafluor® drops

Четири капки Зимафлуор® капки съдържат 0.55 mg sodium fluoride, еквивалентни на 0.25 mg флуор.

Помощни вещества: бензоена киселина, глицерол, сорбитол, пречистена вода.

Всяко шишенце Зимафлуор® капки съдържа 20 ml.

1 ml Зимафлуор® капки = 18 капки.

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Consumers Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 München, Germany

Производител

Novartis Consumers Health SA, Route de L'Etraz, 1260 Nyon - Switzerland

1. Какво е Зимафлуор® и за какво се използва?

Зимафлуор® се прилага за профилактика на зъбния кариес.

Зимафлуор® доставя флуор за зъбките на вашето дете, който ги прави по-резистентни към кариеса.

2. Преди да използвате Зимафлуор®

Не давайте на вашето дете Зимафлуор®, ако то е алергично към някоя от съставките.

Проявете специално внимание към Зимафлуор®!

Количеството Зимафлуор®, което вашето дете взема, зависи от количеството флуор в питейната вода, солта, зъбната паста и от възрастта му.



Таблица 1

Концентрация на флуор в питейната вода (mg/l)	< 0.3	0.3–0.7	> 0.7
Препоръчителна флуорна добавка	mg/F дневно (капки Зимафлуор®)		
Възраст:			
от 2 седмици до 2 години	0.25 (4 капки)	0	0
от 2 до 4 години	0.50 (8 капки)	0.25 (4 капки)	0
от 4 до 16 години	1.00 (16 капки)	0.50 (8 капки)	0
При бременни	1.00 (16 капки)	0.50 (8 капки)	0

Вашият лекар, стоматолог или фармацевт ще ви помогне да уточните правилната дозировка за вашето дете.

Ако сте бременна или кърмите

Зимафлуор® е използван в продължение на много години по време на бременност в препоръчаната дозировка без негативни последици. Препоръчителната дозировка за майката през този период е 1 mg флуор дневно. Тъй като количеството флуор, преминаващо в кърмата, е незначително, на естествено хранените бебета също трябва да се дават по 4 капки Зимафлуор® дневно.

Прием на други медикаменти

Ако вашето дете взема лекарства, съдържащи алуминиеви, калциеви или магнезиеви соли, изчакайте поне 2 часа, преди да дадете Зимафлуор®.

Прием на Зимафлуор® с храни или напитки

Не давайте Зимафлуор® едновременно с мляко или млечни продукти.

3. Как да вземате Зимафлуор®?

Веднъж определена (с помощта на Таблица 1), дневната доза Зимафлуор® обикновено се взема на един прием.

Зимафлуор® капки могат да се смесят с течности (но не мляко) или с по-твърда храна или да се приемат самостоятелно.

Зимафлуор® капки са предназначени за деца, които са твърде малки да смучат таблетки (деца между 2 седмици и 2 години). Ако предпочитате, можете да продължите да използвате Зимафлуор® капки и след двегодишна възраст. В този случай следвайте дозировката, посочена в Таблица 1.

Ако забравите да вземете Зимафлуор®

Ако сте забравили да дадете на детето си неговата дневна доза Зимафлуор®, не трябва да удвоявате дозата на следващия ден.

Ако вземете повече Зимафлуор®, отколкото е необходимо

В случай на случайно предозиране незабавно информирайте вашия лекар или фармацевт!



Ако детето ви е получавало твърде много флуор

Ако детето ви е получавало малко по-голямо от необходимото количество флуор в течение на дълъг период, например два пъти дневната доза в продължение на много години, по зъбите му могат да се появят бели петна.

Ако детето ви погълне голямо количество капки

Свържете се незабавно с вашия лекар.

- Ако дете, тежащо 10 kg, погълне между 20 и 40 ml (1-2 шишенца) Зимафлуор® капки, накарайте го да повърне и му дайте да пие голямо количество мляко.

Ако дете, тежащо 10 kg, погълне повече от 40 ml (2 шишенца) Зимафлуор® капки, трябва незабавно да бъде отведено в болница.

Симптомите на предозиране са: повишено слюноотделяне, гадене, повръщане, коремни болки и диария.

4. Възможни нежелани ефекти

В препоръчаните дози флуорът не предизвиква значими странични реакции. Съобщава се за редки случаи на леки кожни зачервявания. Те бързо изчезват при спиране на терапията.

Кажете на вашия лекар или фармацевт, ако забележите някой друг ефект, който не е описан по-горе, и смятате, че може да е свързан с употребата на Зимафлуор®.

5. Съхранение на Зимафлуор®

Срок на годност

60 месеца.

Не използвайте Зимафлуор® след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката. Ако той е изтекъл, не хвърляйте лекарството, а го предайте на вашия фармацевт.

Условия за съхранение

Да се съхраняват под 30 °C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

6. Допълнителна информация

Последна редакция на листовката: ноември 2006

