

## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

**HEPALLANTAN**

**ХЕПАЛАНТАН**

гел

### **СЪСТАВ:**

Активни вещества: Heparin sodium 300 IU; Dexpanthenol 4 mg; Allantoin 3 mg.

Помощни вещества: кабомер 940, триетаноламин, пропиленгликол, бронопол, пречистена вода.

### **ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА**

40 g гел в алуминиева туба.

### **ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Балканфарма - Троян АД

5600, гр.Троян РО box 82

Тел.: (0670) 22607

Факс: (0670) 24239; 22610

### **ДЕЙСТВИЕ**

Хепалантан гел притежава свойства, потискащи кръвосъсирването, както и противовъзпалително и възстановяващо действие. Хепарин натрий затруднява съсирването на кръвта, намалява количеството на мастите в кръвта, предотвратява образуването на тромби в

периферните кръвоносни съдове. Декспантенол, приложен върху кожата, прониква бързо и пълно през нея, засилва противовъзпалителното действие на препарата като стимулира възстановяването на тъканите. Алантиинът стимулира клетъчното делене и зарастването на раните.

## **ПОКАЗАНИЯ**

ХЕПАЛАНТАН гел е предназначен за лечение на:

- ✓ разширени вени, възпаления на вените и такива, съпроводени с образуването на тромби;
- ✓ подкожни кръвоизливи, контузии, навяхвания, травми, разтягане на сухожилия;
- ✓ възпаления на сухожилията (тендовагинити);
- ✓ като допълнително средство при лечение на възпалителни процеси на лимфните възли и млечната жлеза (лимфангити и мастити);

## **ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Хепалантан гел е противопоказан при пациенти, свръхчувствителни към хепарин или някои от съставките на гела.

### **СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА**

Гелът е предназначен само за външна употреба. Не бива да се нанася върху лигавици, открити рани или в очите.

След употреба е необходимо ръцете да се измиват добре.

## **ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Не е желателна употребата на лекарството с лекарствени продукти за външно приложение, които съдържат тетрациклин, хидрокортизон или салицилова киселина.

## **СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ**

По време на бременност и кърмене ХЕПАЛАНТАН гел се използва само по лекарско предписание!

В първите 12 седмици на бременността приложението на хепарин трябва да се избягва поради опасност от аборт. В последните три месеци на бременността препаратът да се употребява за кратък период от време и да се избягва нанасянето му на големи повърхности по кожата.

При лечение на възпаление на млечната жлеза (мастит), ХЕПАЛАНТАН гел се използва след прекратяване на кърменето.

При деца не се препоръчва нанасянето на гела върху обширни повърхности.

## **ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ**

Препаратът не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

## **ДАНИ ЗА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Наличието на пропилен гликол може да предизвика кожно дразнене.

## **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА**

### **ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА**

Само за прилагане върху кожата!

- Хепалантан гел се нанася на тънък слой върху засегнатия участък два пъти дневно. При необходимост продуктът може да се втрие. Препоръчва се масажът на краката да се извършва в посока отдолу нагоре.
- При тромбози и тромбофлебити (възпаление на вените при тромбози) не се масажира, а се препоръчва използването на превръзки, напоени с гела, които се сменят най-малко един път дневно.
- При мастит (възпаление на млечната жлеза) се прилага след прекратяване на кърменето.

Гелната форма е особено подходяща за прилагане при йонофореза – препаратът се нанася на катода.

### **НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ**

Няма данни за предозирание при употреба на Хепалантан гел.

### **НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

При употреба на ХЕПАЛАНТАН гел е възможна появата на алергична реакция на кожата (зачервяване или сърбеж). В много редки случаи пациентът може да прояви реакция на свръхчувствителност към някоя от съставките на препарата. Ако се появят някакви нежелани реакции, лечението трябва да се прекрати и да се потърси лекарска консултация.

### **СЪХРАНЕНИЕ**

При температура под 25<sup>0</sup> С в плътно затворена оригинална опаковка.

Да се пази на недостъпно за деца място!

**СРОК НА ГОДНОСТ**

2 (две) години от датата на производство.

След първото отваряне на опаковката препаратът има трайност 1 (един) месец.

Да не се употребява след изтичане на посочения срок на годност!

**ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА**

Февруари 2001 г.