

Листовка: информация за потребителя

Абрикорт 0,25 mg/g маз
Abridge 0,25 mg/g ointment

флуоцинолонов ацетонид (fluocinolone acetone)

Разрешение № 3823

06 - 06 - 2017

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаките на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Абрикорт и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Абрикорт
3. Как да използвате Абрикорт
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Абрикорт
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Абрикорт и за какво се използва

Абрикорт маз съдържа флуоцинолон, синтетичен кортикостероид с противовъзпалителен и антиалергичен ефект.

Абрикорт маз се прилага за краткотрайно лечение на локални неинфекцирани дерматози и кожни възпаления, придружени от сърбеж и алергични промени по кожата като:

- Дерматити (атопичен, контактен, себореен дерматит, с лющене и зачеряване на кожата), дерматит от насекоми;
- Екземи (алергична, контактна);
- Еритема мултиформе (кожно заболяване със зачеряване и образуване на межурчета);
- Псориазис вулгарис (кожно заболяване с червени, лющещи се плаки);
- Лупус еритематозус (нарушение на имунната система, което причинява болки в ставите, кожни обриви и треска);
- Червен плосък лишай.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Абрикорт

Не използвайте Абрикорт маз:

- ако сте алергични към флуоцинолонов ацетонид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- при морбили, варицела, рубеола и други вирусни кожни заболявания;
- при гъбични инфекции;
- при периорален дерматит (обрив около устата), акне, розацея (розово акне по лицето, носа и бузите).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Абрикорт.



Не се препоръчва продължителна употреба на продукта над 2 седмици. При продължително лечение нараства рисък от нежеланите реакции и системни ефекти. При деца резорбцията е по-голяма, затова те са изложени на по-голям рисък от появя на системните ефекти на кортикоステроидите.

Прилагането на продукта върху клепачите трябва да се избягва поради възможност от влошаване на съществащо повишено вътречно налягане (глаукома) и перде на очите (катаракта).

Свържете се с Вашия лекар, ако имате замъглено зрение или други зрителни смущения.

Прилага се с повишено внимание при пациенти със съществуваща атрофия на подкожната тъкан (изтъняване на кожата).

Ако се използват оклутивни превръзки или се третират големи участъци от кожата съществува опасност от увеличаване на системната резорбция на продукта и засилване на системните му ефекти.

Други лекарства и Абрикорт

Информирайте Вашия лекар, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

Няма данни за установени лекарствени взаимодействия. Въпреки това по време на лечението пациентът не трябва да се ваксинира срещу варицела и други заболявания, особено ако продуктът се прилага на обширни площи.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

При бременност и кърмене да се избягва прилагането на продукта, особено продължително време, в големи количества и върху обширни повърхности.

Шофиране и работа с машини

Абрикорт маз не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Абрикорт съдържа парабени и пропиленгликол

Съдържанието на парабени (метил и пропил парагидроксибензоат) в Абрикорт маз може да предизвика алергични реакции (възможно е да са от забавен тип).

Пропиленгликол може да причини дразнене на кожата.

3. Как да използвате Абрикорт

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Продуктът е за локално приложение.

Абрикорт маз се прилага под формата на тънък филм върху засегнатия участък 1-2 пъти дневно в зависимост от тежестта на заболяването. Оксмените части се обръзват, за да се осигури директен контакт с лезиите. Тази форма на продукта се прилага при дерматози с изразена сухота на кожата, като при нея е налице по-дълбоко проникване на лекарственото вещество. За лечение на псориазис или на трудно подаващи се на лечение дерматози могат да се използват и оклутивни превръзки. Те се сменят 3-4 пъти на ден или по-често, по преканта на лекаря. При проява на резистентност или допълнителна инфекция трябва да се прекрати използването на оклутивна превръзка и да се продължи лечението с подходящо антибиотично средство.



Непрекъснато лечение с продукта може да се прилага не повече от 2 седмици.

Употреба при деца

Продуктът не се прилага при деца до 2 години. При деца над 2 години се прилага с внимание и върху малка кожна повърхност.

Не се прилага върху лицето, освен в случаите на абсолютна необходимост и то не по-дълго от 1 седмица.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Абрикорт

Наблюдаваните симптоми при предозиране съвпадат с нежеланите лекарствени реакции, особено при по-продължително лечение и при приложение върху големи площи.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Всички нежелани реакции, които се наблюдават след приложението на Абрикорт маз са с неизвестна честота (от наличните данни не може да се направи оценка на честотата).

При продължително прилагане на Абрикорт маз могат да се появят акне, стероидна пурпурата (множество малки кръвоизливи по кожата и лигавиците поради употребата на кортикоステроиди), атрофия на епитела и подкожната тъкан (изтъняване на кожата), сухота на кожата, частично или напълно изчезване на пигмента на даден кожен участък, стрии (линии на местата на разтягане на кожата), телеангиектазии (разширение на малки кръвоносни съдове), периорален дерматит (обрив около устата). Понякога могат да се появят уртикария или макулопапулозни обриви, влошаване на съществуващите лезии.

Когато продуктът се прилага върху интертригинозни (места на кожни гънки – между пръстите, под бюста, в слабините и др.) и флексорни (сгъвателни) повърхности или върху лицето, тези промени могат да се получат и за по-кратко време.

От страна на очите е възможна појава на замъглено зрение. При прилагане върху клепачите може да се развие перде на окото и повишено вътречно налягане.

При продължително прилагане върху големи площи локалните кортикостероиди могат да се резорбират в достатъчни количества, за да се появят някои от нежеланите лекарствени реакции, характерни за системно приложените кортикостероиди.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Абрикорт

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 25°C.



Срок на годност след първо отваряне: 3 месеца, при съхранение под 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Абрикорт

- Активното вещество е флуоцинолонов ацетонид. 100 g маз съдържат 0,025 g флуоцинолонов ацетонид.
- Другите съставки са: полисорбат 60, лимонена киселина, безводна; метилпрахидроксибензоат; пропилпрахидроксибензоат; бял вазелин.

Как изглежда Абрикорт и какво съдържа опаковката:

Маз с еднородна консистенция, без агломерати и въздушни мехури, с бял цвят.

Абрикорт маз 15 g в двойно лакирани алуминиеви туби.

Една туба заедно с листовка се опакова в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД

ул. "Атанас Дуков" 29

1407 София, България

Производител

Балканфarma-Разград АД

бул. "Априлско въстание" № 68

7200 Разград, България

Дата на последно преразглеждане на листовката

