

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Аero-OM 42 mg таблетки за дъвчене

Aero-OM 42 mg chewable tablets

Simeticone / симетикон

ОДОБР. №:

ДАТА: 8061 10.03.2010

РУ-20090367

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се запазят, настъпи влошаване или в случай на продължителна констипация (запек).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Аеро-ОМ и за какво се използва
2. Преди да приемете Аеро-ОМ
3. Как да приемате Аеро-ОМ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Аеро-ОМ
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АЕРО-ОМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Средство против образуване на газове



Симетикон е инертно химично вещество (силикон), който действа като средство против образуване на пяна: той разрушава въздушните мехури в стомаха и в червата и по този начин намалява излишъка на газове.

Възрастни (над 15- годишна възраст)

Аеро-ОМ се използва за симптоматично лечение на подуване на корема (събиране на газове в стомаха и червата и метеоризъм) от функционален произход.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ АЕРО-ОМ

Не приемайте Аеро-ОМ

Ако сте алергични (свъръхчувствителни) към симетикон (активното вещество) или към някоя от останалите съставки на Аеро-ОМ.

Обърнете специално внимание при употребата на Аеро-ОМ

Ако имате трудности при сдъвкане на таблетките.

Таблетките Аеро-ОМ не трябва да се вземат от деца, тъй като все още не се разполага с достатъчно информация относно безопасността.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

Прием на Аеро-ОМ с храни и напитки

Няма ефекти.

Бременност и кърмене

Бременност:

Тъй като симетикон се резорбира трудно от организма, рисъкът от възникване на токсични ефекти върху плода е много малък. Не съществува, обаче, специфично изследване на подобна ситуация и по тази причина, преди да започнете да вземате Аеро-ОМ се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.



Кърмене:

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не са известни ефекти на лекарството върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Аеро-ОМ

Пациенти, страдащи от диабет или спазващи диета с ниско съдържание на захар трябва да бъдат информирани, че Аеро-ОМ съдържа захароза (435 mg в една таблетка).

Ако Вашият лекар е установил, че Вие не понасяте някои видове захари, моля посъветвайте се с него преди да започнете да приемате това лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ АЕРО-ОМ

Винаги приемайте Аеро-ОМ точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия фармацевт.

Обичайната доза за възрастни (над 15-годишна възраст) е 2 таблетки, 4 пъти дневно. Таблетките трябва да се сдъвкат.

Лечението не трябва да продължава повече от 10 дни.

Ако имате впечатлението, че ефектът на Аеро-ОМ е твърде силен или твърде слаб, консултирайте се с Вашия фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Аеро-ОМ

Консултирайте се с Вашия фармацевт.

Ако забравите да вземете Аеро-ОМ

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Консултирайте се с Вашия фармацевт.



Ако сте спрели приема на Аеро-ОМ

Няма никакъв ефект.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛANI REAKCII

Както всички лекарства, Аеро-ОМ може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Аеро-ОМ може да предизвика такива нежелани реакции като диария и болки в корема, гадене или повръщане. Докладвани са редки нежелани реакции вследствие на свръхчувствителност като например кожен обрив със сърбеж, оток на лицето и езика, и затруднено дишане.

В случай на поява на един или няколко от тези симптоми, консултирайте се с Вашия фармацевт. Никога не спирайте лечението преди да сте се посъветвали с Вашия фармацевт.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия фармацевт.

5. КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТЕ АЕРО-ОМ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Аеро-ОМ след срока на годност, отбелязан върху опаковката, след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 30° C.

Не приемайте лекарството, ако блистерът е повреден.



Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Аеро-ОМ

Активното вещество е симетикон (*simeticone*). Всяка таблетка за дъвчене съдържа 42 mg симетикон.

Другите съставки са: захароза, повидон, силициев диоксид, колоиден, безводен, магнезиев стеарат и ванилин.

Как изглежда Аеро-ОМ и какво съдържа опаковката

Аеро-ОМ е кръгла, биконвексна, бяла до жълтеникава таблетка за дъвчене.

Кутии с 20, 50 или 60 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

OM PHARMA S.A.

R. da Indústria, 2 – Quinta Grande
2610-088 Amadora – Lisboa - Португалия
Tel.: +351 21 470 85 00
Fax: +351 21 470 85 06
e-mail: mailbox@ompharma.pt



Този лекарствен продукт е разрешен за употреба под следните търговски наименования в страните-членки на Европейската Икономическа Зона:

Португалия:	Disflat
Австрия:	AeroOM 42 mg Kautabletten
България:	Aero-OM
Чехия:	AeroOM
Германия:	Aero-OM
Унгария:	Aero-OM
Холандия:	Aero-OM
Полша:	Aero-OM
Италия:	Simeticone Angenerico

Дата на последно одобрение на листовката: Ноември 2009 г.

