

OK

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА**

Българска Агенция по лекарствата

Листовка - Допълнение 2

Към рев. №

20 11 2331

AFLUBIN® tablets

АФЛУБИН таблетки

Допълнение № 11-13731, 31.05.2011

**Прочетете листовката внимателно, защото тя съдържа важна информация за Вас.**

Това лекарство е достъпно без рецепт. Въпреки това трябва да използвате AFLUBIN® таблетки внимателно, за да имате най-добрите резултати от него.

- Пазете тази листовка. Може би ще имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате нужда от повече информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако симптомите продължават или състоянието се влоши, задължително се консултирайте с лекар.
- Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка или отбелязаните нежелани лекарствени реакции станат сериозни, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представляват AFLUBIN® таблетки и за какво се използват
2. Каква информация трябва да имате преди да използвате AFLUBIN® таблетки
3. Как да приемате AFLUBIN® таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате AFLUBIN® таблетки
6. Допълнителна информация

**1. Какво представляват AFLUBIN® таблетки и за какво се използват**

AFLUBIN® таблетки са хомеопатичен лекарствен продукт.

**Показания:**

Профилактика и симптоматично лечение на грип, парагрип и простуда със съпътстващи ставни и мускулни болки.

В съответствие с хомеопатичната фармакологична природа на съставките, AFLUBIN® таблетки спомагат за облекчаване и лечение на следните симптоми:

Gentiana lutea	Грипо-подобни и фебрилни състояния. Астения, отслабване и ревматична болка. Тежест, гадене, коликообразни болки и повъръщане.
Aconitum napellus	Начална фаза на вирусна инфекция, остро възпаление и простуда. Кихане, хрема и суха кашлица. Невралгия.
Bryonia cretica	Грипо-подобни състояния. Бронхит с конвултивна дразнеща кашлица. Ревматоидни мускулни и ставни болки. Стомашно-чревни и чернодробни разстройства.
Ferrum phosphoricum	Фебрилни изтощителни състояния. Хрема, ларингеални и трахеални катари. Придружаващо лечение при бронхити и плеврити у деца.
Acidum sarcolacticum	Грип с отпадналост, мускулна слабост. Суха, болезнена кашлица. Ревматични симптоми.

**2. Каква информация трябва да имате преди да използвате AFLUBIN® таблетки**

**Не приемайте AFLUBIN® таблетки, ако сте алергични към някое от активните или**

**помощните вещества.**

AFLUBIN® таблетки съдържат лактоза. Не се препоръчва при лица, страдащи от рядката наследствена болест галактозен интолеранс, липса на лактаза или глукозо-галактозна малабсорция.

Ако симптомите не се подобряват или не се достигат очакваните резултати приемайки AFLUBIN® таблетки, моля консултирайте се с Вашия лекар възможно най-скоро.

#### **Прием на други лекарства**

До сега не са известни взаимодействия с други лекарства. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насконо сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

#### **Прием на AFLUBIN® таблетки с храна и течности**

AFLUBIN® таблетки се приемат 30 минути преди или 1 час след храна за по-добър ефект.

#### **Бременност и кърмене**

Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт преди да приемате каквото и да е лекарство. Поради липса на експериментални и клинични данни да се избягва употребата на AFLUBIN® таблетки по време на бременност и кърмене.

#### **Влияние върху способността за шофиране и работа с машини**

AFLUBIN® таблетки нямат влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

### **3. Как да приемате AFLUBIN® таблетки**

Приемайте AFLUBIN® таблетки по инструкциите, описани в тази листовка. Моля, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

#### **1. Активно лечение**

	Доза	Дозиране
Възрастни и юноши	1 таблетка	Първоначално за по-бързо повлияване на симптомите е възможно дозата да се приема през 1 час до максимум 6 пъти дневно. При подобряване на симптомите, приемите постепенно се редуцират до 2 пъти дневно.
Деца над 1 година	1/2 таблетка	

#### **2. Превантивно лечение (профилактика)**

а. Плановата профилактика започва в началото на зимата или преди очаквана грипна епидемия:

	Доза	Дозиране
Възрастни и юноши	1 таблетка	2 пъти дневно за 3 седмици
Деца над 1 година	1/2 таблетка	

б. Профилактика при излагане на студ или контакт с човек, страдащ от вирусна инфекция:

	Доза	Дозиране
Възрастни и юноши	1 таблетка	2 пъти дневно за 2 дни
Деца над 1 година	1/2 таблетка	

AFLUBIN® таблетки се приемат сублингвално (под езика) 30 минути преди или 1 час след храна за по- добър ефект.

**Ако сте приели повече от необходимата доза AFLUBIN® таблетки:**  
Не са известни случаи на предозиране.

**Ако сте пропуснали да вземете AFLUBIN® таблетки:**  
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.  
Вземете следващата доза, колкото е възможно по-скоро.  
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт попитайте  
Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Не са известни нежелани лекарствени реакции от AFLUBIN® таблетки.  
Като всяко лекарство, AFLUBIN® таблетки, би могло да предизвика нежелани лекарствени  
реакции.  
Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка, моля, уведомете  
вашия лекар или фармацевта си.

#### **5. Как да съхранявате AFLUBIN® таблетки**

Да се съхранява в оригиналната картонена опаковка с оглед предпазване от слънчева светлина,  
при температура под 30°C.  
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.  
Не използвайте AFLUBIN® таблетки след срока на годност, отбелаян на картонената опаковка  
и блистера. Датата на годност се отнася за последния ден на месеца.

#### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

##### **Какво съдържат таблетките AFLUBIN®**

###### 1 таблетка съдържа:

Gentiana lutea trit. D1	3,6 mg
Aconitum napellus trit.D6	37,2 mg
Bryonia cretica trit.D6	37,2 mg
Ferrum phosphoricum trit. D12	37,2 mg
Acidum sarcolacticum trit. D12	37,2 mg

Помощни вещества: лактозаmonoхидрат, магнезиев стеарат, картофено нишесте.

##### **Как изглеждат AFLUBIN® таблетки като съдържание и опаковка:**

Бели, плоски, кръгли таблетки с делителна черта и горчив вкус. Тази таблетка може да се  
раздели на две равни части.

Опаковка: блистери от PVC/PVCD/ Al- фолио с по 12, 24, 36 или 48 таблетки.

##### **Притежател на Разрешението за Употреба**

Richard Bittner AG, Reisnerstraße 55-57; 1030 Vienna, Австрия  
tel.: +43/(0)1-50 30 972  
fax.: +43/(0)1-50 30 972/40  
e-mail: office.vienna@richard-bittner.com

##### **Производител**

Richard Bittner AG, Ossiacherstrasse 7, 9560 Feldkirchen, Австрия  
tel.: +43/(0)4276-37888-0  
fax.: +43/(0)4276-37131  
e-mail: office@richard-bittner.com

**Дата на последно одобрение на листовката:** Март 2011

