

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**ANERVINA oral drops, solution**  
**АНЕРВИНА капки перорални, разтвор**

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт. Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново. Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите такива неописани в листовката, моля да уведомите вашия лекар или фармацевт.

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА</b>	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	260 52286
Разрешение №	11-117484 01, 2011
Одобрение №	/

В тази листовка ще намерите следната информация:

1. Какво представлява АНЕРВИНА и за какво се използва
2. Преди да приемете АНЕРВИНА
3. Как да приемате АНЕРВИНА
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Съхранение на АНЕРВИНА
6. Допълнителна информация

**1. Какво представлява АНЕРВИНА и за какво се използва**

АНЕРВИНА се предлага под формата на разтвор за перорално приложение. В 100 g АНЕРВИНА се съдържат следните активно действащи вещества – Тинктура валериана 20.0 g; натриев бромид 1.5 g; амониев бромид 2.0 g; калиев бромид 3.0 g. В състава са включени и следните помощни вещества - етанол и пречистена вода.

АНЕРВИНА представлява комбиниран лекарствен продукт със седативен (успокояващ) и слабо изразен сънотворен ефект. Ефектите се свързват с действието на всяка една от съставките поотделно и като цяло.

АНЕРВИНА се използва за симптоматично лечение на раздразнителност, тревожност, леки нарушения в съня, свързани с физическа и умствена преумора, невротични разстройства, особено в климактериума.

**2. Преди да приемете АНЕРВИНА**

**Кога не трябва да се използва АНЕРВИНА?**

АНЕРВИНА не бива да се използва при:

- свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта
- тежка чернодробна недостатъчност
- пациенти с потисната бъбречна функция
- бременност
- кърмене
- деца под 12 годишна възраст.



### Специални предпазни мерки при употреба

С особено внимание АНЕРВИНА се използва при следните пациенти:

- обезводнени пациенти
- пациенти на бедна на натриев хлорид диета
- повишена телесна температура
- вертебрална атеросклероза
- органични мозъчни нарушения
- дебилни пациенти
- депресирани пациенти
- пациенти с неврологични заболявания
- пациенти с психически заболявания
- алкохолици

АНЕРВИНА съдържа етанол (до 49 на сто V/V или до 0.2 g на доза) поради което не се препоръчва за употреба от страдащи от чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания или заболявания.

### Употреба по време на бременост и кърмене

**АНЕРВИНА не бива да се приема по време на бременност и кърмене.**

Активно действащите съставки на Анервина преминават през плацентата и се секретират с майчиното мляко.

### Прием на АНЕРВИНА с други лекарства

Възможно е засилване на седацията и ЦНС депресия при едновременно приемане на Анервина и седативни- сънотворни (барбитурати и бензодиазепини), опионидни аналгетици, транквилизатори и алкохол (или етанол-съдържащи лекарства). Анервина не бива да се приема едновременно с лекарства увреждащи черния дроб.

Може да промени действието на някои лекарства.

### Шофиране и при работа с машини

Анервина може да повлияе способността за шофиране и работа с машини. Съществува опасност от намаляване на активното внимание и забавяне на реакциите.

### 3. Как да приемате АНЕРВИНА

**Възрастни:** По 20-30 капки 1 - 2 пъти дневно, разтворени в малко вода или на бучка захар.

**Деца:** Деца над 12 години – 1 път дневно по толкова капки, на колкото години е детето.

**Продължителност на приема:** Анервина не бива да се използва повече от 15 дни без лекарско предписание.

### Ако сте приели повече от необходимата доза

При приемане на високи дози (превишаващи многократно препоръчаните) могат да се наблюдават следните симптоми на предозиране: гадене и повръщане, абдоминална болка, констипация; главоболие, световъртеж, замаяност, депресия, халюцинации, отпадналост, лесна уморяемост, повишаване съсирваемостта на кръвта, хипотония, тахикардия, респираторен дистрес, стягане в гръдния кош, нарушено зрение, мидриаза, абдоминална болка, тремор на крайниците, потискане на интестиналния мотилитет и тонус.



Симптомите на предозиране с бромиди най-често са следните: депресия, кома, хипотония, тахикардия и респираторен дистрес. В такъв случай потърсете лекарска помощ.

Няма специфичен антидот при предозиране на бромиди. Основната терапия е спиране приема на бромиди, измерване на серумните нива, агресивна хидратация и повишаване на уринарната бромидна екскреция. Тази терапия трябва да продължи до достигане на бромидни нива от по-малко от 100 - 150 mg/dL.

Симптомите на предозиране с валериана най-често са следните: лесна уморяемост, стягане в гръдния кош, хипотония, мидриаза, абдоминална болка, тремор на крайниците, замаяност. При прием на високи дози валериана се наблюдават потискане на интестиналния мотилитет и тонус.

При предозиране с валериана, лечението е симптоматично: прилага се стомашен лаваж с активен въглен и се проследяват основните жизнени показатели, чернодробните параметри и ЕКГ при симптоматични пациенти.

#### **Ако сте пропуснали да приемете АНЕРВИНА**

Ако пропуснете да приемете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е настъпило време за следващата доза, забравете за пропуснатата и продължете по обичайния режим на приемане. Никога не взимайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. Възможни нежелани лекарствени реакции**

Както всички лекарства, така и Анервина може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Рядко при продължителна употреба във високи дози да се наблюдават следните нежелани реакции :

- От страна на гастро-интестиналния тракт: гадене и повръщане, дразнене на стомаха, абдоминална болка, констипация; чернодробни увреждания.
- От страна на централната нервна система: главоболие, възбуда, сънливост и понижена работоспособност; атаксия; вертиго (световъртеж); обърканост; мания; халюцинации; неврологични промени; повишено интраспинално налягане.
- От страна на дихателната система: респираторен дистрес синдром.
- От страна на кожата: прояви на свръхчувствителност и обриви.
- Зрителни нарушения: зениците могат да бъдат свити или разширени и може да има забавена реактивност към светлина. Много рядко може да се наблюдава нарушено виждане, следствие на ретробулбарен неврит.
- Сърдечно съдови нарушения: тахикардия (учестен пулс), рядко – хипотония.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

#### **5. Съхранение на АНЕРВИНА**

Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура до 25°C, на сухо и защитено от светлина място, недостъпно за погледа и досега на деца. Срок на съхранение след първоначално отваряне на опаковката – 40 дни



Лекарството не трябва да се използва след датата на изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност включва последния ден от посочения месец.

Запалим продукт!

#### **6. Допълнителна информация**

**АНЕРВИНА** се предлага под формата на разтвор за перорално приложение в Тъмни стъклени бутилки с вместимост 50 ml, с полиетиленови капачки на винт и запушалка-капкомер.

Бутилки от полиетилентерефталат с вместимост 50 ml, с полиетиленови капачки на винт и запушалка капкомер.

#### **Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба**

“Химакс Фарма” ЕООД, 1618 София, ул. “Горица” 8 А.

#### **Дата на последна актуализация на текста**

Декември, 2010 г.

