

Dr. Theiss Angi Sept  
Д-р Тайс Анги Септ

ИАЛ  
ОДОБРЕН ОІ  
ДАТА 26.07.2004

Лекарствена форма: таблетки за смучене  
Състав: 1 таблетка за смучене съдържа:

Лекарствени вещества:

2,4-dichlorbenzylalcohol	1,2 mg
Menthol	5,4 mg
Anethol	2,4 mg
Menthae piperitae aetheroleum	0,6 mg

Помощи вещества:

Захароза, сироп от глюкоза, лимонена киселина, ароматизатор (черешов вкус), оцветител Е162, пречистена вода.

**Показания:** За облекчаване на симптомите като болка при прогълъщане и пресипнал глас при инфекциозни и възпалителни заболявания на гърлото и ларинкса –тонзилити, фарингити и ларингити; при възпаление на венците и устната лигавицата.

**Противопоказания:** При повишена индивидуална чувствителност към някоя от съставките. При деца под 6 години и при кърмачки.

**Нежелани лекарствени реакции:** Етеричните масла в редки случаи могат да предизвикат алергични реакции на кожата (обриви), дихателните пътища и стомашно-чревния тракт (стомашно дразнене и диария). Алергични реакции от страна на дихателните пътища под форма на бронхоспазъм или астматични пристъпи могат да се получат при вдишване на етеричните масла. При перорално приложение рисъкът от подобни реакции е значително по-малък.

**Предозиране:** При концентрацията на етеричните масла в 1 таблетка за смучене случайното предозиране е изключено.

Симптомите за предозиране биха могли да бъдат гадене и стомашно разстройство.

Ако имате някакви опасения че сте приели по-голямо количество и сте предозирали, моля, обърнете се към Вашия лекар.

**Употреба по време на бременност и кърмене:** Продуктът не е противопоказан при бременни. Етеричните масла преминават в кърмата. Поради това е по-добре да не се използва от кърмачки.

**Ефекти при шофиране и работа с машини:** Не са известни симптоми, нарушащи способността за шофиране и работа с машини.

**Дозировка и начин на употреба:** Възрастни и деца над 6 години да смучат бавно по 1 пастил на всеки 2-3 часа. Да не се смучат повече от 6 пастили дневно.

**Предупреждения:** Този лекарствен продукт съдържа захароза. Когато се приема съгласно препоръките за дозиране, всяка таблетка набавя до 1.335 g захароза, а при максималната дневна доза от 6 таблетки се поемат около 8 g. Неподходящ при хора с вродена непоносимост към фруктозата, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захаразно/изомалтазен дефицит.

Този лекарствен продукт съдържа също така глюкозен сироп 0.8 g в 1 таблетка. Когато се приема съгласно препоръките за дозиране, дневната доза набавя до 4.8 g глюкоза.

**Опаковка:** 12 таблетки в блистер, картонена кутийка с листовка за пациента

**Условия на съхранение:**

Да се съхранява при температура под + 25° C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

**Срок на годност:** 5 години

Да не се използва след изтичане на срока, указан върху опаковката.

**Производител и притежател на разрешението за употреба:**

Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstr. 10, 66424 Homburg, Germany

Последна редакция на информацията: август 2003 г.

