

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рев. № 2206 0521	
Разрешение № 11-16140	15.12.2011
Одобрение №	

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Антидепреса 20 mg филмирани таблетки
Antidepressa 20 mg film coated tablets

Циталопрам (като хидробромид) /Citalopram (as hydrobromide)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Антидепреса и за какво се използва?
2. Преди да приемете Антидепреса
3. Как да приемате Антидепреса?
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Антидепреса
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АНТИДЕПРЕСА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Антидепреса принадлежи към групата на антидепресантите, които облекчават симптомите на депресия (промени в настроението).

Антидепреса също се отразява благоприятно при облекчаване на симптоми при пациенти склонни към развитие на панически разстройства и страх от открыти пространства.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ АНТИДЕПРЕСА

Не приемайте Антидепреса:

- Ако сте алергични към циталопрам или към някоя от съставките; (вижте точка "Какво съдържа Вашето лекарство?")
- Ако приемате лекарства, съдържащи активно вещество соматропин или трамадол;
- Ако страдате от неконтролируема епилепсия;
- Ако провеждате едновременно лечение с антидепресанти от групата на МАО-инхибиторите (инхибитори на моноаминооксидазата);
- Ако приемате лекарство, наречено Селегилин (селективен МАО-инхибитор);
- Ако приемате лекарство, наречено Моклобемид (трябва да мине поне един пълен ден между спирането на едното лечение и започване на лечение с Антидепреса);
- Ако имате сериозно чернодробно или бъбречно заболяване

След като преустановите лечението с МАО-инхибитори, направете почивка от 2 седмици, преди да започнете лечение с Антидепреса.

Ако в момента приемате Антидепреса, направете едноседмична почивка преди да започнете лечение с МАО-инхибитори.



Уведомете Вашия лекар преди да започнете приема на Антидепреса, в следните случаи:

- Ако страдате от диабет, тъй като Вашият лекар може да се наложи да коригира дозата според провежданото лечение за диабет.
- Имате непоносимост към някои видове захари.
- Ако страдате от епилепсия и имате назначено лечение за нея.
- Ако сте на электрошокова терпия за лечение на депресия.
- Ако страдате от биполярно афективно разстройство
- Ако приемате лекарствени вещества, познати като невролептици (използвани за лечение на шизофрения).
- Ако Ви предстои ехография, тъй като приемът на Антидепреса може да повлияе върху резултата от такива тестове.

Обърнете специално внимание ако:

- Приемате лекарство, което може да се отрази върху кръвосъсирващата функция или приемате лечение за дисфункция на кръвта, тъй като Антидепреса може да увеличи риска от образуване на кръвоизлив.
- Наскоро сте започнали лечение с Антидепреса за депресия. В някои случаи се наблюдава повишен риск от суицидни намерения, които се засилват през първите две седмици на лечението, но отшумяват след подобряване на състоянието.
- Сте депресирани и/или подтиснати
- Ако сте имали преди суицидни мисли
- Ако сте млади. Информацията от клиничните проучвания показва повишен риск от суицидно поведение при млади хора (под 25 години) с психиатрични нарушения, които са лекувани с антидепресанти.

Ако Ви минават суицидни мисли, свържете се с Вашия лекар или веднага отидете в болница.

Кажете на близки и приятели, че имате депресия или сте подтиснат и ги помолете да прочетат тази листовка. Помолете да Ви кажат ако мислят, че състоянието Ви се влошава или ако са обезпокоени от поведението Ви.

Прием на други лекарства:

Кажете на Вашия лекар или фармацевт ако приемате или насконо сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

Моля уведомете Вашия лекар, ако приемате някои от следните лекарствени средства:

- Фенотиазини (например Хлорпромазин, Тиоридазин и Флуфеназин);
- Трициклични антидепресанти (имиправмин) и седативни лекарства (например Диазепам, Хлордиазепоксид и Оксазепам) – потискат функцията на тромбоцитите и увеличават риска от абнормно кървене.
- Аспирин, и нестероидни противовъзпалителни лекарства (индометацин, диклофенак) – леко увеличен риск от абнормно кървене.
- Литий, и други нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти от групата на триптофан (които понякога се предписват на пациенти с депресия или пациенти, склонни към манийни разстройства). Ако се появят висока температура и внезапни потрепвания на мускулите, ако се почувстvвате възбуден и объркан, трябва да потърсите Вашия лекар незабавно.
- Селегилин (селективен МАО-инхибитор, използван за лечение на Паркинсонова болест); дозата на селегилин не трябва да надвишава 10 mg/ден
- Метопролол (използван при високо кръвно налягане и/или сърдечни заболявания); нивата на метопролол в кръвта се повишават, но не са регистрирани признания на увеличен ефект или увеличени нежелани реакции.
- Суматриптан и подобни лекарства (използван за лечение на мигрена); рисък от нежелани реакции; ако се появят никакви необичайни симптоми при приема на тази комбинация трябва да се видите с Вашия лекар
- Симетидин, когато се използва във високи дози (използван за лечение на стомашна язва); нивата на Антидепреса в кръвта могат да се повишат, но не е регистрирано увеличение на нежеланите реакции.



- Кетоконазол (използван за лечение на инфекции, причинени от гъбички);
- Жълт кантарион (*Hypericum perforatum*) — могат да възникнат взаимодействия между Антидепреса и този билков продукт, които биха засилили появата на нежелани лекарствени реакции.

Прием на Антидепреса с храни и напитки:

Не е препоръчително да приемате Антидепреса в комбинация с алкохол.

Осведомете Вашия лекуващ лекар за всички лекарства, които приемате или сте приемали наскоро, включително и тези, отпусканни без рецепт.

Бременност и кърмене:

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство.

Бременна ли сте, опитвате ли се да забременеете или кърмите ли? Ако е така, разговаряйте за рисковете и ползите с Вашия лекар преди да започнете да приемате Антидепреса.

Бременните жени не трябва да приемат Антидепреса, както и майките не трябва да кърмят бебетата си, докато вземат това лекарство.

Общото състояние на Вашето новородено бебе може да бъде засегнато от употребата на тази група лекарства (антидепресанти).

Поради тази причина НЕ трябва да приемате Антидепреса, особено в последните три месеца на бременността.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не се наблюдава определена зависимост между приема на Антидепреса и извършването на ежедневни дейности. Трябва да сте внимателни при шофиране, работа с машини, или извършване на дейности, за които е необходима повишена бдителност.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ АНТИДЕПРЕСА

Винаги приемайте Антидепреса точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

Следвайте указанията на Вашия лекуващ лекар.

Таблетките не трябва да се дъвчат, а да се приемат цели, с малко вода.

Възрастни

Антидепреса трябва да се прилага перорално като еднократна дневна доза от 20 mg до 60 mg дневно, приемана сутрин или вечер.

Лечение на паническо разстройство

През първата седмица се препоръчва еднократна дневна доза от 10 mg, която след това да бъде увеличена на 20 mg дневно. Дозата може да бъде допълнително увеличена до максимално 60 mg/ден в зависимост от индивидуалния терапевтичен отговор на пациента.

Пациенти в напредната възраст (>65 години)

При пациенти в напредната възраст обичайната дозата е между 20 и 40 mg дневно.

Приложение при деца:

Не се препоръчва приемането на Антидепреса.

Пациенти с намалена чернодробна функция:

Обичайната доза е не повече от 30 mg дневно.

Пациенти с намалена бъбречна функция:

При пациенти с лека до умерена степен на бъбречна недостатъчност не се налага корекция на дозата.



Всички гореспоменати дозировки са само препоръчителни, вашият лекар може да Ви предпише доза, различна от описаните, особено ако приемате Антидепреса за първи път.

Ако сте приели повече от необходимата доза Антидепреса

Ако случайно приемете повече таблетки, отколкото са Ви предписани се свържете незабавно с най-близкото болнично отделение или с лекуващия Ви лекар. Ако решите сами да отидете до болничното отделение вземете опаковката Антидепреса с Вас.

Симптомите на предозиране могат да включват:

- гадене (чувство на слабост)
- повръщане
- изпотяване
- сънливост
- посиняване на кожата
- припадъци
- безсъзнание
- ускорена сърдечна честота
- трепор

Ако сте пропуснали да вземете дозата Антидепреса

Ако забравите да вземете Антидепреса, не се притеснявайте! Не приемайте пропуснатите таблетки – вземете следващата доза в определеното за нея време и се върнете към предписаният Ви дозов режим.

Ако сте спрели приема на Антидепреса

Когато лечението се прекрати внезапно понякога се наблюдават нежелани лекарствени реакции. Най-често срещаните симптоми са гадене, главоболие, тревожност и замаяност. Затова лечението не трябва да се спира внезапно, а постепенно, в срок определен от лекуващия лекар. Нежеланите лекарствени реакции отшумяват бързо.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Антидепреса, както всяко друго лекарствено средство, може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Сериозните нежелани лекарствени реакции свързани с Антидепреса са обикновено краткотрайни и без тежки последствия. Обикновено те се наблюдават през първите две седмици на лечението, и отшумяват след подобряване на състоянието.

Докато приемате това лекарство могат да се появят някои от следните нежелани лекарствени реакции:

Често срещани:

- Засилено изпотяване, главоболие, умора, трепор и замаяност, особено през първите две седмици от лечението;
- Палпитации (неравномерно или тежко сърцебиене);
- Нарушения на съня, беспокойство и нервност;
- Гадене, чувство на сухота в устата, запек или диария;
- Зрителни смущения и обща слабост.

По-рядко срещани:

- Неразположение, общо чувство на апатия;
- Тревожност, обърканост, нарушена концентрация, повишено сънуване, загуба на паметта;
- Импотенция, смущения в еякулацията;



- Увеличено слюноотделение, ринит, промени във вкусовите рецептори;
- Промяна в телесната маса и/или промяна в апетита;
- Нарушено храносмилане, повръщане, коремна болка и подуване;
- Кожни обриви, сърбеж, изтръпване;
- Участен пулс, топли вълни, прималяване (особено след разко изправяне);
- Проблеми с уринирането или прекомерно уриниране.

Рядко срещани:

- Конвулсии, особено при пациенти страдащи от епилепсия;
- Болка в мускулите;
- Тинигус (пищене в ушите);
- Мания, чувство на възбуда и еуфория;
- Трескавост, кашлица;
- Повишено сексуално желание.

Други нежелани лекарствени реакции:

Пациенти, със склонност към развиване на панически разстройства може да забележат временно засилване на тревожността след започване на лечението. Това обикновено отшумява след първите две седмици на лечението.

Следните нежелани лекарствени реакции са били наблюдавани, но изключително рядко:

- **Организът като цяло:** Остри алергични реакции, включващи недостиг на въздух;
- **Храносмилателна система:** Ниски нива на натрий в кръвта, промени в отделянето на ADH хормон;
- **Мускулно-скелетна система:** Мускулни и ставни болки;
- **Чернодробна система:** Завишени резултати от тестове върху чернодробната функция;
- **Кожа и придатъци:** Ангиодема (подкожни подувания); ехимоза (кръвоизливни петна);
- **Нервна система:** Серотонинов синдром (състояние причинено от наднормено високи нива на серотонин в мозъка – симптомите включват обърканост, възбуда, тревожност);
- **Репродуктивна система:** Непрекъснато отделяне на мляко от млечните жлези;
- **Мозъчна дейност:** Халюциниране, хиперактивност, панически разстройства.

Моля, информирайте Вашия лекар за тези или други появили се при Вас нежелани лекарствени реакции!

5. КАК ДА СЪХРАНИВАТЕ АНТИДЕПРЕСА

Съхранявайте на място, недостъпно за деца!

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Не използвайте Антидепреса след срока на годност отбелаян върху картонената опаковка.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Антидепреса

- Активната съставка е циталопрам (като хидробромид).



- Другите съставки са: целулоза, микрокристална, лактоза, безводна, царевично нишесте, кополивидон, глицерол (85%), пречистена вода, кроскарамелоза натрий, магнезиев стеарат, опадри Y-1-7000.

Какво съдържа опаковката:

Всяка опаковка Антидепреса съдържа 3 блистера, всеки с по 10 филмирани таблетки.

Притежател на разрешението за употреба:

Чайкафarma Висококачествените Лекарства АД,
гр. София 1172, бул.“Г.М. Димитров” №1, България

Производител:

Чайкафarma Висококачествените Лекарства АД,
гр. Пловдив 4000, “Санкт Петербург” №53, България

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба:

« Чайкафarma Висококачествените Лекарства» АД
бул. «Г.М. Димитров» № 1
гр. София 1172, България

Тел.: +359 2 9625454
e-mail: info@tchaikapharma.com
Факс: 02 9603 703

Дата на последна редакция на листовката:

Ноември, 2011 г.

