

ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg пресовани таблетки за смучене
ANZIBEL Classic 5 mg / 4mg / 3 mg compressed lozenge
 (хлорхексидин хидрохлорид / бензокаин / еноксолон)
 (chlorhexidine hydrochloride / benzocaine / enoxolone)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация .

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт . Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след два дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg пресовани таблетки за смучене и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg пресовани таблетки за смучене
3. Как да приемате АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg пресовани таблетки за смучене
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg пресовани таблетки за смучене
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. **Какво представлява АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg пресовани таблетки за смучене и за какво се използва**

АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg представлява комбинация от хлорхексидин хидрохлорид, бензокаин и еноксолон.


АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg е показан за локално и временно симптоматично облекчаване на умерени инфекциозни и възпалителни състояния на устната кухина.

Ако след два дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ

2. **Какво трябва да знаете, преди да приемете АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg пресовани таблетки за смучене**

Не приемайте АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- Ако страдате от фенилкетонурия.



Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg.

Обърнете специално внимание при употребата на АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg , ако сте спортист – този продукт съдържа бензокаин, който може да даде положителни резултати при допинг тест.

Други лекарства и АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употреба на това лекарство.

Активните вещества на АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg могат да преминат в майчиното мляко. Ако приемате АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg не трябва да кърмите.

АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg съдържа сорбитол. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg съдържа ацесулфам калий. Това трябва да се има предвид при пациенти с намалена функция на бъбреците или при пациенти на диета с контролиран прием на калий.

3. Как да приемате АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg пресовани таблетки за смучене

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителна доза при възрастни и деца над 12 години:

1 таблетка за смучене през интервал от 2 до 3 часа. Максималната доза е 8 таблетки за смучене дневно.

Препоръчителна доза при деца между 6-12 годишна възраст:

1 таблетка за смучене през интервал от 4 до 5 часа. Максималната доза е 6 таблетки за смучене дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg

Ако сте приели повече от необходимата доза АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg , незабавно се свържете с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg

Ако сте пропуснали да приемете АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg вземете следващата таблетка, когато се сетите.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка. .

Ако сте спрели приема на АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



Рядко се наблюдават проява на общи алергични реакции, нарушения в храносмилателната система и обратима промяна във вкуса.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ):

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
Тел. +359 2 8903555
ел. поща: bda@bda.bg
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg пресовани таблетки за смучене

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C в оригиналната опаковка

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg

- Активните вещества са: хлорхексидин хидрохлорид, бензокаин, еноксолон.
- Другите съставки са: сорбитол, ацесулфам калий, магнезиев стеарат

Как изглежда АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg и какво съдържа опаковката

Бели, кръгли, двойноизпъкнали таблетки, едностранно гравирани с логото на фирмата NOBEL (η).

АНЗИБЕЛ Класик 5 mg / 4mg / 3 mg е опакован в блистери. Всеки блистер съдържа 10 таблетки.

Размер на опаковката:

10 таблетки (1 блистер)

20 таблетки (2 блистера)

30 таблетки (3 блистера)

Притежател на разрешението за употреба и производител

НОБЕЛ ФАРМА ЕООД

бул. Симеоновско шосе № 24

София 1700, България



Телефон: +359 2 962 62 80
Факс: +359 2 962 90 36
Електронна поща: info@nobelpharma.bg

Дата на последно преразглеждане на листовката: 05. 2014 г.

