

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

АРГОСУЛФАН 20 mg/g крем
ARGOSULFAN 20 mg/g cream

2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 g крем съдържа 20 mg сребърен сулфатиазол.

За пълния списък на помощните вещества вж. т. 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Крем

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4. 1 Терапевтични показания

- Лечение на всички степени кожни изгаряния (вкл. радиационни)
- Лечение на декубитални язви.
- Лечение на хронични улцерации на подбедрицата.

4. 2 Дозировка и начин на приложение

Аргосулфан крем може да се използва по открит метод или под оклузивна превръзка.

При изгаряния

След почистване и хирургична подготовка на раната, при спазване изискванията за стерилност, се нанася слой с дебелина 2-3 mm. Кремът трябва да се прилага до възстановяване на увредения участък или до трансплантиране на кожа.

При язви от залежаване и хронични улцерации на подбедрицата

Тънък слой от крема се нанася върху патологично изменените области 2-3 пъти дневно. При приложение върху инфицирани рани е възможна поява на ескудат. В такъв случай, преди повторното нанасяне на крема, раната трябва да бъде промита с 0,1% воден разтвор на хлорхексидин или 3% воден разтвор на борна киселина.

Хора в напреднала възраст

Не е необходима промяна на дозата.

Деца

Лекарственият продукт да не се прилага на недоносени, новородени и кърмачета под два месеца, тъй като съществува рисък от засилване на жълтеницата на новороденото. При по-големи деца не е необходима промяна на дозировката.

Пациенти с бъбречна недостатъчност

Поради липсата на клинични изследвания, приложението на лекарствения продукт при пациенти с бъбречна недостатъчност трябва да се извършва с особено внимание. Необходим е контрол на серумните нива на Silver sulphathiazole при пациенти с ~~тежка~~ бъбречна недостатъчност.

Пациенти с чернодробна недостатъчност

Поради липсата на клинични изследвания, приложението на лекарствения продукт при пациенти с чернодробна недостатъчност трябва да се извършва с особено внимание.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1	
Към Раз. №	20020311
Разрешение №	22 972 , 30.07.2013
Одобрение №	



4.3 Противопоказания

- Свръхчувствителност към сулфатиазол и други сулфонамиди
- Вродена недостатъчност на глюкозо-6-фосфатдехидрогеназа
- Да не се прилага при недоносени бебета, новородени и кърмачета на възраст под два месеца.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

- Възможно е развитието на кръстосани алергии с деривати на сулфанилурея,ベンゾтиазиди, р-аминосалицилова киселина. Argosulfan съдържа methyl- и propylhydroxybenzoate, които могат да предизвикат алергични реакции.
- Да се прилага с внимание при пациенти в шок или при трудно контактни пациенти със сериозни изгаряния.
- Ниската разтворимост на Silver sulphathiazole позволява поддържане на постоянна концентрация в раната. С оглед минималната резорбция, тя е безопасна за човешкия организъм, но при продължително прилагане са възможни нежелани лекарствени реакции (вж. т.4.8.). Продължителността на прилагането на продукта зависи от вида и големината на увреждането, а също и от състоянието на пациента и се определя от лекаря. По време на продължително приложение , трябва да се наблюдават нивата на серумния сулфонамид, най-вече при пациенти с бъбречни или хепатални нарушения, поради опасност от кумулиране.

4.5 Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Дериватите на фолиевата киселина или р-аминобензоената киселина (например прокайн) могат да отслабят антбактериалния ефект на Silver sulphathiazole

4.6 Бременност и кърмене

Бременност

Не са провеждани задълбочени изследвания при хора.

Не се препоръчва употреба по време на бременност, освен в случаите, когато терапевтичната полза превишава риска за плода.

Кърмене

Не е известно дали при локално приложение продуктът преминава в кърмата.

Не се препоръчва да се кърми по време на употреба на Argosulfan крем.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не уврежда психомоторните функции, няма ефект върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

- Обикновено Argosulfan крем се понася добре. В някой случай са възможни симптоми на дразнене, проявящи се като усещане за парене на мястото на приложението.
- По време на продължително използване могат да се появят хепатални или бъбречни разстройства.
- В крайно редки случаи може да се стигне до увреждане хемopoетичната система, ексфолиативен дерматит или алергични реакции.

4.9 Предозиране

Не се наблюдава при локално приложение.



5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: химиотерапевтици за локално приложение; сулфонамиди
АТС код: D 06 BA 02

- Silver sulphathiazole се получава при химично взаимодействие между сребърен нитрат и натриев сулфатиазол. Механизът на неговата антибактериална активност включва подтискане на бактериалния растеж и пролиферация чрез компетитивен антагонизъм с р-аминобензоената киселина и подтискане синтеза на фолиева киселина, която е незаменима за бактериалния биосинтез на пуринови нуклеотиди.
- Благодарение на олгодинамичните свойства на среброто, бактерицидната активност на сулфатиазола е значителна при едновременно намалена алергенната такава.
- Аргосулфан притежава широк спектър на действие срещу смесена бактериална флора (както Gram (+), така и Gram (-) бактерии, включително *Pseudomonas aeruginosa*). Има лек адстрингентен ефект при локално приложение.
- Трябва да се подчертва, че Silver sulphathiazole притежава активност и срещу херпес симплекс вирус и варицела- зостер вирус. Аргосулфан напълно инактивира и значително намалява екстрацелуларната контагиозност на херпесните вируси.
- Лекарственият продукт Аргосулфан, освен антибактериален ефект притежава и успокояващо действие като елиминира болката и чувството за парене в зоната на раната, което значително намалява степента на стреса след изгаряне. Аргосулфан крем ефективно предпазва изгарянията от инфекции, като формира ефективен филър, осигурява с подходящо овлажняване и ускорява заздравяването.
- Хидрофилният носител на продукта осигурява подходящо овлажняване, съдейства за заздравяването на раната и има успокояващ ефект. Локално приложен, Аргосулфан не причинява потъмняване на кожата или бельото.

5.2 Фармакокинетични свойства

Silver sulphathiazole се характеризира с висока стабилност и по-ниска разтворимост в сравнение с други сребърни съединения на сулфонамиди, което осигурява от една страна поддържане на необходимата бактерицидна концентрация на активната субстанция в раната, а от друга страна предпазва от абсорбиране в системното кръвообращение, и по този начин осигурява добра толерантност на лекарствения продукт и липса на токсичност. Това е от особено значение при продължително лечение.

Не се разгражда от светлината.

След системна абсорбция, се ацетилира в черния дроб и се елиминира с урината под формата на неактивни метаболити и частично в непроменена форма. Абсорбцията на сребърния сулфатиазол се увеличава след прилагане върху обширна наранена повърхност.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Перорално или подкожно приложение на сулфадиазин на мишки в доза от 1050 mg/kg за 30 дни не е предизвикало появата на някакви токсични симптоми. Освен това няма предклинични данни, които да са от значение за хората, лицензиранi да предписват лекарствени продукти, които да не са споменати в други раздели на тази характеристика на продукта.



6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

◆ Liquid paraffin	20.0 mg
◆ Cetosearyl alcohol	84.125 mg
◆ White petrolatum	75.9 mg
◆ Sodium lauryl sulphate	10. mg
◆ Glycerol	53.3 mg
◆ Methyl hydroxybenzoate	0.66 mg
◆ Propyl hydroxybenzoate	0.33 mg
◆ Monobasic potassium phosphate	1.178 mg
◆ Dibasic sodium phosphate	13.052 mg
◆ Water for injection	up to 1.0 g

6.2 Несъвместимости

Не се препоръчва едновременно приложение с други лекарствени продукти.

6.3 Срок на годност

Две години.

Срок на годност след първо отваряне на тубата – може да се съхранява не повече от 30 дни.

Преди прилагането на лекарствения продукт да се провери срокът на годност върху опаковката. Да не се прилага след изтичане срока на годност.

6.4 Специални условия за съхранение

Да се съхранява под 25°C.

Да не се замразява.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

6.5 Данни за опаковката

Тубичка, 40 g, опакована в ламинирана картонена кутия с всички необходими означения и информационна листовка.

Пропиленов контейнер, 400 g.

6.6 Препоръки при употреба

При всички случаи на употреба на Аргосулфан крем е задължителна проверка на чувствителността към лекарствени продукти, особено към сулфонамиди.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Pharmaswiss Česká republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Чешка Република

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

20020311



**9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА
УПОТРЕБА**

03.04.2002

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

