

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**  
**КАФЕТИН® ФОРТЕ таблетки**  
**CAFFETIN® FORTE tablets**

**Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 3 до 5 дни употреба.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Кафетин форте и за какво се използва
2. Преди да приемете Кафетин форте
3. Как да приемате Кафетин форте
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Кафетин форте
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Към Ред. № .....	Разрешение № .....
22.10.162	
Разрешение № .....	5. 10. 2011
Софтуер № .....	

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАФЕТИН ФОРТЕ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

Кафетин форте е комбинирано противоболково лекарство. Доказан е болкоуспокояващ ефект за парацетамол, пропифеназон и кодеин, като при кофеин техният ефект се подобрява. Кафетин форте може да се използва при главоболие, зъбобол, мигрена, следоперативна и посттравматична болка, невралгия, ишиалгия, мускулни и менструални болки.

**2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КАФЕТИН ФОРТЕ**

**Не приемайте Кафетин форте**

- Ако сте имали алергична реакция към това лекарство или към някоя от съставките;
- Ако страдате от тежко чернодробно или бъбречно заболяване;
- Ако страдате от порфирия или от липса на ензима глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа (рядки наследствени метаболитни разстройства);
- Ако сте бременна или кърмите.

Кафетин форте не бива да се приема от деца под 12 год. възраст.

**Обърнете специално внимание при употребата на Кафетин форте**

- Ако страдате от бъбречни, чернодробни или хронични респираторни заболявания включително астма;
- Ако страдате от заболявания на кръвта;
- Ако имате пептична язва или кървене от stomashno-chrevния тракт;
- Ако имате алергия към други болкоуспокояващи;



- Ако злоупотребявате с алкохол;
- Ако изпитвате тревожност, раздразнителност или ако имате тремор (треперене), артериална хипертония или безсъние.

Лекарството може да се употребява от деца над 12 год. възраст.

### Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или накърно сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

От изключително значение е, ако вземате някое от следните лекарства:

- Лекарства, съдържащи парацетамол или кофеин;
- Седативни средства, антидепресанти или противоепилептични средства;
- Лекарства, които «разреждат» кръвта;
- Други болкоуспокояващи или противоревматични средства;
- Рифампицин, изониазид (антибактериални средства за лечение на туберкулоза).

### Прием на Кафетин форте с храни и напитки

Таблетките Кафетин форте могат да се приемат без съобразяване с храненето. По време на лечение с Кафетин форте не бива да приемате алкохолни напитки.

### Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Таблетките Кафетин форте не бива да се приемат по време на бременността и в периода на кърмене.

### Шофиране и работа с машини

Кафетин форте, приложен в лечебни дози не повлиява уменията за шофиране и работа с машини. Необходимо е внимание обаче, когато се приемат максималните дневни дози (6 таблетки дневно), особено в комбинация с алкохол.

## 3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КАФЕТИН ФОРТЕ

Винаги приемайте Кафетин форте точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Кафетин форте не е предназначен за продължителен прием (не повече от 3-5 дни).

Обичайната доза е:

*Възрастни и деца над 16 год. възраст:* еднократната доза е 1-2 таблетки в зависимост от интензивността на болката. Тази доза се приема три пъти дневно. Максималната дневна доза е 6 таблетки.

*Деца 12-16 год. възраст:* ½-1 таблетка, като тази доза е с възможност за прием три пъти дневно.

### Ако сте приемали повече от необходимата доза Кафетин форте

Ако сте приемали повече от необходимото, незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

### Ако сте пропуснали да приемете Кафетин форте

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



## 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Кафетин форте може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Лечебните дози кафетин форте се понасят добре. Възможните странични ефекти се появяват много рядко или при лечение с високи дози и са следните: гадене, повръщане, стомашно-чревни разстройства; раздразнителност, нервност, безсъние, сърцевиене, тахикардия (участен сърдечен ритъм), чернодробни и бъбречни функционални разстройства, зависимост. Ако се появи алергична реакция (обрив по кожата, уртикария, подпухване или затруднено дишане), както и повишена температура едновременно с болки в гърлото, разраняване и гнойно възпаление в устата и перианалната област, преустановете приема на лекарството и веднага потърсете медицинска помощ. Тези симптоми могат да са проява на сериозна нежелана реакция, която се случва изключително рядко.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

## 5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КАФЕТИН ФОРТЕ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Не използвайте Кафетин форте след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка (за отбелязване срока на годност са използвани съкращения). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

### Какво съдържа Кафетин форте

- Активните вещества са: парацетамол, пропифеназон, кофеин и кодеинов фосфат сесквихидрат.
- Всяка таблетка съдържа: 250 mg парацетамол, 210 mg пропифеназон, 50 mg кофеин и 10 mg кодеинов фосфат сесквихидрат.
- Другите съставки са: калциев хидрогенфосфат дихидрат; целулоза, микрокристална; повидон; кроскармелоза натрий; силициев диоксид, колоиден безводен; натриев нишестен гликолат (тип A); глицеролов диглицерил; натриев лаурилсулфат; магнезиев стеарат.

### Как изглежда Кафетин форте и какво съдържа опаковката

Кафетин форте са бели, кръгли, плоски таблетки с фасетка с разделителна линия от едната страна и с търговската марка на производителя Алкалоид , отпечатан от другата страна на таблетката.

Таблетките Кафетин форте са опаковани в ленти от AL/PE фолио като всяка лента съдържа 6 или 10 таблетки.

Картонената кутия съдържа 1 лента с по 6 таблетки или 1 лента с по 10 таблетки, или 2 ленти с по 6 таблетки и листовка с информация за потребителя.



**Притежател на разрешението за употреба и производител**

*Производител*

ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4,  
1231 Ljubljana - Črnuče  
Р. Словения

За всяка въпроси относно това лекарство, моля, обръщайте се към Притежателя на разрешението за употреба:

*Притежател на разрешението за употреба*

АЛКАЛОИД ЕООД

ж.к. "Мотописта" 2

ул. "Рикардо Вакарини" 2 , ет. 3, ап.10

гр. София 1404, България

тел. +359 2 8081081

+359 2 8081099

факс: +359 2 9589367

e-mail: office@alkaloid.bg

**Дата на последно одобрение на листовката** \_\_\_\_\_

