

Намален вътресъдов обем

Начална доза от 4 mg може да се има предвид при рискови за развитие на хипотония пациенти, като например такива с евентуално обемно изчерпване (вж. точка 4.4).

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, включително и такива на хемодиализа, началната доза е 4 mg. Дозата трябва да се титрира в зависимост от отговора. Опитът при пациенти с много тежка или терминална бъбречна недостатъчност ($Cl_{cr} < 15 \text{ ml/min}$) е ограничен (вж. точка 4.4).

Увредена чернодробна функция

При пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане се препоръчва начална доза 4 mg еднократно дневно. Дозата трябва да се коригира в зависимост от отговора. Карзап е противопоказан при пациенти с тежко чернодробно увреждане и/или холестаза (вж. точки 4.3 и 5.2).

Чернокожи пациенти

При чернокожи пациенти антихипертензивният ефект на кандесартан е по-слабо изразен, отколкото при не-чернокожи пациенти. Следователно при чернокожи пациенти, в сравнение с не-чернокожи пациенти, за постигане на контрол на артериалното налягане може по-често да се налага възходящо титриране на дозата на Карзап и едновременно прилаганите лекарствени продукти (вж. точка 5.1).

Педиатрична популация

Деца и юноши на възраст от 6 до 18 години:

Препоръчваната начална доза е 4 mg веднъж дневно.

- При пациенти с тегло $< 50 \text{ kg}$: При пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно, дозата може да бъде увеличена до максимум от 8 mg веднъж дневно.
- При пациенти с тегло $\geq 50 \text{ kg}$: При пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно, дозата може да бъде повишена до 8 mg веднъж дневно и след това до 16 mg веднъж дневно, ако е необходимо (вж. точка 5.1).

Дози, надвишаващи 32 mg не са били проучвани при педиатрични пациенти.

В по-голямата си част антихипертензивният ефект се постига в рамките на 4 седмици.

При деца с възможен намален интраваскуларен обем (напр. пациенти, лекувани с диуретици, особено тези с нарушена бъбречна функция), лечението с Карзап трябва да бъде започнато под стриктно медицинско наблюдение и е необходимо да се обмисли по-ниска от посочената по-горе начална доза (вж. точка 4.4).

Карзап не е проучван при деца със степен на гломерулна филтрация по-малка от $30 \text{ ml/min/1.73m}^2$ (вж. точка 4.4).

Чернокожи педиатрични пациенти

Антихипертензивният ефект на кандесартан е по-малко изявен при чернокожи пациенти в сравнение с не-чернокожи пациенти (вж. точка 5.1).

Деца на възраст от 1 година до 6 години

Безопасността и ефикасността при деца на възраст от 1 до 6 години не е установена. Наличните към момента данни са описани в точка 5.1, но не могат да бъдат направени препоръки относно дозировката.

Карзап е противопоказан при деца на възраст под 1 година (вж. точка 4.3).

Дозировка при сърдечна недостатъчност

Обичайната препоръчителна начална доза на Карзап е 4 mg еднократно дневно. Възходящото титриране до таргетната доза от 32 mg еднократно дневно (максимална доза) или до



