

Листовка: информация за пациенти

Кат. №

20010663

Цилест 0,250 mg / 0,035 mg таблетки

Приложение №

20685

07.01.2013

Cilest 0,250 mg / 0,035 mg tablets

Норгестимат (norgestimate) / Етинилестрадиол (Ethinylestradiol)

Обозначение №

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Цилест и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Цилест
3. Как да приемате Цилест
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цилест
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Цилест и за какво се използва

Цилест е нискодозиран хормонален комбиниран перорален контрацептив, който се използва за предпазване от бременност.

Всяка таблетка съдържа два вида женски хормони – норгестимат и етинилестрадиол.

Цилест предотвратява отделянето на яйцеклетка от Вашите яйчници и така Вие не можете да забременеете. Освен това, Цилест прави секрета (мукуса) във Вашето влагалище по-гъст, което затруднява спермата да проникне в матката. Контрацептивният ефект започва след първата приета таблетка.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Цилест

Не приемайте Цилест

- ако сте алергични към норгестимат, етинилестрадиол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Вие не трябва да употребявате Цилест таблетки, ако имате, сте имали или развиете някое от следните състояния:

- кръвен съсирек в кръвоносен съд на крака (тромбоза), в белия дроб (белодробна емболия) или други органи, или възпаление на вените (тромбофлебит)
- сърдечен пристъп или удар
- заболяване, което може да бъде показател за сърдечен пристъп в бъдеще (например: гръдна жаба, която предизвиква остра болка в гърдите) или удар (например: прекарване „мини удар“ без последствия или преходни исхемични атаки (ПИА))
- мигрена с аура (т.нар. огнищни неврологични симптоми)
- заболяване във Вашето семейство, което засяга съсирването на Вашата кръв
- увредена сърдечна клапа с усложнения



- постоянно високо кръвното налягане (160/100 mmHg или повече)
- диабет, засегнал кръвоносните съдове
- заболяване, което увеличава риска от съсиреци (тромбоза), например голяма операция, всяка операция на Вашите крака, тежка травма или продължително залежаване на легло
- тежко чернодробно заболяване, ако стойностите на чернодробните функции не са се възстановили до нормалните граници
- чернодробни тумори (доброкачествени или злокачествени)
- диагностициран или предполагаем рак на гърдата или на половите органи
- необичайно нарастване на вътрешния слой на матката (ендометриална хиперплазия)
- необяснимо кървене от влагалището.
- жълтеница, свързана с бременността или с предишна употреба на хормонални контрацептиви.

Не приемайте Цилест, ако сте:

- бременна или мислите, че може да сте бременна
- в менопауза.

Предупреждения и предпазни мерки:

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Цилест.

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да започнете употребата на Цилест таблетки и ги уведомете ако някое от следните състояния се отнася за Вас, тъй като той/тя трябва да изясни дали Вие можете да приемате перорални контрацептиви и може да се наложат по-чести прегледи по време на употребата на Цилест таблетки. Консултирайте се с Вашия лекар, ако някое от изброените по-долу състояния се отнася за Вас или следните състояния се развият или влошат:

- ако страдате от клапно сърдечно заболяване (без усложнения) или сърдечни аритмии
- ако страдате от васкулит (повърхностен флебит)
- ако страдате от разширени вени
- ако Вашите родители или някой от Вашите братя/сестри имат анамнеза за кръвни съсиреци, инфаркт или инсулт
- ако сте пушачка (особено ако сте на възраст над 35 години)
- ако страдате от диабет
- ако сте с наднормено тегло
- ако имате високо кръвно налягане (>140/90) или кръвното Ви налягане се повишава
- ако страдате от мигрена
- ако страдате от епилепсия
- ако Вие, Вашите родители или братя/сестри имате анамнеза за високи нива на липиди (холестерол, триглицериди) в кръвта
- ако имате проблеми с черния дроб или заболяване на жлъчния мехур
- ако страдате от болестта на Крон или улцерозен колит (хронично възпалително чревно заболяване)
- ако имате или сте имали хлоазми (жълто-кафяви области от кожата, пигментни петна по време на бременност, най-вече по лицето). Ако това се случи, избягвайте излагането на слънчева светлина и ултравиолетови лъчи
- ако имате нарушение в кръвосъсирването (например дефицит на протеин С).

Ако някое от тези състояния се появи или влоши по време на употребата на Цилест, трябва да потърсите съвета на лекар.

Спрете употребата на Цилест таблетки и незабавно се свържете с лекар, ако развиете някое от следните симптоми на ангиоедем:

- подуване на лицето, езика или гърлото
- затруднено преглъщане
- уртикария или затруднено дишане.



Цилест таблетки и венозни и артериални съсиреци

Случаите на образуване на кръвни съсиреци са редки и може да се появят независимо от употребата на комбинирани перорални контрацептиви. И все пак рискът е по-голям при жените, употребяващи комбиниран перорален контрацептив. Рискът от развиване на тромбоза е по-голям по време на бременност, отколкото при употребата на комбинирани перорални контрацептиви.

Ако във вена на крака се образува съсирек (дълбока венозна тромбоза или ДВТ) и се придвижи с кръвния поток до белите дробове, той може да предизвика болка в гърдите, задух, и в редки случаи може да доведе до трайна инвалидност или дори да причини смърт. Това се нарича „белодробна емболия“ и е много рядка.

Начинът, по който Цилест влияе върху риска от тромбоемболизъм, в сравнение с другите перорални контрацептиви, не е известен.

Рискът от съсиреци във вената при употребяващи комбинирани перорални контрацептиви нараства

- с нарастване на възрастта
- ако някой Ваш близък роднина някога е имал съсирек в крака, белия дроб (белодробен емболизъм) или друг орган
- ако имате наднормено тегло
- ако сте претърпели операция, ако сте имали тежка травма или продължително залежаване на легло. Информирайте Вашия лекар, че приемате Цилест таблетки тъй като може да се наложи да спрете употребата на противозачатъчни таблетки. При планирана операция се препоръчва да спрете приема на перорални противозачатъчни поне 4 седмици преди операция и да не възстановявате приема 2 седмици след приключване на възстановителния период.

В редки случаи кръвният съсирек може да се образува в артерия (артериална тромбоза), например в сърцето (инфаркт) или мозъка (инсулт). В много редки случаи кръвният съсирек може да се образува в черния дроб, червата, бъбреците или очите.

Рискът от съсиреци в артериите при употребяващи комбинирани перорални контрацептиви нараства

- с нарастване на възрастта
- ако пушите. Строго Ви се препоръчва да спрете да пушите, когато приемате Цилест, особено ако сте на възраст над 35 години
- ако имате повишени стойности на мазнини в кръвта си (холестерол или триглицериди)
- ако имате наднормено тегло
- ако имате високо кръвно налягане
- ако имате проблеми със сърцето (клапни нарушения или нарушения на сърдечния ритъм, наречени предсърдни фибрилации)
- ако някой Ваш близък роднина някога е имал сърдечен пристъп или удар.

Ако имате подозрения за тромбоза или тромбоемболизъм, незабавно се свържете с лекар и спрете употребата на контрацептивните таблетки. Симптомите на венозна или артериална тромбоза може да включват:

- неочаквано подуване, зачервяване или болка в крака
- неочаквана силна болка в гърдите, която може да се разгърне или не към лявата ръка
- неочакван задух
- неочакван пристъп на кашлица
- необичайно, тежко, продължително главоболие или влошаване на мигрената
- всяка неочаквана промяна в зрението (като например частична или пълна загуба на зрението, замъглено зрение или двойно виждане)



- затруднен или забавен говор
- световъртеж
- припадъци, които може да са свързани с пристъпи
- слабост или силно изразено схващане, които неочаквано се появяват от едната страна или в една част от тялото
- двигателни нарушения
- остри болки в корема.

Контрацептивни таблетки и рак

Рискът от рак на гърдата принципно се увеличава с възрастта. Рискът от рак на гърдата е до известна степен по-висок при употребата на перорални контрацептиви. В сравнение с риска от рак на гърдата в определен период от живота, увеличеният риск, свързан с употребата на перорални контрацептиви, е малък. Прекомерният риск от рак на гърдата постепенно намалява за период от 10 години след края на употребата на перорални контрацептиви.

Диагностицираният рак на гърдата при жени, употребяващи перорални контрацептиви, не е в по-напреднал стадий, отколкото при жените неупотребяващи такива.

В редки случаи се съобщава за доброкачествени чернодробни тумори и за още по-редки случаи на злокачествени чернодробни тумори при жени, употребяващи перорални контрацептиви. Туморите може да причинят животозастрашаващ вътрешен кръвоизлив. Ако изпитате неочаквани, силни стомашни болки, свържете се с Вашия лекар.

При продължителна употреба на перорални контрацептиви по-често се съобщава за възникване на рак на шийката на матката. Това не винаги се дължи на употребата на перорални контрацептиви и може да е свързано със сексуалното поведение или други фактори.

Кръвотечение между циклите

През първите няколко месеца след започване на лечението с Цилест, Вие може да получите неочаквано кръвотечение (извън паузата от 7 дни). Ако това кръвотечение продължи повече от първите няколко месеца или започне след няколко месеца, Вашият лекар трябва провери дали нещо не е наред.

Пропуснати цикли

Ако сте взимали таблетките правилно, не сте повръщали или не сте имали тежка диария, и не сте приемали други лекарства, е много малко вероятно да сте бременна. Обаче, ако менструалният Ви цикъл отсъства два последователни месеца, трябва да се прегледате при гинеколог и да си направите тест за бременност преди да продължите приема на Цилест. Ако сте пропуснали да приемете таблетки, обърнете се към здравен специалист преди първия отсъстващ менструален цикъл.

Кръвните нива на някои хранителни вещества като фолиева киселина могат да бъдат по-ниски при жени, използващи перорални контрацептиви. Това може да бъде важно за жени, които са забременявали малко след спирането на пероралните контрацептиви.

По време на бременност, както и по време на употреба на перорални противозачатъчни могат да възникнат или да се влошат следните състояния, но връзката им с употребата на противозачатъчни таблетки не е потвърдена:

- жълтеница и/или сърбеж, свързан със запушване на жлъчните пътища (холестаза)
- камъни в жлъчката
- порфирия (повишена секреция на пигмент в кръвта)
- системен еритематозен лупус – вид заболяване на съединителната тъкан
- хемолитичен уремичен синдром – заболяване на кръвта, което уврежда бъбреците
- хорея на Sydenham
- гестационен херпес (рядко кожно заболяване, възникващо по време на бременност)
- отосклероза (вид загуба на слуха).



Жените, употребяващи перорални контрацептиви, трябва да преминават редовни медицински прегледи. Честотата на прегледите зависи от възможния риск контрацептивът да повлияе на дадено състояние или заболяване.

Подобно на другите контрацептиви Цилест *не предпазва* от HIV инфекции (СПИН) или други заболявания, предавани по полов път.

Други лекарства и Цилест

Някои други лекарства може да повлияят на ефикасността на лечението с Цилест или Цилест може да повлияе на ефикасността на някои други лекарства.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Това е от особено значение, ако те включват:

- лекарства, против припадъци (напр. барбитурати, карбамазепин, фелбамат, окскарбазепин, фенитоин, топирамат и ламотрижин)
- (фос)апрепитант (лекарство за лечение на гадене)
- противогъбични лекарства (напр. гризеофулвин, итраконазол, кетоконазол, вориконазол и флуконазол)
- някои антиретровирусни лекарства за лечение на HIV/СПИН (ритонавир); някои HIV протеазни инхибитори (напр. атазанавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир, подсилени с ритонавир протеазни инхибитори), някои нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (напр. етравирин, невирапин)
- лекарства, предпазващи от високи нива на мазнини в кръвта (аторвастатин, розувастатин, клофибринова киселина)
- лекарства за облекчаване на болката (парацетамол, морфин, еторисоксиб)
- бозентан (лекарство за лечение на белодробна хипертония)
- модафинил (лекарство за лечение на прекомерна сънливост)
- циклоспорин (лекарство, потискащо имунната система за предотвратяване отхвърлянето на присадки след трансплантация)
- омепразол (лекарство за лечение на гастрит и киселони)
- рифабутин, рифампицин (лекарства за лечение на туберкулоза)
- преднизолон (противовъзпалително лекарство)
- теофилин (лекарство за лечение на астма)
- темазепам (успокоително лекарство)
- селегилин (лекарство за лечение на Паркинсонова болест)
- тизанидин (лекарство за лечение на множествена склероза [МС]).

Употребата на активен въглен или колесевелам може да отслаби ефекта на контрацептивните лекарства.

Трябва също така да информирате Вашия лекар, ако употребявате продукти на билкова основа, съдържащи жълт кантарион (*Hypericum perforatum*), тъй като той отслабва ефекта на контрацептивните лекарства.

Цилест с храна и напитки

Не пийте сок от грейпфрут докато приемате Цилест.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност



Не употребявайте Цилест по време на бременност. Ако забременеете, прекратете употребата на контрацептиви и се свържете с Вашия лекар. Уведомете Вашия лекар, ако сте употребявали Цилест таблетки по време на бременност.

Кърмене

Възможно е употребата на Цилест по време на кърмене да има ефект върху бебето. Затова не трябва да употребявате Цилест по време на кърмене, освен ако Вашият лекар не Ви го е предписал изрично. Кърмещите майки трябва да следят обема на кърмата, тъй като Цилест може да намали нейното количество.

Шофиране и работа с машини

Няма известни ефекти.

Цилест съдържа лактоза монохидрат.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете Цилест.

3. Как да приемате Цилест

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Контрацептивният ефект започва след първата приета таблетка.

Всяка календарна опаковка съдържа 21 таблетки.

Първи цикъл на лечение. Започнете приема на лекарството в първия ден от Вашия менструален цикъл. Продължете да приемате по 1 таблетка дневно (таблетките трябва да се приемат в последователен ред, за да може да следите дали взимате таблетка всеки ден). Таблетките трябва да се приемат приблизително по едно и също време всеки ден, например вечер.

Когато са приети всички таблетки от календарната опаковка, се прави пауза от 7 дни, по време на която обикновено се появява менструация. Дори и при липсата на менструация след 7-дневния период без лечение, трябва да започнете нов цикъл на лечение с нови 21 таблетки.

Втори и следващи цикли на лечение. Започнете следващия цикъл на лечение/календарна опаковка в същия ден от седмицата, както и в предходния цикъл. Ако и след втория цикъл на лечение липсва менструация, свържете се с Вашия лекар.

Закъснение на менструалния цикъл. След приема на всички таблетки от опаковката, започнете нова опаковка за необходимия брой дни. След това направете 7-дневна пауза, последвана от нова опаковка с 21 таблетки с нов начален ден.

Пробивно кръвотечение. В случай на пробивно кръвотечение или зацапване лечението трябва да продължи. Това кръвотечение често изчезва след няколко цикъла. Ако пробивното кръвотечение персистира, свържете се с лекар/здравен специалист.

Какво трябва да се предприеме в случай на повръщане или тежка диария? Ако се появи повръщане в рамките на 3 часа след приема на хапчето или в случай на тежка диария, продължаваща повече от 24 часа, ефективността на контрацепцията може да не е адекватна. Вие трябва да използвате допълнителен нехормонален метод на контрацепция (например презерватив) в продължение на 7 дни след възстановяването. Ако повръщането или диарията продължават, трябва да се свържете с Вашия лекар или друг здравен специалист.

Ако сте приели повече от необходимата доза Цилест



Ако сте взели повече от необходимата доза Цилест или ако например дете е погълнало лекарството случайно, обадете се на Вашия лекар, в болница, в Център за спешна медицинска помощ или на тел. 112, за да бъдат оценени рисковете и да получите указания какво да предприемете.

Ако сте пропуснали да приемете Цилест

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата еднократна доза.

- Ако сте закъснели да вземете таблетката с **по-малко от 12 часа**, контрацептивният ефект не е намалял. Вземете пропуснатата таблетка, веднага щом се сетите и продължете приема на следващите таблетки в обичайното време.
- Ако сте закъснели да вземете таблетката с **повече от 12 часа**, контрацептивният ефект може да е намалял. Колкото повече таблетки пропуснете, толкова по-голям е рискът от намаляване на контрацептивния ефект. Рискът от бременност е особено голям, ако пропуснете таблетка в началото или в края на една календарна опаковка. Затова трябва да направите следното:

Пропуснати повече от 1 таблетка от календарна опаковка:

Консултирайте се с Вашия лекар.

Пропусната 1 таблетка през седмица 1

Вземете пропуснатата таблетка, веднага щом се сетите, дори това да означава да вземете две таблетки едновременно. Вземете следващата таблетка в обичайното време и не забравяйте да използвате допълнителен метод на контрацепция (различен от хормонален контрацептив, например презерватив) през следващите 7 дни. Ако сте имали полов контакт през изминалата седмица, е възможно да сте бременна и трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар.

Пропусната 1 таблетка през седмица 2

Вземете пропуснатата таблетка, веднага щом се сетите, дори това да означава да вземете две таблетки едновременно. Вземете следващата таблетка в обичайното време. Ако сте взимали таблетките правилно през 7-те дни, предхождащи пропуснатата таблетка, контрацептивният ефект на таблетките не е намалял и не се налага да използвате допълнителен контрацептивен метод.

Пропусната 1 таблетка през седмица 3

Вие може да изберете една от следните възможности:

1. Вземете пропуснатата таблетка, веднага щом се сетите, дори това да означава да вземете две таблетки едновременно. Вземете следващата таблетка в обичайното време. Не правете пауза между двете опаковки и веднага започнете приема на таблетките от следващата календарна опаковка. Малко вероятно е да получите обичайното междинно кървене преди края на втората календарна опаковка. Може обаче да получите зацапване или пробивно кръвотечение, докато взимате таблетките от втората календарна опаковка.
2. Прекратете приема на таблетките от настоящата календарна опаковка и започнете нова опаковка след 7-дневна пауза без прием на таблетки (включително и деня, в който сте пропуснали таблетката).

Ако сте пропуснали да приемете таблетки от календарната опаковка и не сте получили междинно кървене през първия нормален интервал без прием на таблетки, може да сте бременна. Трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да продължите употребата на таблетките от новата календарна опаковка.

Ако сте спрели приема на Цилест

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При Цилест се съобщават следните нежелани реакции:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на всеки 10 души):

- главоболие
- гадене, повръщане и диария
- вагинално кървене между менструалните цикли
- болезнена менструация
- необичайно междинно кървене (напр. ранна менструация).

Чести (може да засегнат повече от 1 на всеки 100 души):

- пикочна инфекция
- вагинална инфекция
- алергична реакция
- подуване поради задържане на твърде много вода (задържане на течности)
- проблеми с настроението като депресия
- промени в настроението
- затруднен сън
- нервност
- мигрена
- лек световъртеж
- болки в стомаха
- издуване на корема
- запек
- газове
- акне
- обрив
- мускулни спазми
- болки в крайниците
- болки в гърба
- един или повече пропуснати менструални цикли
- вагинално течение
- болки в гърдата
- болки в гръдния кош
- отичане
- усещане на умора или слабост
- покачване на теглото.

Нечести (може да засегнат повече от 1 на всеки 1 000 души):

- абнормна цитонамазка
- покачване или намаляване на теглото
- намален или повишен апетит
- тревожност
- промени в либидото
- загуба на съзнание
- усещане за парене
- изтръпване или мравучкане по кожата
- проблеми със зрението
- сухота в очите
- сърцебиене



- образуване на кръвен съсирек в белия дроб, краката или във вените в други части от тялото
- високо кръвно налягане или покачване на кръвното налягане
- горещи вълни
- задух
- косопад
- увеличено окосмяване по тялото
- сърбеж с или без обрив
- зачервяване на кожата
- промяна на цвета на кожата
- болка в мускулите
- изтичане на секрет от гърдите
- нарастване на гърдите
- киста на яйчника
- сухота във влагалището и кожата около него
- намаляване на теглото.

Редки (може да засегнат по-малко от 1 на всеки 10 000 души):

- бучка в гърдата, пълна с течност
- проблеми с апетита
- усещане на замайване, все едно се въртите в кръг
- ускорено сърцебиене
- възпаление на панкреаса (панкреатит)
- възпаление на черния дроб (хепатит)
- прекомерно потене
- повишена чувствителност към слънчева светлина
- вагинално течение.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

- рак на гърдата
- доброкачествен тумор на черния дроб
- доброкачествена бучка в гърдата
- абнормни промени в тъканта на гърдите
- абнормни нива на мазнините в кръвта (като холестерол)
- удар
- интензивни неволеви контракции на мускулите на ръцете, краката, главата и тялото
- образуване на кръвен съсирек в кръвоносен съд в окото
- трудност при носене на контактни лещи
- инфаркт
- образуване на кръвен съсирек в краката
- образуване на кръвен съсирек в белите дробове
- отичане на лицето, езика или гърлото, което може да затрудни преглъщането и дишането и да е съпроводено от обрив
- болезнени червени подутини по ръцете и краката
- нощно потене
- намалено производство на кърма.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Цилест

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C.



Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите видими белези на нарушаване на качеството на продукта.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Цилест

- Активните вещества са: норгестимат 250 микрограма и етинилестрадиол 35 микрограма.
- Другите съставки са: лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, нишесте прежелатинизирано,, индигокармин (E132).

Как изглежда Цилест и какво съдържа опаковката

Кръгли, сини таблетки с надпис С 250 от двете страни. Цилест се предлага в картонени кутийки с 3 блистера, в които се съдържат 21 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

Johnson & Johnson d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000 Ljubljana
Словения

Производител

Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Белгия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

България

„Джонсън & Джонсън България“ ЕООД
ж.к. Младост 4,
Бизнес Парк София, сграда 4
София 1766
Тел.: 02 489 94 00

Дата на последно преразглеждане на листовката

10/2012

