

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Цинарикс 55 mg обвити таблетки Cynarix 55 mg coated tablets

Сух екстракт от листа на Артишок
Cynarae folii extractum siccum

- Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е фармацевт. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 14 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Цинарикс обвити таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Цинарикс обвити таблетки
3. Как да приемате Цинарикс обвити таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цинарикс обвити таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Приложение 2	
Към Рег. №	20010864
Разрешение №	72173 / 09-06-2026
ВГ/МА/МР	
Одобрение №	

1. Какво представлява Цинарикс обвити таблетки и за какво се използва

Този лекарствен продукт е холеретик, който стимулира жлъчната секреция.

Начин на действие:

Екстрактът от листа на артишок стимулира образуването на жлъчен сок и увеличава секрецията на панкреатични ензими необходими за храносмилането.

Показания:

Растителен лекарствен продукт.

При нарушения в храносмилането (диспептични оплаквания и метеоризъм) след приемането на мазни храни или трудносмилаеми храни, специално при функционални нарушения на жлъчните пътища. Последващо лечение след хирургично отстраняване на жлъчния мехур. Подпомагащо лечение при леки форми на високи липидни нива в серума (кръвта). Поддържащо лечение към основното лечение на жлъчно-чернодробна дисфункция.

2. Преди да приемете Цинарикс обвити таблетки

Не приемайте Цинарикс обвити таблетки,

ако сте алергични към екстракта от листа на артишок, други растенията от семейство Сложноцветни или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Също, ако страдате от

- тежко нарушение на функцията на черния дроб,
- запушване на жлъчните пътища,



- емпием на жлъчния мехур (нарушение, предизвикано от напълването на жлъчния мехур с гной).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Цинарикс обвити таблетки. Консултирайте се с лекар при влошаване на състоянието или ако не се постига очаквания резултат след 14 дни.

Деца

Поради недостатъчен брой педиатрични изследвания Цинарикс обвити таблетки не трябва да се използва при деца под 12 години.

Други лекарства и Цинарикс обвити таблетки

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства. Досега няма известни лекарствени взаимодействия.

Цинарикс обвити таблетки с храна и напитки

Досега няма известни взаимодействия.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Няма изследвания за влиянието на екстракта от листа на артишок върху бременни жени. Не е известно дали активните вещества на екстракта от листа на артишок преминават в майчиното мляко. Ако сте бременна или кърмите, Цинарикс обвити таблетки трябва да се приема с повишено внимание. Вашият лекар трябва да прецени съотношението риск/полза.

Шофиране и работа с машини

Цинарикс обвити таблетки не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Цинарикс обвити таблетки съдържа лактоза и захароза.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Цинарикс обвити таблетки

Винаги приемайте Цинарикс обвити таблетки точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако Вашият лекар не е предписал друго, обичайната доза е:

Възрастни и деца над 12 години: 1-2 таблетки 3 пъти дневно.

Приемайте Цинарикс обвити таблетки непосредствено преди хранене, с безалкохолна течност (например една чаша вода).

Употреба при деца

Няма опит при деца.

Цинарикс обвити таблетки може да се приема толкова време, колкото препоръчва Вашият лекар или фармацевт. Вие трябва да се консултирате с лекар, ако Вашите симптоми не се подобряват след двуседмично лечение.

Ако сте приели повече от необходимата доза Цинарикс обвити таблетки

Няма съобщения за случаи на предозиране.



Ако сте пропуснали да приемете Цинарикс обвити таблетки с
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В много редки случаи са наблюдавани слаби стомашно-чревни нарушения (слаба диария, болки в горната част на корема, гадене, киселини).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

5. Как да съхранявате Цинарикс обвити таблетки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Цинарикс обвити таблетки

- Активно вещество: сух екстракт от листа на артишок

Всяка обвитата таблетка съдържа 55 mg екстракт от листа на Артишок (*Cynarae scolymus* L, folium, 4-6:1, екстракционен разтворител: пречистена вода) под формата на сух екстракт, стандартизиран като не по-малко от 3,0% кафеоилхинови киселини, изразени като хлорогенова киселина.

- Други съставки: лактоза, захароза, малтодекстрин, силициев диоксид, колоиден безводен, целактоза (целулоза, лактоза), коповидон, кросповидон, талк, магнезиев стеарат, титанов диоксид (Е 171), арабска гума, метилцелулоза, калциев карбонат, повидон, глицерол 85%, оцветители (Индигодин Е 132 и Хинолиново жълто Е 104), еудражит Е 12,5, монтангликоловосък.



Как изглежда Цинарикс обвити таблетки и какво съдържа опаковката

Зелени обвити таблетки в блистери, поставени в картонена кутия. Опаковка от 24 и 60 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.

6067 Absam/Tirol, Австрия

phone: + 43 5223 57926 0

fax: + 43 5223 52294

e-mail: pharma@montavit.com

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за употреба:

ТП Монтавит, 1407 София, ул. Сребърна 2, сграда Б ет. 9, тел./факс.: 02/866 33 58, e-mail:

office@montavit.bg

Дата на последно преразглеждане на листовката април 2026

