

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


### Деслоратадин Зентива 5 mg филмирани таблетки деслоратадин (desloratadine)

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

#### Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Деслоратадин Зентива и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Деслоратадин Зентива
3. Как да приемате Деслоратадин Зентива
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Деслоратадин Зентива
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация



#### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДЕСЛОРАТАДИН ЗЕНТИВА и за какво се използва.

Деслоратадин Зентива е противоалергично лекарство, което не причинява сънливост. То помага за контролиране на алергичните реакции и симптомите им.

Деслоратадин Зентива облекчава симптоми, свързани с алергичен ринит (възпаление на носните пътища, причинено от алергия, като например сенна хрема или алергия към домашен прах). Тези симптоми включват кихане, сърбеж и секреция от носа, сърбеж на небцето, сърбеж, зачервяване или насълзяване на очите.

Деслоратадин Зентива се използва и за облекчаване на симптомите на уртикария (състояние на кожата, причинено от алергия). Тези симптоми включват сърбеж и копривна треска.

Облекчаването на тези симптоми продължава цял ден и Ви помага да възстановите нормалната си ежедневна активност и съня си.

#### 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ДЕСЛОРАТАДИН ЗЕНТИВА

##### Не приемайте Деслоратадин Зентива

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към деслоратадин, или към някоя от останалите съставки на Деслоратадин Зентива или към лоратадин.

Деслоратадин Зентива е предназначен за възрастни и юноши (на възраст 12 и повече години).

##### Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Деслоратадин Зентива..

- ако бъбречната Ви функция е влошена.

Ако това се отнася за Вас или не сте сигурни, моля консултирайте се с Вашия лекар, преди да приемете Деслоратадин Зентива.

##### Други лекарства и Деслоратадин Зентива

Не са известни взаимодействия между Деслоратадин Зентива и други лекарства.

##### Прием на Деслоратадин Зентива с храни, напитки и алкохол

Деслоратадин Зентива може да се приема с или без храна.



### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ако сте бременна или кърмите, не се препоръчва да приемате Деслоратадин Зентива.

### **Шофиране и работа с машини**

При препоръчаната доза Деслоратадин Зентива не се очаква да предизвиква сънливост или влошаване на вниманието. Все пак, макар и много рядко, някои хора имат усещане за сънливост, която може да се отрази върху способността им за шофиране и работа с машини.

### **Деслоратадин Зентива съдържа изомалт.**

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с лекаря си, преди да приемете това лекарство.

## **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ДЕСЛОРАТАДИН ЗЕНТИВА**

Винаги приемайте това лекарства точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е както следва:

Възрастни и юноши (на възраст 12 и повече години): приемайте една таблетка веднъж дневно. Глътнете таблетката цяла с вода, с или без храна.

По отношение на продължителността на курса на лечение – лекарят Ви ще определи вида алергичен ринит, от който страдате, и в зависимост от това ще прецени колко време трябва да приемате Деслоратадин Зентива. Ако страдате от интермитентен алергичен ринит (наличие на симптоми в продължение на по-малко от 4 дни седмично или в продължение на по-малко от 4 седмици), Вашият лекар ще Ви препоръча схема на лечение, съобразена с данните за хода на болестта Ви.

Ако страдате от персистиращ алергичен ринит (наличие на симптоми в продължение на 4 или повече дни седмично и в продължение на повече от 4 седмици), Вашият лекар може да ви препоръча по-продължително лечение.

При различните пациенти с уртикария може да се налага различна продължителност на лечението и поради това трябва да спазвате препоръките на лекаря си.

### **Ако сте приели повече от необходимата доза Деслоратадин Зентива**

Приемайте Деслоратадин Зентива само така, както Ви е предписан. При случайно предозиране не се очакват сериозни проблеми. Все пак, ако вземете по-висока доза Деслоратадин Зентива от предписаната Ви, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

### **Ако сте пропуснали да приемете Деслоратадин Зентива**

Ако забравите да приемете дозата си Деслоратадин Зентива навреме, приемете я при първа възможност, след което продължете приема му по предписаната ви схема.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

## **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, Деслоратадин Зентива може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. При възрастни нежеланите реакции са практически същите като при прием на плацебо. Все пак, нежелани реакции, за които се съобщава по-често, отколкото при прием на плацебо, са отпадналост, сухота в устата и главоболие. При юношите, най-често съобщаваната нежелана реакция е главоболие.

По време на постмаркетинговия период на Деслоратадин Зентива много рядко е съобщавано за тежки алергични реакции (затруднено дишане, хрипове, сърбеж, копривна треска и отоци). За случаи на сърцебиене, ускорена сърдечна дейност, болки в корема, гадене (повдигане), повръщане, разстроен стомах, диария, виене на свят, сънливост, безсъние, болки в мускулите,



халюцинации, гърчове, безпокойство със засилени движения, чернодробно възпаление и отклонения в чернодробните изследвания е съобщавано също много рядко.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани ефекти, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

## **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ Деслоратадин Зентива**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се съхранява над 30°C. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не използвайте Деслоратадин Зентива след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Ако забележите промяна във външния вид на таблетките, съобщете на Вашия фармацевт.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа Деслоратадин Зентива**

Активното вещество е деслоратадин 5 mg. Всяка таблетка съдържа 5 mg деслоратадин.

Другите съставки на таблетката са:

#### Ядро на таблетката:

Изомалт (E953)

Нишесте прежелатинизирано (царевично)

Целулоза, микрокристална

Магнезиев оксид, тежък

Хидроксипропилцелулоза

Кросповидон (тип А)

Магнезиев стеарат

#### Обвивка на таблетката:

Поливинилов алкохол

Титанов диоксид (E171)

Макрогол/PEG 3350

Талк

FD&C Blue #2/Индиго кармин

Алуминиев оцветител (E132)

### **Как изглежда Деслоратадин Зентива какво съдържа опаковката**

Деслоратадин Зентива 5mg филмирани таблетки са сини, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки с диаметър приблизително 6,5 mm.

Деслоратадин Зентива 5mg филмирани таблетки са опаковани в полихлоротрифлуоретилен (PCTFE)/половинилхлорид (PVC)/алуминиеви блистери.

Деслоратадин Зентива 5mg филмирани таблетки са опаковани в едnodозови блистери в опаковки от 7, 10, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 90 или 100 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба

### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

Притежател на разрешението за употреба

Zentiva k.s.,



U Kabelovny 130,  
Prague 10,  
Чешка република

Производител  
Specifar S.A.  
1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara  
123 51 Athens, Гърция

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

Име на държавата-членка	Име
Чешка република	Desloratadin Zentiva 5mg potahované tablety
България	Деслоратадин 5 mg Зентива филмирани таблетки
Словакия	DEZLORATADIN ZENTIVA 5 mg, filmom obalené tablety
Полша	Desloratadin 5 mg Zentiva
Литва	Desloratadine Zentiva 5mg plėvele dengtos tabletės
Италия	Desloratadina Zentiva
Естония	DESLORATADINE ZENTIVA 5 MG
Дания	Desloratadin Zentiva 5 mg filmovertrukne tabletter

Дата на последно преразглеждане на листовката

