

Листовка: информация за потребителите ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА

Детол Мед Спрей за Рани 0,20% w/w Спрей за
Бензалкониев хлорид

Dettol Med Wound Spray 0,20% w/w Cutaneous Spray, solution
Benzalkonium chloride

Листовка Приложение 2
Към Рег. № 20090439
Разрешение № - 63403
30-08-2023
Одобрение №

САМО ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА

Важна информация за някои от съставките на Детол Мед Спрей за Рани

Този лекарствен продукт съдържа бензалкониев хлорид 0,20% w/w като активно вещество и 20,8 mg пропиленгликол за всеки 1 ml, които могат да причинят кожно дразнене.

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 5 дни не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Детол Мед Спрей за Рани и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате Детол Мед Спрей за Рани
3. Как да използвате Детол Мед Спрей за Рани
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Детол Мед Спрей за Рани
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Детол Мед Спрей за Рани и за какво се използва

Детол Мед Спрей за Рани се използва за почистване на пресни малки рани и унищожаване на най-често срещаните бактерии, свързани с инфекцията на малки рани. Този лекарствен продукт не е предназначен да подобрява заздравяването на рани или да бъде използван за подобряване на заздравяването на рани.

Не трябва да бъде използван за големи или сериозни рани и е предназначен за употреба само при необходимост, за локално приложение и кратковременно лечение. Трябва да бъде използван само веднъж на 24 часа.

Готов за употреба и не е необходимо разреждане.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Детол Мед Спрей за Рани

Не използвайте Детол Мед Спрей за Рани

- при деца под 12 месечна възраст
- ако сте алергични към бензалкониев хлорид или към някоя от останалите съставки на Детол Мед Спрей за Рани (изброени в точка 6)
- не е за продължителна употреба или да се използва повече от един път за 24 часа



Обърнете специално внимание и избягвайте употреба на Детол Мед Спрей за Рани

- Около очите, ушите или генеталиите, или в устата. В случай на случаен контакт с очите, измийте очите с голямо количество студена вода
- Да не се вдишва. Само за външна употреба
- За големи рани покриващи повече от 5% от човешкото тяло (5% са изчислени да съответстват на малки рани върху двете колена и лактите).

Други лекарства и Детол Мед Спрей за Рани

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не се препоръча употребата на Детол Мед Спрей за Рани с каквито и да било други подобни продукти, тъй като няма изследвания за ефектите, когато се използва с други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Не се очква неговото използване по време на бременност или кърмене да бъде свързано с вредни ефекти, тъй като абсорбцията през кожата е минимална.

С цел да се избегне неговото поглъщане при кърмени деца, не се препоръчва прилагане върху кожата на гърдите по време на кърмене.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт ако искате да използвате това лекарство докато сте бременна или кърмите.

Шофиране и работа с машини

Детол Мед Спрей за Рани не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Детол Мед Спрей за Рани съдържа лек боров аромат

Това лекарство съдържа лек боров аромат, съдържащ Бензилов алкохол, Бензил бензоат, Бензил салицилат, Цитрал, Цитронелол, Евгенол, Гераниол, Хексил Цинамал, d-Лимонен и Линалоол.

Бензилов алкохол, Бензил бензоат, Бензил салицилат, Цитрал, Цитронелол, Евгенол, Гераниол, Хексил Цинамал, d-Лимонен и Линалоол могат да причинят алергични реакции.


3. Как да използвате Детол Мед Спрей за Рани

Винаги използвайте Детол Мед Спрей за Рани точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

За външна употреба.

При първа употреба или ако не е използван за дълъг период от време, може да е необходимо първоначално да се пръсне върху тъкан или нещо подобно, за да се осигури още в началото пълно напръскване върху раната.

При възрастни и деца над 6 годишна възраст: Напръскайте пълна доза (1 до 2 пръскавания) един път върху всяка рана и оставете за пет минути. Ако е необходимо, се използва чист хартиен или памучен тампон за попиване на излишната течност.



При деца на възраст от 1 до 6 годишна възраст: Преди употреба потърсете съвет на лекар или фармацевт ако имате някакви притеснения. Напръскайте един път (1 пръскане) върху всяка рана (може да се прилага само върху максимум 4 рани, по едно и също време) и оставете за пет минути. Ако е необходимо, се използва чист хартиен или памучен тампон за попиване на излишната течност.

Пръскайте от разстояние между 4 и 15 cm. Да не се вдишва.

Сапун може да дезактивира спрея, така че не го използвайте за миене на раната.

Използването на спрея може да се повтори ако раната се е отворила, но той не е за непрекъсната употреба и трябва да се употребява само веднъж за 24 часа, за максимум от 3-5 дни.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Детол Мед Спрей за Рани може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Има съобщения за много редки нежелани реакции (среща се по-малко от 1 потребител на 10 000) при случаи на локално почистване на малки рани и са включени сърбеж по кожата, обрив, дразнене, горене, подуване и обезцветяване или почервяване. Може да има реакция на мястото, където продуктът е бил използван, като лющене на кожата. В случай на поява на такива реакции, моля спрете използването на продукта и потърсете съвет от фармацевт или лекар. Ако Вие страдате от екзема, използването на продукта може да я влоши. Има съобщения за косопад.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Детол Мед Спрей за Рани

Да се съхранява на място на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Детол Мед Спрей за Рани след срока на годност отбелязан върху етикета (за отбелязване срока на годност са използвани съкращения). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Продуктът няма специални изисквания за съхранение. Срокът на годност след първа употреба на спрей помпата е 6 месеца.



Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Детол Мед Спрей за Рани

- Активното вещество е: бензалкониев хлорид 0,20% w/w
- Другите съставки са: пропиленгликол, натриев дихидроген фосфат дихидрат, динатриев хидроген фосфат додекахидрат, лек боров аромат, динатриев едетат дихидрат, пречистена вода.

Как изглежда Детол Мед Спрей за Рани и какво съдържа опаковката

Детол Мед Спрей за Рани представлява бистър, прозрачен разтвор със слаб аромат на бор. Той се предлага в готови за употреба спрей опаковки от 10 и 100 ml.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L.
48 Iancu de Hunedoara Boulevard, Building Crystal Tower
11th Floor, District 1, Bucharest, Румъния

Производител

RB NL Brands B.V.
Schiphol Boulevard 207
1118 BH Schiphol,
Нидерландия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕЕО под следните имена:

България	Детол Мед Спрей за Рани 0,20% w/w Спрей за кожа, разтвор
Република Чехия	Dettol
Холандия	Dettol Med Benzalkonium chloride 2 mg/g huidspray, oplossing voor cutaan gebruik
Португалия	Detolpro, 2 mg/g solução para pulverização cutânea
Република Словакия	Dettolmed 0.20%w/w Antiseptický sprej
Румъния	DettolMed 0,2% spray cutanat, soluție

Дата на последно преразглеждане на листовката: август, 2023

