

20/20/187

Листовка: информация за потребител

Диклоабак 1 mg/ml капки за очи, разтвор

Dicloabak 1mg/ml eye drops, solution

B6/МА7/МР-59324

26.04.2021

диклофенак натрий (diclofenac sodium)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява ДИКЛОАБАК и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ДИКЛОАБАК
3. Как да използвате ДИКЛОАБАК
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ДИКЛОАБАК
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ДИКЛОАБАК и за какво се използва

Това лекарство съдържа нестероидно противовъзпалително средство (НСПВС) за очно приложение.

То се използва в хода на определени хирургични намеси върху окото и след хирургични намеси:

- Инхибиране на миозата (стесняване на диаметъра на зеницата) при операции за катаракта,
- Предотвратяване на възпаление при операции за катаракта и на предния очен сегмент,
- Лечение на болката в окото при фотокератомия (корективна операция за миопия) в първите 24 часа след операцията.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ДИКЛОАБАК**Не използвайте ДИКЛОАБАК**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към диклофенак натрий или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- ако имате анамнеза за алергия или астма, появила се при приема на тези капки за очи или на сходно лекарство, като други НСПВС или аспирин.
- ако сте бременна, от началото на 6-ия месец на бременността (след 24-та седмица).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате ДИКЛОАБАК

- Трябва да използвате това лекарство внимателно:

- В редки случаи, подобно на останалите НСПВС, ДИКЛОАБАК може да предизвика алергични реакции, включително анафилактични реакции (серозна алергична реакция, която причинява затруднено дишане или замаяност), дори без предшестваща експозиция на лекарството.
- В случай на реакции на свръхчувствителност или признания на алергия към това лекарство, особено на астматичен пристъп или внезапно подуване на лицето и шията, спрете лечението и незабавно се свържете с Вашия лекар или спешен медицински център.
- Преди да използвате това лекарство, уведомете Вашия лекар в случай на астма, комбинирана с хроничен ринит, хроничен синузит и/или назална полипоза.



- Острата инфекция на окото може да бъде замаскирана от топикалното приложение на противовъзпалителни лекарства. НСПВС нямат никакви антимикробни свойства. В случай на очна инфекция тяхната употреба с едно/няколко антиинфекционни средства трябва да се извършва внимателно.
 - Едновременното прилагане на локални НСПВС и локални стероиди (като например дексаметазон) може да повиши възможността за проблеми със здравето.
 - НСПВС могат да забавят зарастването на роговицата.
 - Ако имате предразположение към кървене или сте на антикоагулантно лечение (лекарства за разреждане на кръвта).
 - В случай на висока доза или продължително приложение употребата на топикални НСПВС може да доведе до кератит.
 - Пациентите, подложени на сложни очни хирургични операции, с корнеални епителни дефекти, захарен диабет, заболяване на повърхността на окото (напр. синдром на сухото око), ревматоиден артрит или повторни хирургични намеси върху окото в рамките на кратък период от време, могат да са с повишен риск от корнеални нежелани реакции.
 - Не се препоръчва носенето на контактни лещи след операция на катараракта. Вашият лекар ще Ви посъветва кога можете отново да използвате контактни лещи.
- Ако симптомите Ви се влошат или не се подобряват, трябва да посетите лекар.

Други лекарства и ДИКЛОАБАК

Ако използвате други капки за очи по едно и също време с ДИКЛОАБАК, моля изчакайте **15 минути** между двата вида лечение.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускані без рецепт.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Вие не трябва да приемате това лекарство по време на първите 5 месеца от бременността (до 24-та седмица), освен ако Вашият лекар не преценя, че е абсолютно необходимо. Ако това е необходимо при Вас, то Вашият лекар ще Ви предпише най-ниската доза за възможно най-кратък период от време.

От началото на 6-ия месец до края на бременността (след 24-та седмица) това лекарство е противопоказано и НИКОГА не трябва да се приема поради сериозните ефекти върху Вашето дете.

Ако сте приемали това лекарство по време на бременност, незабавно информирайте Вашия акушер-гинеколог, за да можете да бъдете наблюдавани, ако е необходимо.

Кърмене

ДИКЛОАБАК може да се използва по време на кърмене

Фертилитет

Както всички нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), това лекарство може да повлияе фертилитета (плодовитостта) при жени и да доведе до затруднено зачеване. Този ефект е обратим при преустановяване на лечението. Уведомете Вашия лекар, ако планирате бременност или имате проблеми със зачеването.

Шофиране и работа с машини

Може да изпитате кратък зрителен дискомфорт след прилагане на ДИКЛОАБАК. Изчакайте, докато се възстанови нормалното Ви зрение, преди да шофирайте или работите с опасни машини.

ДИКЛОАБАК съдържа макроголглицеролов рицинолеат, което може да причини кожни реакции (кожни реакции).



3. Как да използвате ДИКЛОАБАК

Винаги използвайте ДИКЛОАБАК точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

Препоръчителната доза при възрастни е както следва:

Инхибиране на миозата при операция на катаракта:

- Предоперативно: прилагайте 1 капка до 5 пъти през последните 3 часа преди операцията;

Операции за катаракта и на предния очен сегмент:

- Предоперативно: прилагайте 1 капка до 5 пъти през последните 3 часа преди операцията;
- Постоперативно: прилагайте 1 капка 3 пъти непосредствено след операцията, а след това по 1 капка 3 до 5 пъти дневно, за не повече от 4 седмици.

Болка в окото, свързана с фоторефрактивна кератектомия (корективна операция за миопия):

- Предоперативно: прилагайте 2 капки в рамките на един час преди операцията;
- Постоперативно: прилагайте 2 капки в рамките на първия час след операцията, а след това 4 капки в рамките на 24-те часа след операцията.

Не превишавайте препоръчваната доза.

Употреба при деца

Не са провеждани изследвания.

Начин на приложение

Това лекарство е предназначено за приложение в окото (очно приложение).

Да не се инжектира, да не се погъща.

Капките за очи не трябва да се прилагат чрез peri- или интраокуларна инжекция.

- ① Измийте добре ръцете си, преди да използвате продукта.
- ② Избягвайте да докосвате окото или клепачите с върха на пипетора.
- ③ Поставете една капка в засегнатото око, като гледате нагоре и нежно притегляте долния клепач надолу.
- ④ След употреба затворете бутилката.
- ⑤ След поставяне на капките, натиснете с пръст ъгъла на окото, което е близо до носа и леко затворете клепачите за 2 минути. Това помага да се предотврти попадането ДИКЛОАБАК в останалите части на тялото.

Ако сте пропуснали да използвате ДИКЛОАБАК

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, ДИКЛОАБАК може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души

- Чувство на парене след поставяне
- Нарушение на зрението след поставяне

Редки: може да засегнат до 1 на 1 000 души

- Реакции на свръхчувствителност със сърбеж и зачервяване
- Фоточувствителност (алергична реакция след излагане на слънце)
- Точковиден кератит, изтъняване на роговицата, улцерация на роговицата
- Диспнея (затруднено дишане)
- Утежнена астма



С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

- Ринит
- Хиперемия на конюнктивита (зачеряване на очите), алергичен конюнктивит (възпаление на повърхността на окото), оток на клепачите (подуване на клепачите)
- Кашлица
- Уртикария, обрив, контактна екзема
- Поради наличието на макроголглициеролов рицинолеат, риск от контактна екзема.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
България
тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ДИКЛОАБАК

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 25°C.

Бутилката не трябва да се съхранява за повече от осем седмици след първото отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ДИКЛОАБАК

- Активното вещество е диклофенак натрий в концентрация от 1 mg/ml.
- Останалите съставки са макроголглициеролов рицинолеат, трометамол, борна киселина и вода за инжекции.

Как изглежда ДИКЛОАБАК и какво съдържа опаковката

ДИКЛОАБАК е бледо жълта течност, предлагана в бутилка, съдържаща 10 ml от разтвор за капки за очи.

Притежател на разрешението за употреба
LABORATOIRES THEA
12, rue Louis Blériot
63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2



ФРАНЦИЯ

Производител
EXCELVISION
27, rue de la Lombardière
ZI la Lombardière
07100 ANNONAY
ФРАНЦИЯ

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите-членки на ЕИП под следните имена:

Франция	VOLTARENOPHTAVAK
Белгия, Чешка република, Гърция, Финландия, Люксембург, Холандия, Полша, Португалия, Испания	DICLOABAK
Дания	VOLTAVAK
Австрия Норвегия, Швеция	VOLTAREN OPHTHA ABAK
Италия	VOLTAREN OFTA ABAK
България	ДИКЛОАБАК

Дата на последно преразглеждане на листовката

