

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ДИОФЛАВОН 500 mg филмирани таблетки

DIOFLAVON 500 mg film-coated tablets

Микронизирана и пречистена флавоноидна фракция (съдържаща Диосмин 90% и флавоноиди, изразени като Хесперидин 10%)

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация
Този лекарствен продукт се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ДИОФЛАВОН и за какво се използва
2. Преди да приемете ДИОФЛАВОН
3. Как да приемате ДИОФЛАВОН
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ДИОФЛАВОН
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към Рег. № 20130267
Разрешение № 11-23260, 22-08-2013
Одобрение №

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИОФЛАВОН И ЗА КАВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ДИОФЛАВОН повишава тонуса на мускулите на стените на вените (венотоник) и защитава малките кръвоносни съдове, като увеличава устойчивостта им (вазопротектор).

ДИОФЛАВОН трябва да се използва само при възрастни:

- за симптоматично лечение на венозно-съдови нарушения (отекли крака, болка, тежест в краката, отпуснатост на кожата при залежаване);
- за лечение на признаците на обострени хемороиди;
- за лечение на чупливост на малките кръвоносни съдове.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ДИОФЛАВОН

Не използвайте ДИОФЛАВОН:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към микронизирана пречистена флавоноидна фракция или към някое от помощните вещества на ДИОФЛАВОН.

Обърнете специално внимание при употребата на ДИОФЛАВОН

- **При обострени хемороиди:**

Прилагането на този продукт не отменя специфичното лечение на други заболявания на правото черво. Ако хемороидите не изчезнат до 15 дни или състоянието се влоши, потърсете Вашия лекар за съвет.

- **Венозно-съдови нарушения:**

Ако проблемите и чупливостта на кръвоносните съдове не намалеят до 15 дни, обърнете се към Вашия лекар за съвет.

ДИОФЛАВОН има максимален ефект, ако се комбинира със здравословен начин на живот.

Избягвайте излагане на слънце, топлина, продължително стоене на крака, наднормено тегло.

Ходенето и носенето на специални (компресиращи) чорапи подобрява кръвообращението.

Прием на други лекарства



Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, получени без рецепта.

Прием на ДИОФЛАВОН с храни и напитки

Препоръчително е ДИОФЛАВОН да се приема по време на хранене (вж.т.3 КАК ДА ПРИЕМАТЕ ДИОФЛАВОН).

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Бременност: Употребата на ДИОФЛАВОН по време на бременност може да става само с предписание от лекар.

Кърмене: Поради отсъствие на данни относно излъчването в майчиното мляко, лечението с ДИОФЛАВОН по време на кърмене трябва да се избягва.

Шофиране и работа с машини

Няма данни за неблагоприятно влияние на продукта върху способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ДИОФЛАВОН

Винаги приемайте ДИОФЛАВОН точно, както е посочено в тази листовка или така, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

ДИОФЛАВОН е предназначен за приложение през устата. Таблетките се приемат с чаша вода.

Ако лекарят не е назначил друго, се препоръчва:

- *Венозна недостатъчност:* 2 таблетки дневно - 1 таблетка на обяд и 1 таблетка вечер, по време на хранене.

- *Хемороиди:* 4-дневен курс от 6 таблетки дневно, последвани от по 4 таблетки дневно през следващите 3 дни, по време на хранене.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ДИОФЛАВОН

Ако Вие сте използвали повече от посочената доза, можете да се обърнете към Вашия лекар или фармацевт за съвет.

Ако сте пропуснали да приемете ДИОФЛАВОН

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви други въпроси относно приложението на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ДИОФЛАВОН може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възможни са редки случаи на леки стомашни смущения, невровегетативни смущения (усещане за неразположение) и кожни реакции (обрив, сърбеж, уртикария, което представлява алергична реакция на кожата със зачервяване и изменение, надигнато над повърхността на кожата, придружено от сърбеж), които не налагат прекъсване на лечението.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или ако забележите нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ДИОФЛАВОН

Без специални условия на съхранение. Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.



Не използвайте ДИОФЛАВОН след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ДИОФЛАВОН

Активното вещество е флавоноидна фракция, пречистена и микронизирана. Една таблетка съдържа 500 mg флавоноидна фракция, съдържаща (Диосмин 90% и флавоноиди, изразени като Хесперидин 10%)

Помощни вещества: желатин, натриев нишестен гликолат (тип А), микрокристална целулоза, натриев лаурилсулфат и опадрай оранж(съдържащ хипромелоза, глицерол, титанов диоксид, жълт и червен железен оксиди, полиетиленгликол 6000, магнезиев стеарат)

Как изглежда ДИОФЛАВОН и какво съдържа опаковката

ДИОФЛАВОН са розовооранжеви, продълговати филмирани таблетки, с делителна черта от едната страна.

Таблетките са налични в кутии от 30 и 60 филмирани таблетки в PVC/Алуминиеви блистери. Два или четири блистера в сгъваема картонена кутия, изработена от едностранно пигментно покрит картон.

**Притежател на разрешението за употреба и производител,
отговорен за освобождаване на партидата**

**„Фармацевтични заводи Милве“ АД
3200 Бяла Слатина, Промислена зона
България**

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

**„Фармацевтични заводи Милве“ АД
ул. „Николай Хайтов“ 2 София, България
Тел. + 359 2 862 40 64; + 359 2 862 41 51**

Дата на последно одобрение на листовката – Ноември 2011г.

