

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Дуомокс 500 mg диспергиращи се таблетки
Дуомокс 750 mg диспергиращи се таблетки
Дуомокс 1000 mg диспергиращи се таблетки

Duomox 500 mg dispersible tablets
Duomox 750 mg dispersible tablets
Duomox 1000 mg dispersible tablets

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1	
Към Рег. № 980265, 980266, 980267	
Разрешение № 25080-2, 27-10-2015	
Одобрение №	

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

500 mg диспергиращи се таблетки

Всяка диспергираща се таблетка съдържа амоксицилин трихидрат (*amoxicillin trihydrate*) еквивалентен на 500 mg амоксицилин.

750 mg диспергиращи се таблетки

Всяка диспергираща се таблетка съдържа амоксицилин трихидрат (*amoxicillin trihydrate*) еквивалентен на 750 mg амоксицилин.

1000 mg диспергиращи се таблетки

Всяка диспергираща се таблетка съдържа амоксицилин трихидрат (*amoxicillin trihydrate*) еквивалентен на 1000 mg амоксицилин.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

500 mg диспергиращи се таблетки

Диспергираща се таблетка
Таблетките са със светло кремав цвят и овална форма, с печат фирмено лого и код 234.
От другата страна на таблетката има делителна черта.

750 mg диспергиращи се таблетки

Диспергираща се таблетка
Таблетките са със светло кремав цвят и овална форма, с печат фирмено лого и код 235.
От другата страна на таблетката има делителна черта.

1000 mg диспергиращи се таблетки

Диспергираща се таблетка
Таблетките са със светло кремав цвят и овална форма, с печат фирмено лого и код 236.
От другата страна на таблетката има делителна черта.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Амоксицилин е показан за лечение на следните инфекции при възрастни и деца (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.1):



- Остър бактериален синуит
- Остър отит на средното ухо
- Остър стрептококов тонзилит и фарингит
- Остри екзацербации на хроничен бронхит
- Пневмония придобита в обществото
- Остър цистит
- Безсимптомна бактериурия по време на бременност
- Остър пиелонефрит
- Тифоидна и паратифоидна треска
- Абсцес на зъбите с разпространяващ се целулит
- Инфекции след ставно протезиране
- Ерадикация на *Helicobacter pylori*
- Лаймска болест

Амоксицилин е показан също за профилактика на ендокардит.

Трябва да се обърне внимание на официалните указания за правилната употреба на антибактериални средства.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка

За изборът на дозата на Амоксицилин за лечение на отделната инфекция трябва да се има предвид:

- Очакваните патогени и вероятната им чувствителност към антибактериални средства (вж. точка 4.4)
- Тежестта и мястото на инфекцията
- Възрастта, теглото и бъбречната функция на пациента, както е посочено по-долу

Продължителността на лечението трябва да се определя от вида на инфекцията и от повлияването на пациента, и обично трябва да бъде възможно най-кратка. Някои инфекции налагат по-голяма продължителност на лечение (вж. точка 4.4 относно продължителна терапия).

Възрастни и деца ≥40 kg

Показание*	Доза*
Остър бактериален синуит	250 mg до 500 mg на всеки 8 часа или 750 mg до 1 g на всеки 12 часа
Безсимптомна бактериурия по време на бременност	При тежки инфекции 750 mg до 1 g на всеки 8 часа
Остър пиелонефрит	Остър цистит може да се лекува с 3g два пъти дневно в продължение на един ден
Абсцес на зъбите с разпространяващ се целулит	
Остър цистит	
Остър отит на средното ухо	500 mg на всеки 8 часа, 750 mg до 1 g на всеки 12 часа
Остър стрептококов тонзилит и фарингит	При тежки инфекции 750 mg до 1 g на всеки 8 часа в продължение на 10 дни
Остри екзацербации на хроничен бронхит	
Пневмония, придобита в обществото	500 mg до 1 g на всеки 8 часа
Тифоидна и паратифоидна треска	500 mg до 2 g на всеки 8 часа
Инфекции след ставно протезиране	500 mg до 1 g на всеки 8 часа
Профилактика на ендокардит	2 g перорално, еднократна доза 30 до 60 mg



	минути преди процедурата
Ерадикация на <i>Helicobacter pylori</i>	750 mg до 1 g два пъти дневно в комбинация с инхибитор на протонната помпа (напр. омепразол, ланзопразол) и друг антибиотик (напр. кларитромицин, метронидазол) в продължение на 7 дни
Лаймска болест (вж. точка 4.4)	Ранен стадий: 500 mg до 1 g на всеки 8 часа до максимум 4 g/дневно, разделени на отделни дози за 14 дни (10 до 21 дни) Късен стадий (системни увреждания): 500 mg до 2 g на всеки 8 часа до максимум 6 g/дневно, разделени на отделни дози в продължение на 10 до 30 дни
* Трябва да се обърне внимание на официалните указания за лечение за всяко показание	

Деца <40 kg

Децата могат да бъдат лекувани с амоксицилин капсули, диспергиращи се таблетки, суспензии или сашета.

Амоксицилин 100 mg/ml прах за перорална суспензия се препоръчва при деца под 6-месечна възраст.

При деца с телесно тегло 40 kg или повече трябва да се предписва дозата за възрастни.

Препоръчитени дози:

Показание+	Доза+
Остър бактериален синуит	20 до 90mg/kg/дневно, разделени на отделни дози*
Остър отит на средното ухо	
Пневмония придобита в обществото	
Остър цистит	
Остър пиелонефрит	
Абсцес на зъбите с разпространяващ се целулит	
Остър стрептококов тонзилит и фарингит	40 до 90 mg/kg/дневно, разделени на отделни дози*
Тифоидна и паратифоидна треска	100 mg/kg/дневно, разделени на три отделни дози
Профилактика на ендокардит	50 mg/kg перорално, еднократна доза 30 до 60 минути преди процедурата
Лаймска болест (вж. точка 4.4)	Ранен стадий: 25 до 50 mg/kg/дневно разделени на три отделни дози в продължение на 10 до 21 дни Късен стадий (системни увреждания): 100 mg/kg/дневно, разделени на три отделни дози в продължение на 10 до 30 дни

+ Трябва да се обърне внимание на официалните указания за лечение за всяко показание.

*Схеми с прилагане два пъти дневно, трябва да се обмислят, само когато дозата е горната граница.

Старческа възраст



Не се счита за необходимо коригиране на дозата.

Бъбречно увреждане

Скорост на гломерулия филтрация GFR (ml/min)	Възрастни и деца $\geq 40 \text{ kg}$	Деца $< 40 \text{ kg}$ [*]
По-висока от 30	Не се налага коригиране	Не се налага коригиране
10 до 30	максимум 500 mg два пъти дневно	15 mg/kg приложени два пъти дневно (максимум 500 mg два пъти дневно)
По-ниска от 10	максимум 500 mg/дневно.	15 mg/kg приложени като еднократна дневна доза (максимум 500 mg)

^{*}При по-голяма част от случаите се предпочита парентерално лечение

При пациенти на хемодиализа

Амоксицилин може да се отстрани от кръвообращението чрез хемодиализа.

Възрастни и деца $\geq 40 \text{ kg}$	Хемодиализа
	15 mg/kg/дневно, приложени като еднократна дневна доза. Преди хемодиализа трябва да се приложи една допълнителна доза от 15 mg/kg. С цел да се възстановят циркуляторните лекарствени нива, трябва да се приложи още една доза от 15 mg/kg след хемодиализата.

При пациенти на перitoneална диализа

Максимум 500 mg амоксицилин дневно.

Чернодробно увреждане

Трябва да се дозира с повишено внимание и да се мониторира редовно чернодробната функция (вж. точки 4.4 и 4.8).

Начин на приложение

Амоксицилин е предназначен за перорална употреба.

Абсорбцията на амоксицилин не се повлиява от храна.

Лечението може да започне парентерално съгласно препоръките за дозиране на интравенозната форма и да продължи с перорална форма.

Таблетката се поставя в чаша вода и се разбърква добре докато се смеси равномерно. Сместа трябва да се приеме веднага.

или



Да се приема с вода.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество, към някой от пеницилините или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Анамнеза за тежка незабавна реакция на свръхчувствителност (напр. анафилаксия) към бета-лактамно вещество (напр. цефалоспорин, карбапенем или монобактам).

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Реакции на свръхчувствителност

Преди започване на лечение с амоксицилин, пациентът трябва да бъде разпитан внимателно за предишни реакции на свръхчувствителност към пеницилини, цефалоспорини или други бета-лактамни продукти (вж. точки 4.3 и 4.8).

Съобщава се за сериозни и понякога фатални реакции на свръхчувствителност (анафилактоидни реакции) при пациенти, лекувани с пеницилини. По-вероятно е тези реакции да се появят при пациенти с анамнеза за свръхчувствителност към пеницилин и атопични пациенти. При появя на алергична реакция, лечението с амоксицилин трябва да бъде прекратено и да се назначи подходяща алтернативна терапия.

Свръхчувствителност свързана с остръ коронарен синдром

В редки случаи по време на лечение с амоксицилин са съобщавани реакции на свръхчувствителност (остръ коронарен синдром, свързан със свръхчувствителност, вж. точка 4.8) и трябва да се има предвид съответно лечение.

Не-чувствителни микроорганизми

Амоксицилин не е подходящ за лечението на някои видове инфекции, освен ако причинителят е вече установен и е известно, че е чувствителен или има много голяма вероятност, че патогенът ще бъде подходящ за лечение с амоксицилин (вж. точка 5.1). Това важи особено, когато се обмисля лечение на пациенти с инфекции на пикочните пътища и тежки инфекции на ушите, носа и гърлото.

Гърчове

При пациенти с нарушена бъбречна функция или при такива, приемащи високи дози или при пациенти с предразполагащи фактори (напр. анамнеза за гърчове, лекувана епилепсия или менингеални нарушения (вж. точка 4.8)), може да се развият гърчове.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, дозата трябва да се коригира в зависимост от степента на увреждане (вж. точка 4.2).

Кожни реакции

При започване на лечението, появата на генерализиран еритем, съпроводен от преска и пустули, може да е симптом на остра генерализирана екзантемна пустулоза (AEGP, вж.



точка 4.8). Тази реакция налага спиране на лечението с амоксицилин и е противопоказание за последващ прием.

Лечението с амоксицилин трябва да се избягва при съмнение за инфекциозна мононуклеоза, тъй като при това заболяване след приложение на амоксицилин е наблюдавана появата на морбилиформен обрив.

Реакция на Jarisch-Herxheimer

Реакцията на Jarisch-Herxheimer е наблюдавана след лечение на Лаймска болест с амоксицилин (вж. точка 4.8). Тя е пряк резултат от антибактериалната активност на амоксицилин върху бактериите, причинители на Лаймска болест, спирохетата *Borrelia burgdorferi*. Пациентите трябва да бъдат уверени, че това е чesta и обикновено самоограничаваща се последица от антибиотичното лечение на Лаймската болест.

Свръхрастеж на нечувствителни микроорганизми

Продължителната употреба понякога може да доведе до свръхрастеж на нечувствителни микроорганизми.

Антибиотик-асоцииран колит е съобщаван при почти всички антибактериални средства и може да варира по тежест от лек до животозастрашаващ (вж. точка 4.8). По тази причина, при пациенти с диария по време на или след лечение с антибиотици, е важно да се има предвид тази диагноза. Ако се появи антибиотик-асоцииран колит, лечението с амоксицилин трябва незабавно да се преустанови, да се направи консултация с лекар и да се започне подходящо лечение. В този случай са противопоказани антиперисталтични лекарствени продукти.

Продължително лечение

По време на продължително лечение е препоръчително периодично да се оценяват органните, системни функции, включително бъбречната, чернодробната и хемopoетичната функция. Съобщавани са повишени нива на чернодробните ензими и промени в кръвната картина (вж. точка 4.8).

Антикоагуланти

Съобщавани са редки случаи на удължаване на протромбиновото време при пациенти, лекувани с амоксицилин. При едновременно приложение с антикоагуланти се налага подходящо проследяване. Може да е необходимо коригиране на дозата на пероралните антикоагуланти за поддържане на желаното ниво на антикоагулантно действие (вж. точки 4.5 и 4.8).

Кристалурия

При пациенти с намалено отделяне на урина много рядко е наблюдавана кристалурия, главно при парентерално лечение. По време на прилагането на високи дози амоксицилин се препоръчва поддържането на адекватен прием на течности и отделяне на урината, с цел да се намали възможността за амоксицилинова кристалурия. При пациенти с катетър в пикочния мехур трябва да се провежда редовен контрол на проходимостта (вж. точка 4.8 и 4.9).

Промени при диагностични изследвания

Повишени серумни нива и повишени нива в урината на амоксицилин е вероятно да повлияят определени лабораторни изследвания. Поради високите концентрации на



амоксицилин в урината, при химичните методи често има фалшиво положителни резултати.

Препоръчва се при изследване за наличие на глюкоза в урината по време на лечение с амоксицилин, да се използват глюкозооксидазните методи.

Наличието на амоксицилин може да промени резултатите от изследването за естриол при бременни жени.

4.5. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Пробенецид

Едновременната употреба на пробенецид не се препоръчва. Пробенецид намалява бъбречната тубулна секреция на амоксицилин. Едновременната употреба на пробенецид може да доведе до повишени нива на амоксицилин в кръвта за по-дълъг период от време.

Алопуринол

Едновременната употреба на алопуринол по време на лечение с амоксицилин може да увеличи вероятността от кожни алергични реакции.

Тетрациклини

Тетрациклини и други бактериостатични лекарствени продукти могат да повлият на бактерицидните ефекти на амоксицилин.

Перорални антикоагуланти

Пероралните антикоагуланти и пеницилиновите антибиотици са използвани широко в практиката без съобщения за взаимодействия. Въпреки това в литературата има описани случаи на повищено международно нормализирано съотношение при пациенти на аценокумарол или варфарин и лекувани с амоксицилин. При необходимост от едновременно приложение трябва внимателно да се проследяват протромбиновото време или международното нормализирано съотношение при добавянето или спирането на амоксицилин. Освен това може да се наложи корекция на дозата на пероралните антикоагуланти (вж. точки 4.4 и 4.8).

Метотрексат

Пеницилините може да намалят екскрецията на метотрексат, причинявайки потенциално повишаване на токсичността.

4.6. Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Проучвания при животни не показват преки или непреки вредни ефекти по отношение на репродуктивната токсичност. Ограничени данни за употребата на амоксицилин по време на бременност са налични.



време на бременност при хора не показват повишен риск от вродени малформации. Амоксицилин може да се прилага по време на бременност, когато потенциалните ползи надвишават потенциалните рискове, свързани с лечението.

Кърмене

Амоксицилин се екскретира в кърмата в малки количества с възможен рисък за сенсибилизация. Следователно са възможни диария и гъбична инфекция на лигавиците при кърмачето, което може да наложи преустановяване на кърменето. Амоксицилин трябва да се използва по време на кърмене само след прещенка от лекувания лекар на съотношението полза/рисък.

Фертилит

Няма данни за ефектите на амоксицилин по отношение на фертилитета при хора. Репродуктивните проучвания при животни не са показали ефекти върху фертилитета.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това могат да се появят нежелани реакции (напр. алергични реакции, замайване, гърчове), които могат да повлият способността за шофиране и работа с машини (вж. точка 4.8).

4.8. Нежелани лекарствени реакции

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции (НЛР) са диария, гадене и кожни обриви.

НЛР, получени от клинични изпитвания и постмаркетинговото наблюдение с амоксицилин, представени по системо-органен клас по MedDRA, са изброени по-долу.

Дадената по-долу терминология е използвана за класифициране на честотата на нежеланите лекарствени реакции.

Много чести ($\geq 1/10$)

Чести ($\geq 1/100$ до $<1/10$)

Нечести ($\geq 1/1,000$ до $<1/100$)

Редки ($\geq 1/10,000$ до $<1/1,000$)

Много редки ($<1/10,000$)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Инфекции и инфекции	
Много редки	Кандидоза на кожата и лигавиците
Нарушения на кръвта и лимфната система	
Много редки	Обратима левкопения (включително тежка неутропения или агранулоцитоза), обратима тромбоцитопения и хемолитична анемия. Удължаване на времето на кървене и на протромбиновото време (вж. точка 4.4)
Нарушения на имуината система	
Много редки	Тежки алергични реакции, включително агионевротичен оток, анафилаксия, серумна болест и хиперсензитивен васкулит (вж. точка 4.4).



С неизвестна честота	Реакция на Jarisch-Herxheimer (вж. точка 4.4) и остръ коронарен синдром, свързан със свръхчувствителност (синдром на Kounis) (вж. точка 4.4).
Нарушения на нервната система	
Много редки	Хиперкинезия, замаяност и конвулсии (вж. точки 4.4 и 4.9)
С неизвестна честота	асептичен менингит
Стомашно-чревни нарушения	
<i>Данни от клинични проучвания</i>	
*Чести	Диария и гадене
*Нечести	Повръщане
<i>Постмаркетингови данни</i>	
Много редки	Антибиотик-асоцииран колит (включително псевдомемброзен колит и хеморагичен колит, вж. точка 4.4) Черен „космат” език Оцветяване на повърхността на зъбите
Хепатобилиарни нарушения	
Много редки	Хепатит и холестатична жълтеница. Умерено повишаване на AST и/или ALT.
Нарушения на кожата и подкожната тъкан	
<i>Данни от клинични проучвания</i>	
*Чести	Кожен обрив
*Нечести	Уртикария и сърбеж
<i>Постмаркетингови данни</i>	
Много редки	Кожни реакции като еритема мултиформе, синдром на Stevens-Johnson, токсична епидермална некролиза, булозен и ексфолиативен дерматит и остра генерализирана екзантемна пустулоза (AGEP) (вж. точка 4.4).
Нарушения на бъбреците и никочните пътища	
Много редки:	Интерстициален нефрит Кристалурия (вж. точки 4.4 и 4.9)
* Честотата на тези нежелани събития е получена от клинични проучвания, включващи общо около 6 000 възрастни и педиатрични пациенти, приемащи амоксицилин.	
Оцветяване на повърхността на зъбите се съобщава при деца. Добрата хигиена на устната кухина може да помогне за предотвратяване на промяната в цвета на зъбите, тъй като обикновено може да се отстрани чрез измиването им.	

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/рисък за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изиска да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg.

4.9. Предозиране



Симптоми и признания на предозиране

Може да се наблюдават стомашно-чревни симптоми (като гадене, повръщане и диария) и нарушаване на водно-електролитния баланс. Наблюдавана е амоксицилинова кристалурия, в някои случаи водеща до бъбречна недостатъчност. При пациенти с увредена бъбречна функция или при такива, получаващи високи дози могат да се развият гърчове (вж. точки 4.4 и 4.8).

Лечение на интоксикация

Симптомите от страна на стомашно-чревния тракт могат да се лекуват симптоматично, като се обърне внимание на водно-електролитния баланс.

Амоксицилин може да се отстрани от кръвообращението чрез хемодиализа.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: пеницилини с широк спектър на действие; ATC код: J01CA04.

Механизъм на действие

Амоксицилин е полусинтетичен пеницилин (бета-лактамен антибиотик), който инхибира един или повече ензими (често наричани пеницилин-свързващи протеини РВР) в процеса на биосинтеза на бактериалния пептидогликан, който е съществен структурен компонент на бактериалната клетъчна стена. Инхибирането на синтеза на пептидогликана води до отслабване на клетъчната стена, което обикновено се последва от клетъчна лиза и смърт.

Амоксицилин е чувствителен към разграждане от бета-лактамазите, продуцирани от резистентните бактерии, поради което, спектърът му на действие не включва микроорганизми, които произвеждат тези ензими.

Фармакокинетична/ фармакодинамична връзка

Времето след минималната инхибираща концентрация ($T \geq MIC$) се счита за основният определящ фактор за ефикасността на амоксицилин.

Механизми на резистентност

Основните механизми на резистентност към амоксицилин са:

- Инактивиране от бактериалните бета-лактамази.
- Изменение на РВР, което намалява афинитета на антибактериалния продукт към таргета.

Липсата на пермеабилитет на бактериите или механизмите на ефлукс помпата могат да причинят или да допират за бактериалната резистентност, особено при Грам-отрицателните бактерии.

Границни стойности



Границните стойности на МИК за амоксицилин са тези на Европейския комитет по изпитване на антимикробната чувствителност (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)) версия 5.0.

Микроорганизъм	МИК критична граница (mg/L)	
	Чувствителни ≤	Резистентни >
Enterobacteriaceae	8 ¹	8
<i>Staphylococcus</i> spp.	Бележка ²	Бележка ²
<i>Enterococcus</i> spp. ³	4 ⁴	8 ⁴
Стрептококки групи A, B, C и G	Бележка ⁵	Бележка ⁵
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Бележка ⁵	Бележка ⁵
Група на стрептококус вириданс	0.5	2
<i>Haemophilus influenzae</i>	2 ⁶	2 ⁶
<i>Moraxella catarrhalis</i>	Бележка ⁷	Бележка ⁷
<i>Neisseria meningitidis</i>	0.125	1
Грам положителни анаероби без <i>Clostridium difficile</i> ⁸	4	8
Грам отрицателни анаероби ⁹	0.5	2
<i>Helicobacter pylori</i>	0.125 ⁹	0.125 ⁹
<i>Pasteurella multocida</i>	1	1
Критични граници несвързани видово ¹⁰	2	8

Дивият щам Enterobacteriaceae е категоризиран като чувствителен към аминопеницилини. Някои страни предпочитат да категоризират див тип изолати на *E. coli* и *P. mirabilis* като интермедиерни. Когато случаят е такъв, трябва да се използват МИК граница стойност $S \leq 0,5 \text{ mg/L}$.

¹Повечето стафилококи продуцират пеницилаза и са резистентни към амоксицилин. Метицилинрезистентните изолати са, с няколко изключения, устойчиви на всички бета-лактамни лекарствени продукти.

²От чувствителността към ампицилин може да се прави заключение за чувствителността към амоксицилин.

³За чувствителността на стрептококи групи A, B, C и G към пеницилин се прави заключение от чувствителността наベンзилпеницилин.

⁴Критичните граници се отнасят само за неменингитни изолати. За изолати, категоризирани като интермедиерни към ампицилин, трябва да се избягва перорално лечение с амоксицилин. Чувствителност заключена от МИК на ампицилин.

⁵Критичните граници се основават на интравенозно приложение. Бета-лактамазни позитивни изолати трябва да се докладват като резистентни.

⁶Бактериите продуциращи бета-лактамаза, трябва да се докладват като резистентни.

⁷За чувствителността към амоксицилин може да се прави заключение от чувствителността къмベンзилпеницилин.

⁸Критичните граници са базирани на епидемиологични гранични стойности (epidemiological cut-off values (ECOFFs)), които отличават див тип изолати от такива с намалена чувствителност.

⁹Невидово свързаните критични граници са базирани на дози от поне 0,5 g x 3 или 4 дози дневно (1,5 до 2 g/дневно).

Разпространението на резистентността може да варира географски и във времето за определени видове и е желателно да има локална информация за резистентността, особено при лечение на тежки инфекции. При необходимост трябва да се потърсят



съвета на експерт, когато локалното разпространение на резистентност е такова, че ползата от лекарствения продукт при поне някои видове инфекции е под въпрос.

<i>In vitro</i> чувствителност на микроорганизми към амоксицилин
Микроорганизми, които обичайно са чувствителни
Аеробни Грам-положителни микроорганизми: <i>Enterococcus faecalis</i> Бета-хемолитични стрептококки (групи A, B, C и G) <i>Listeria monocytogenes</i>
Видове, при които придобитата резистентност може да е проблем
Аеробни Грам-отрицателни микроорганизми: <i>Escherichia coli</i> <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Helicobacter pylori</i> <i>Proteus mirabilis</i> <i>Salmonella typhi</i> <i>Salmonella paratyphi</i> <i>Pasteurella multocida</i>
Аеробни Грам-положителни микроорганизми: Коагулаза-негативни стафиликоки <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i> Група на Стрептококус вириданс
Анаеробни Грам-положителни микроорганизми: <i>Clostridium</i> spp.
Анаеробни Грам-отрицателни микроорганизми: <i>Fusobacterium</i> spp.
Други: <i>Borrelia burgdorferi</i>
Микроорганизми с присъща резистентност
Аеробни Грам-положителни микроорганизми: <i>Enterococcus faecium</i> [†]
Аеробни Грам-отрицателни микроорганизми: <i>Acinetobacter</i> spp. <i>Enterobacter</i> spp. <i>Klebsiella</i> spp. <i>Pseudomonas</i> spp.
Анаеробни Грам-отрицателни микроорганизми: <i>Bacteroides</i> spp. (много щамове <i>Bacteroides fragilis</i> са резистентни).
Други: <i>Chlamydia</i> spp. <i>Mycoplasma</i> spp. <i>Legionella</i> spp.
'Естествена интермедиерна чувствителност в отсъствието на придобити механизми на резистентност.
[‡] Почти всички <i>S.aureus</i> са резистентни към амоксицилин, поради продуцирането на пеницилаза. В допълнение всички метицилин-резистентни щамове са резистентни към амоксицилин.

5.2. Фармакокинетични свойства

Абсорбция



Амоксицилин се дисоциира напълно във воден разтвор с физиологично pH. Абсорбира се бързо и добре след перорално приложение. След перорално приложение бионаличността на амоксицилин е приблизително 70%. Времето за достигане на пикова плазмена концентрация (T_{max}) е приблизително един час.

По-долу са представени фармакокинетичните резултати от едно проучване, при което амоксицилин в доза 250 mg три пъти дневно е прилаган на гладно при група здрави доброволци.

C_{max} ($\mu\text{g/ml}$)	T_{max} (h)	$AUC_{(0-24h)}$ (($\mu\text{g.h/ml}$)	$T_{1/2}$ (h)
$3,3 \pm 1,12$	$1,5 (1,0-2,0)$	$26,7 \pm 4,56$	$1,36 \pm 0,56$

*Медиана (обхват)

В интервала 250 до 3000 mg бионаличността е линейно пропорционална на дозата (измерена като C_{max} и AUC). Абсорбцията не се повлиява от едновременния прием на храна.

Може да се използва хемодиализа за елиминиране на амоксицилин.

Разпределение:

Около 18% от общото количество на амоксицилин в плазмата е свързано с протеини и првидният обем на разпределение е около 0,3 до 0,4 l/kg.

След интравенозно приложение, амоксицилин се установява в жълчния мехур, коремната тъкан, кожата, мастната тъкан, мускулните тъкани, синовиалната и перитонеалната течности, жълчката и гнойта. Амоксицилин не се разпределя достатъчно в цереброспиналната течност.

От проучванията при животни няма доказателства за значимо задържане в тъканите на съединения, производни на лекарството. Амоксицилин, подобно на повечето пеницилини, може да се открие в кърмата (вж. точка 4.6).

Доказано е, че амоксицилин преминава през плацентарната бариера (вж. точка 4.6).

Биотрансформация

Амоксицилин частично се екскретира в урината като неактивна пеницилоева киселина в количества, еквивалетно и на 10 до 25% от началната доза.

Елиминиране

Основният път на елиминиране на амоксицилин е през бъбреците.

Амоксицилин има среден елиминационен полуживот приблизително един час и среден общ клирънс приблизително 25 l/час при здрави лица. Приблизително 60 до 70 % от амоксицилин се екскретира непроменен в урината през първите 6 часа след приложение на единична доза 250mg или 500 mg амоксицилин. Според различни проучвания уринната екскреция е 50-85% за амоксицилин за период от 24 часа.

Едновременното приложение на пробенецид забавя екскрецията на амоксицилин (вж. точка 4.5).



Възраст

Елиминационният полуживот на амоксицилин е подобен при деца на възраст около 3 месеца до 2 години и при по-големи деца и възрастни. При много малките деца (включително преждевременно родени бебета) през първата седмица от живота интервалът на прилагане не трябва да надхвърля прилагане два пъти дневно поради незрялост на бъбречния път на елиминиране. Тъй като при пациентите в старческа възраст съществува по-голяма вероятност да имат намалена бъбречна функция, е необходимо внимание при избора на дозата и може да е полезно да се проследява бъбречната функция.

Пол

След перорално приложение на амоксицилин при здрави мъже и жени, полът не е оказал значимо влияние върху фармакокинетиката на амоксицилин.

Бъбречно увреждане

Общийт серумен клирънс на амоксицилин намалява пропорционално с намаляването на бъбречната функция (вж. точки 4.2 и 4.4).

Чернодробно увреждане

Дозирането при пациенти с чернодробно увреждане трябва да се извършва с внимание и чернодробната функция трябва да се проследява на равни интервали от време.

5.3. Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на фармакологичните проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане, генотоксичност и репродуктивна токсичност и токсичност за развитието.

Не са провеждани изпитвания за карциногенност с амоксицилин.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Карбоксиметилова целулоза (E466)
Микрокристална целулоза (E460)
Кросповидон (E1202)
Магнезиев стеарат (E470B)
Есенция ванилин
Есенция лимон
Есенция мандарина
Захарин (E954)

6.2 Несъвместности



Неприложимо.

6.3. Срок на годност

5 години.

6.4. Специални условия за съхранение

Да се съхранява под 25°C.

6.5. Вид и съдържание на опаковката

Алуминий PVC блистер. Блистерите са опаковани в картонена кутия.

Опаковки от 20 таблетки

6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него, трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Astellas Pharma d.o.o.

Šmartinska cesta 53,

1000 Ljubljana

Словения

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Duomox® 500: 9800267

Duomox® 750: 9800266

Duomox® 1000: 9800265

**9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕЗШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА
РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Дата на първо разрешаване: 24.08.1998 г.

Подновяване на разрешението за употреба: 08.12.2010.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Август 2016

