



Медицинско изделие

## Глицеринови супозитории 2500 мг – за възрастни Глицеринови супозитории 1500 мг – за деца

### ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че закупихте EasyLax®! Моля, прочетете внимателно инструкцията за употреба! Ако не разбираете нещо или имате допълнителни въпроси, обрнете се към Вашия лекар или фармацевт. Запазете я, защото може да се наложи да я прочетете отново.

Изилакс супозитории за кърмачета, деца и възрастни е показан при констипация (запек), в случаи на висцерална свръхчувствителност (синдром на раздразнените черва), хемороиди и анални фисури, при бременност и кърмачки, при залежаване, при нарушената перисталтика.

**Състав:** Всяка глицеринова супозитория съдържа глицерин (трициерол), натриев стеарат и натриев бикарбонат.  
**Начин на действие:** Изилакс супозитории за кърмачета, деца и възрастни помага за по-лесното изхождане при бебета, възрастни хора, пациенти на легло и пациенти с хемороиди и болка при дефекация. Изилакс супозитории за кърмачета, деца и възрастни действа чрез извличане на водата от червата и изпрашването и в изпражненията. Глицеринът стимулира контракцията на мускулите на червата, което подпомага придвижването на изпражненията и улеснява излизането им от организма и също така осигурява смазыващ ефект на вътрешността на ректума. Размянка и овляжнява изпражненията, улеснява освобождаването на червата чрез мяко изхождащо действие. Изилакс супозитории за кърмачета, деца и възрастни е изключително добро поносим и безопасен. Изилакс супозитории за кърмачета, деца и възрастни е безвредно и ефективно средство, чието действие се проявява в рамките на 15 мин. до 1 час.

**Предупреждения:** Изилакс супозитории за кърмачета, деца и възрастни не бива да се използва при остра коремни болки или друг вид неразположения от неизвестен произход. В случаи на повишена чувствителност на пациента към съставките или на предишни възпаления на лигавицата може да се появи дразнене на ректалната лигавица. Не използвайте продукта при свръхчувствителност към някоя от съставките!

**Начин на употреба:** Изилакс супозитории за възрастни се препоръчва по 1-2 супозитории от 2500mg при необходимост; Изилакс супозитории за кърмачета и малки деца се препоръчва по 1 супозиторий от 1500mg при необходимост. При по-големи деца е препоръчително поставянето на 1-2 супозитории от 1 500mg при необходимост.

Отстраниете алюминиевото фолио и поставете супозиторията в ректума със заострения край навътре до пълно проникване. В рамките на един час от поставянето на супозиторията се появява стимулиране на движението на червата.

**Съхранение:** Да се съхраняват в оригиналната опаковка на хладно, тъмно и сухо място при температура между 4° и 30°C. В случаи че супозиторията е твърде размекната за прилагане, преди да отстраните алуминиевото фолио, я поставете в студена вода до втвърдяване.

### ДА СЕ ПАЗИ НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА!

#### Опаковка:

Картонена опаковка по 18 бр. глицеринови супозитории 2500 mg – за възрастни  
Картонена опаковка по 18 бр. глицеринови супозитории 1500 mg – за кърмачета и деца

#### Медицинско изделие 93/42/EEC

Отпуска се без рецепт в аптеките и другите.

Преди употреба внимателно четете инструкцията за употреба!

Да не се използва след изтичане срока на годност!

Изхвърляйте опаковките на предназначените за това места!

EasyLax® е регистрирана търговска марка!

Производител:  
FaDem International S.r.l.  
Via Plutone, 16 – 80014  
Giugliano in Campania (NA) - Italy

Вносител за България:  
Адвантис Ко ЕООД, 4023 Пловдив, ул. "Н. Шилева" №31  
тел.: +359 32 609 999, факс: +359 32 609 949,  
e-mail: info@advantis.bg, www.advantis.bg



VERСИЯ 3 07/2016 – REF ВЪЗРАСТИ – 8054615300057

CTEAS012/1

1 – 8054615300064