

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ефестад 5 mg филмирани таблетки Efestad 5 mg film-coated tablets


деслоратадин (desloratadine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Ефестад и за какво се използва
2. Преди да приемете Ефестад
3. Как да приемате Ефестад
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ефестад
6. Допълнителна информация



1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕФЕСТАД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Ефестад е противоалергично лекарство, което не причинява съниливост. То помага за контролиране на алергичните реакции и симптомите им.

Ефестад облекчава симптомите на алергичния ринит (възпаление на носните пътища, причинено от алергия, като например сенна хрема или алергия към домашен прах). Тези симптоми включват кихане, сърбеж и секреция от носа, сърбеж на небцето, сърбеж, зачеряване или настъзваване на очите.

Ефестад се използва и за облекчаване на симптомите на уртикария (състояние на кожата, причинено от алергия). Тези симптоми включват сърбеж и обрив.

Облекчаването на тези симптоми продължава цял ден и Ви помага да възстановите нормалната си ежедневна активност и съня си.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЕФЕСТАД

Не приемайте Ефестад

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към деслоратадин, или към някоя от останалите съставки на Ефестад или към лоратадин.

Ефестад е предназначен за възрастни и юноши (над 12 години).

Обърнете специално внимание при лечението с Ефестад

- ако бъбренчната Ви функция е влошена.

Ако това се отнася за Вас или не сте сигурни, моля консултирайте се с Вашия лекар, преди да приемете Ефестад.

Прием на други лекарства

Не са известни взаимодействия между Ефестад и други лекарства.



Прием на Ефестад с храни и напитки

Ефестад може да се приема със или без храна.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство, ако сте бременна или кърмите.

Ако сте бременна или кърмите, не се препоръчва да приемате Ефестад.

Шофиране и работа с машини

При препоръчваната доза Ефестад не се очаква да предизвика сънливост или влошаване на вниманието. Все пак, макар и много рядко, някои хора имат усещане за сънливост, която може да се отрази върху способността им за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някоя от съставките на Ефестад

Ефестад съдържа изомалт. Ако Ви е казано от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои сахари, свържете се с него преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЕФЕСТАД

Възрастни и юноши (над 12 години): приемайте една таблетка дневно.

Гълтнете таблетката цяла с вода, със или без храна.

По отношение на продължителността на курса на лечение Вашият лекар ще определи вида алергичен ринит, от който страдате, и в зависимост от това ще прецени колко време трябва да приемате Ефестад.

Ако страдате от интерmitентен алергичен ринит (наличие на симптоми в продължение на по-малко от 4 дни седмично или в продължение на по-малко от 4 седмици), Вашият лекар ще Ви препоръча схема на лечение, съобразена с данните за хода на болестта Ви.

Ако страдате от персистиращ алергичен ринит (наличие на симптоми в продължение на 4 или повече дни седмично и в продължение на повече от 4 седмици), Вашият лекар може да Ви препоръча по-продължително лечение.

При различните пациенти с уртикария може да се налага различна продължителност на лечението и поради това трябва да спазвате препоръките на лекаря си.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ефестад

Приемайте Ефестад само така, както Ви е предписан. При случайно предозиране не се очакват сериозни проблеми. Все пак, ако вземете по-висока доза Ефестад от предписаната Ви, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Ефестад

Ако забравите да приемете дозата си Ефестад навреме, приемете я при първа възможност, след което продължете приема му по предписаната ви схема. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Ефестад може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. При възрастните нежеланите реакции са практически същите като при прием на плацебо. Все пак, нежелани реакции, за които се съобщава по-често, отколкото при прием на плацебо, са отпадналост, сухота в устата и главоболие. При юношите, най-често съобщаваната нежелана реакция е главоболие.



По време на постмаркетинговия период на Ефестад много рядко е съобщавано за обрив и тежки алергични реакции (затруднено дишане, хрипове, сърбеж, обриви и отоци). За случаи на сърцебиене, ускорена сърдечна дейност, болки в корема, гадене (повдигане), повръщане, разстроен стомах, диария, виене на свят, сънливост, безсъние, болки в мускулите, халюцинации, гърчове, беспокойство със засилени движения, чернодробно възпаление и отклонения в чернодробните изследвания е съобщавано също много рядко.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани ефекти, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЕФЕСТАД

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се съхранява над 30°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка за защита от влага.

Не използвайте Ефестад след срока на годност, отбелянан върху картонената опаковка и блистера.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Ако забележите промяна във външния вид на таблетките, съобщете на Вашия фармацевт.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Ефестад

- Активното вещество е деслоратадин 5 mg.

- Другите съставки на таблетката са:

Ядро на таблетката: изомалт (E 953), нишесте, прежелатинизирано (царевично), целулоза, микрокристална, магнезиев оксид, тежък, хидроксипропилцелулоза, кросповидон (тип A), магнезиев стеарат.

Обвивка на таблетката: поливинил алкохол, титанов диоксид (E171), макрогол/PEG 3350, талк, брилянтно синьо / индиго кармин алуминиев лак (E132).

Как изглежда Ефестад и какво съдържа опаковката

Ефестад 5 mg са сини, кръгли, биконвексни филмирани таблетки с приблизителен диаметър 6,5 mm.

Ефестад 5 mg филмирани таблетки са опаковани в полихлоротрифлуороетилен (PCTFE)/Поливинил хлорид (PVC)/Алуминий блистери.

Ефестад 5 mg филмирани таблетки са опаковани в блистерни опаковки от 7, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 150, 180 таблетки.

Възможно е не всички видове опаковки да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:



Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel
Германия

Производители:

Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel
Германия

Specifar S.A.
1, 28 Octovriou str.
Ag. Varvara
12351 Athens
Гърция

Този лекарствен продукт е разрешен под следните имена в ЕС:

България: Ефестад 5 mg филмирани таблетки
Италия: Efestad 5 mg
Ирландия: Efestad 5 mg

Дата на последно одобрение на листовката
Октомври 2011

