

Листовка: информация за потребителя

ФЛУРАПИД С 200 mg/150 mg/25 mg/2,5 mg твърди капсули
FLURAPID С 200 mg/150 mg/25 mg/2,5 mg capsules, hard

Парацетамол/Аскорбинова киселина/Кофеин/Хлорфенаминов малеат
Paracetamol/Ascorbic acid/Caffeine/Chlorphenamine maleate

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява ФЛУРАПИД С и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ФЛУРАПИД С
3. Как да приемате ФЛУРАПИД С
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ФЛУРАПИД С
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	2017 0098
Разрешение №	86/МНМ,Р- 5848
Срокът на действие №	08-03-2022

1. Какво представлява ФЛУРАПИД С и за какво се използва

ФЛУРАПИД С е предназначен за облекчаване симптомите на простуда и грип, като повишена температура, главоболие, болка в крайниците, секрция от носа, сълзене, суха кашлица.

Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ФЛУРАПИД С

Не приемайте ФЛУРАПИД С, ако:

- сте алергични към някое от активните или помощните вещества на това лекарство (изброени в точка 6);
- имате сериозно чернодробно или бъбречно заболяване;
- страдате от някоя форма на глаукома (увеличено вътреочно налягане);
- имате заболяване на простатата;
- сте дете под 12-годишна възраст;
- имате високо кръвно налягане или друго сърдечносъдово заболяване;
- приемате други парацетамол-съдържащи продукти, отпусващи носа лекарства или продукти за лечение на кашлица и настинка;
- приемате лекарства, известни като инхибитори на моноаминооксидазата (МАО-инхибитори), които обикновено се използват за лечение на депресия.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете ФЛУРАПИД С:

- ако случайно сте приели по-висока доза от необходимата;
- ако имате тежко бъбречно или чернодробно заболяване;
- ако имате наследствено повишено съдържание на билирубин в кръвта (синдром на Жилибера);
- ако приемате други лекарства, съдържащи парацетамол;



- ако имате заболявания, свързани със съхранението на желязо (таласемия, хемохроматоза, сидеробластна анемия);
- при хронична злоупотреба с алкохол;
- при хиперфункция на тироидната жлеза (хипертиреозидизъм);
- ако имате някаква алергия;
- ако сте бременна или кърмите;
- ако имате проблеми с простатата;
- ако имате високо кръвно налягане или сърдечно заболяване.

В случай на повишена телесна температура, при признаци за вторична инфекция, обостряне на симптомите или други симптоми трябва да се потърси консултация с лекар.

Деца

ФЛУРАПИД С не трябва да се приема от деца под 12-годишна възраст.

Други лекарства и ФЛУРАПИД С

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства. Това се отнася особено за:

- варфарин или други подобни средства за разреждане на кръвта;
- лекарства за контрол на кръвното налягане, като бета-блокери;
- дигоксин или други подобни лекарства за лечение на сърдечни заболявания;
- лекарства за лечение на депресия, като трициклични антидепресанти, напр. амитриптилин;
- ако приемате други лекарства, съдържащи антихистамини или парацетамол.

ФЛУРАПИД С с храна, напитки и алкохол

По време на лечението с ФЛУРАПИД С не трябва да се приема алкохол.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Това лекарство не се препоръчва по време на бременност и кърмене, освен ако Вашият лекар прецени, че е абсолютно необходимо.

Шофиране и работа с машини

Хората, които шофират моторни превозни средства или работят с машини, трябва да имат предвид, че при употребата на това лекарство има риск от сънливост. Ако получите нежелани ефекти, като например замъглено зрение, виене на свят или сънливост, трябва да се въздържате от дейности, които изискват повишено внимание (например шофиране, работа с машини или опасни инструменти).

ФЛУРАПИД С съдържа лактоза монохидрат

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате ФЛУРАПИД С

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителна доза

Възрастни и деца над 12-годишна възраст

По 2 капсули 3 пъти дневно. След отслабване на симптомите може да се приема по 1 капсула 3 пъти дневно.

Пациенти с чернодробна и/или бъбречна недостатъчност

Дозата трябва да бъде редуцирана или интервалът на дозиране да се удължи при пациенти с чернодробна и/или бъбречна функция и синдром на Гилберт.

ФЛУРАПИД С не трябва да се прилага при тежка чернодробна и/или бъбречна недостатъчност.



Начин и продължителност на приложение

Капсулите трябва да се приемат цели, с достатъчно количество течност.

ФЛУРАПИД С не трябва да се използва за продължителен период от време и във високи дози без консултация с лекар.

Употреба при деца и юноши

Използва се при възрастни и деца над 12-годишна възраст.

Ако сте приели повече от необходимата доза ФЛУРАПИД С

Ако случайно или преднамерено сте приели по-висока доза от посочената в тази листовка, информирайте незабавно Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете ФЛУРАПИД С

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на ФЛУРАПИД С

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, ФЛУРАПИД С може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Спрете приема на ФЛУРАПИД С и се консултирайте веднага с лекар, ако се появят признаци на алергична реакция или на някоя друга сериозна реакция.

Възможни са следните нежелани реакции:

Много често ($\geq 1/10$):

- намаляване броя на белите кръвни клетки и тромбоцитите;
- тежки реакции на свръхчувствителност;
- затруднено дишане, задушаване.

Редки ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1000$):

- кожен обрив, сърбеж, зачервяване;
- повишаване на чернодробните ензими;
- отоци, сърцебиене;
- халюцинации, нервност;
- сухота в устата, запек, диария, повръщане или коремна болка.

Много редки ($< 1/10\ 000$):

- нарушена бъбречна функция;
- алергична кожна реакция;
- увреждане на чернодробната функция.

С неизвестна честота:

- неравномерен сърдечен ритъм (аритмии);
- умора, сънливост;
- безсъние.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,

ул. Дамян Груев № 8, 1303 София

тел. +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg



Като съобщавате за нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ФЛУРАПИД С

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след "Годен до". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите видими белези на нарушаване на качеството на продукта.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ФЛУРАПИД С

- **Активните вещества в една капсула са:** парацетамол (200 mg), аскорбинова киселина (150 mg), кофеин (25 mg), хлорфенаминов малеат (2,5 mg).
- **Помощни вещества са:** желатин, лактоза монохидрат, колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат, титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (E172) и червен железен оксид (E172).

Как изглежда ФЛУРАПИД С и какво съдържа опаковката

ФЛУРАПИД С – бледо жълти, твърди желатинови капсули. Съдържимо на капсулите – бяла до почти бяла прахообразна смес.

Всяка кутия съдържа 1 или 2 блистера с по 10 капсули всеки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Фортекс Нутрасютикалс ООД

ул. Прохладен кът № 10,

София 1362, България

Дата на последно преразглеждане на листовката февруари 2022.

