

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Фусидин® 20mg/g крем

Fucidin® 20 mg/g cream

фузидова киселина (fusidic acid)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да навреди, независимо то това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Фусидин® и за какво се използва
2. Преди да приемете Фусидин®
3. Как да приемете Фусидин®
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Фусидин®
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФУСИДИН® И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Фусидин® е бял, нецветяващ кожата и дрехите продукт, който от козметична гледна точка е подходящ за лечение на инфекции на кожата на лицето и главата.

Фусидин® е антибиотик получен от Фузидиум кокцинеум (*Fusidium coccineum*), притежаващ силна антибактериална активност срещу редица Грам-положителни микроорганизми. Стафилококите, включително щамовете резистентни към пеницилини или други антибиотици, са особено чувствителни към Фусидин®. Терапевтичната ефикасност на локално приложения Фусидин® се дължи частично на изразената антибактериална активност на продукта срещу микроорганизмите причиняващи кожните инфекции, и отчасти на способността на този антибиотик да прониква през неувредената кожа.

За какво се използва Фусидин®

Фусидин® се прилага за лечение на инфекции на кожата, причинени от чувствителни на фузидовата киселина микроорганизми.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФУСИДИН®

Не използвайте Фусидин®

При свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Обърнете специално внимание при употребата на Фусидин®

Фусидин® крем трябва да се използва внимателно, когато се прилага в близост до очите, тъй като продуктът може да предизвика дразнене, ако попадне в окото.



Продължителната употреба може да доведе до възникване на резистентни микроорганизми.

Прием на други лекарства

Няма данни.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Фусидин® приложен локално не повлиява или незначително повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Фусидин®

Фусидин® крем съдържа цетилов алкохол и калиев сорбат, които могат да причинят локални кожни реакции (напр. контактен дерматит).

Фусидин® крем съдържа бутилхидроксианизол (Е320), който може да причини локални кожни реакции (напр. контактен дерматит) или раздразнение на очите и лигавиците.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФУСИДИН®

Дозировка и приложение

Възрастни и деца

Дозировката и продължителността на лечението се определят от лекар.

Фусидин® се прилага върху засегнатия участък на кожата 2-3 пъти дневно в продължение на 10 дни.

Прилагане върху кожата.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Фусидин®

Малко вероятно е да се наблюдава предозиране.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Фусидин® е изключително добре поносим. Най-често наблюдаваните нежелани реакции са различни кожни реакции и по-специално реакции в мястото на приложение, като контактен дерматит, обрив, парене, сърбеж. Наблюдавани са също така свръхчувствителност и конюнктивит.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФУСИДИН®

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Няма специални условия на съхранение.

Да не се употребява след изтичане срока на годност, обозначен на опаковката.

Период на използване след първо отваряне: 28 дни.



6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Фусидин®

Всеки грам от лекарството съдържа: Фузидова киселина 20 mg в неутрална основа за крем.

Помощни вещества: бутилхидроксианизол (Е320), цетилов алкохол, глицерол, течен парафин, калиев сорбат, полисорбат 60, бял мек парафин, разредена солна киселина (за корекция на рН), α -токоферол рацемат, пречистена вода.

Как изглежда Фусидин® и какво съдържа опаковката

Туби по 15 g

Притежател на разрешението за употреба:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Дания

Производител:

LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)
285 Cashel Road
Dublin 12
Ирландия

LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l

Via E. Schering 21
20054 Segrate (MI)
Италия

Дата на последна редакция на текста:

10/2021

