

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. № ..... 9960421	Разрешение № ..... 19720, 25. 09. 2012
Одобрение № ..... /	

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**Фусидин® 20 mg/g маз  
Fucidin® 20 mg/g ointment  
натриев фузидат (sodium fusidate)**

Одобрение № .....  
/

**Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате никакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да навреди, независимо то това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Фусидин® и за какво се използва
2. Преди да приемете Фусидин®
3. Как да приемете Фусидин®
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Фусидин®
6. Допълнителна информация

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФУСИДИН® И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Фусидин® е антибиотик получен от Фузидиум кокцинеум (*Fusidium coccineum*), притежаващ силна антибактериална активност срещу редица Грам-положителни микроорганизми.

Стафилококите, включително щамовете резистентни към пеницилини или други антибиотици, са особено чувствителни към Фусидин®. Терапевтичната ефикасност на локално приложения Фусидин® се дължи частично на изразената антибактериална активност на продукта срещу микроорганизмите причиняващи кожните инфекции, и отчасти на способността на този антибиотик да прониква през неувредената кожа.

#### За какво се използва Фусидин®

Фусидин® е показан за лечение на инфекции на кожата причинени от микроорганизми чувствителни на натриев фузидат.

### 2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФУСИДИН®

#### Не употребявайте Фусидин®

При свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

#### Обърнете специално внимание при употребата на Фусидин®

Повишено внимание се налага когато Фусидин® маз се прилага в областта на окото, тъй като продуктът може да предизвика дразнене, ако попадне в окото.

Продължителната употреба може да доведе до селекция на резистентни микроорганизми.

#### Прием на други лекарства

Няма данни



### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

### **Шофиране и работа с машини**

Фусидин® приложен локално не повлиява или незначително повлиява способността за шофиране и работа с машини.

### **Важна информация относно някоя от съставките на Фусидин® маз**

Фусидин® маз съдържа цетилов алкохол и ланолин. Тези помощни вещества могат да причинят локални кожни реакции (напр. контактен дерматит).

Фусидин® маз съдържа бутилхидрокситолуен (Е321), който може да причини локални кожни реакции (напр. контактен дерматит) или раздразнение на очите и лигавиците.

## **3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФУСИДИН®**

### **Дозировка и приложение**

#### **Възрастни и деца**

Дозировката и продължителността на лечението се определят от лекар.

Фусидин® се прилага върху засегнатия участък 2-3 пъти дневно в продължение на 7 дни. Той може да се използва със или без оклузивна превръзка.

Прилагане върху кожата.

**Ако сте използвали повече от необходимата доза Фусидин®**

Малко вероятно е да се наблюдава предозиране

## **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Фусидин® е изключително добре поносим. Най-често наблюдаваните нежелани реакции са различни кожни реакции и по-специално реакции в мястото на приложение, като контактен дерматит, обрив, парене, сърбеж. Наблюдавани са също така свръхчувствителност и конюнктивит.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

## **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФУСИДИН®**

Съхранявайте на място, недостъпно за деца

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да не се използва след изтичане срока на годност, обозначен на опаковката.

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа Фусидин®**

Всеки грам от лекарството съдържа: Натриев фузидат 20 mg в в неутрална основа за маз

*Помощни вещества:* ланолин, цетилов алкохол, течен парафин, бял мек парафин, а-токоферол, рацемат, бутилхидрокситолуен (Е321).



**Как изглежда Фусидин® и какво съдържа опаковката**  
Туби по 15 g

**Притежател на разрешението за употреба:**

LEO Pharma A/S  
Industriparken 55  
DK-2750 Ballerup  
Дания

**Производител:**

LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)  
285 Cashel Road  
Dublin 12  
Ирландия

**Дата на последна редакция на текста**

06/2012

