

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА**

Листовка - Приложение 2

Към Рев. №

260 60678

ГАСТРОКИНД, таблетки**GASTROKIND, tablets**

З разрешение №

16 -01- 2014

Одобрение №

Arsenicum album D6, Croton tiglum D6, Okoubaka D4, Veratrum album D12.

Уважаеми пациенти,**моля прочетете внимателно тази листовка, защото тя съдържа важна за Вас информация.****Този лекарствен продукт се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това трябва да използвате Гастроцинд внимателно, за да постигнете добри резултати при лечението с него.**

- Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.
- Трябва да се свържете с лекар ако симптомите Ви се влошат или не се подобряват.
- Ако забележите нежелана лекарствена реакция, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво е Гастроцинд и за какво се използва?
2. Преди да приемете Гастроцинд
3. Как да приемате Гастроцинд?
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Как да съхранявате Гастроцинд?
6. Допълнителна информация

1. Какво е Гастроцинд и за какво се използва?

Гастроцинд е хомеопатичен лекарствен продукт, който се използва за лечение на стомашно-чревни функционални нарушения при малки деца, като гадене, повръщане, диария и стомашна болка. Тези оплаквания може да са в резултат на промяна в храненето като:

- преминаване от майчина кърма към адаптирано мляко за кърмачета,
- стартиране на приема на твърди храни (напр. зеленчуци, плодове, месо),
- адаптиране към храната в детските ясли и градини,
- консумация на непознати храни при пътуване

2. Преди да приемете Гастроцинд**Не използвайте Гастроцинд**

- Ако детето Ви е алергично (свръхчувствително) към някое от лекарствените или към някое от помощните вещества.
- При деца под 1 годишна възраст.

Предпазни мерки при приемането на Гастроцинд**Консултирайте се с лекар:**

- Ако в рамките на 3 дни не се наблюдава подобреие на симптомите при прием на Гастроцинд
- Ако оплакванията се появяват често.
- При появя на допълнителни оплаквания



Прием на други лекарства

Взаимодействия с други лекарства не са наблюдавани. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вашето дете приема или доскоро е приемало друг лекарствен продукт, дори и ако той не е по лекарско предписание.

Прием на Гастрокинд с храни и напитки

Употребата на Гастрокинд с храни и напитки не е препоръчителна. Спазвайте интервал от най-малко половин час между приема на Гастрокинд и приема на храна и напитки.

Бременност и кърмене

Този лекарствен продукт е предназначен за деца.

Шофиране и работа с машини

Този лекарствен продукт е предназначен за деца.

Важна информация за някои от съставките на Гастрокинд

Гастрокинд съдържа лактоза (млечна захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че детето Ви има непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да използвате този продукт.

3. Как да приемате Гастрокинд?

Винаги приемайте Гастрокинд точно както Ви е препоръчал Вашия лекар или фармацевт. Обичайната дозировка е:

Деца от 1 до 6 години: При остри оплаквания се приемат по 1 таблетка на всеки час, до максимум 6 таблетки дневно. След отшумяване на оплакванията се приемат по 1 таблетка 4 пъти дневно.

Таблетките се оставят да се разтопят бавно в устата. За малки деца таблетките могат да се разтворят в малко вода.

Ако Вашето дете приеме по-голямо количество от Гастрокинд:

Не се очакват някакви нежелани лекарствени реакции при прием на по-голямо количество Гастрокинд

Ако забравите прием на Гастрокинд:

Не давайте на Вашето дете двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако прекратите приема на Гастрокинд:

Не се очакват някакви нежелани лекарствени реакции при прекратяване на приема на Гастрокинд.

Обща забележка:

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции



Както всички лекарства, Гастроцинд може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Няма известни нежелани лекарствени реакции от Гастроцинд.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Забележка: При употреба на хомеопатични лекарствени продукти съществуващите оплаквания могат да се влошат временно (начално влошаване). В тези случаи се прекратете приема на Гастроцинд и се консултирайте с лекар.

5. Как да съхранявате Гастроцинд?

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Гастроцинд таблетки

1 таблетка (100 mg) съдържа:

Arsenicum album D6 20 mg, Croton tiglium D6 20 mg, Okoubaka D4 20 mg, Veratrum album D12 20 mg. (Активните вещества съдържат лактоза).

Помощни вещества:

Микрокристална целулоза, талк, магнезиев стеарат

Данни за опаковката

Бутилка от кафяво стъкло, с пластмасова капачка.

150 таблетки в опаковка.

Производител и притежател на разрешителното за употреба:

Deutsche Homöopathie-Union,
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe
Германия

Медицинско представителство за България:

Алпен Фарма ООД

Дата на последна редакция на текста:

Май 2012

