

ИЗДАНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНАТА ЛИСТОВКА - Приложение 2	
Код Трв. М	20060679
Разрешение №	35759 / 05-12-2015
ГASTROKIND таблетки	
Разрешение №	

Листовка: Информация за потребителя

ГASTROKIND таблетки
GASTROKIND tablets

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако мислите, че детето Ви е получило някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте т. 4.
- Ако след 3 дни детето Ви не се почувства по-добре или състоянието му се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява ГASTROKIND и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ГASTROKIND
3. Как да използвате ГASTROKIND
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ГASTROKIND
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ГASTROKIND и за какво се използва

ГASTROKIND е хомеопатично лекарство за лечение на стомашно-чревни функционални нарушения при малки деца, като гадене, повръщане, диария и стомашна болка. Тези оплаквания може да са в резултат на промяна в храненето като:

- преминаване от майчина кърма към адаптирано мляко за кърмачета,
- стартиране на приема на твърди храни (напр. зеленчуци, плодове, месо),
- адаптиране към храната в детските ясли и градини,
- консумация на непознати храни при пътуване

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ГASTROKIND

Не използвайте ГASTROKIND

- ако детето Ви е алергично към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т.6).
- при деца под 1 годишна възраст.

Предупреждения и предпазни мерки

Консултирайте се с Вашия лекар:

- ако в рамките на 3 дни Вашето дете не се повлиява достатъчно от приема на ГASTROKIND
- ако оплакванията се появяват често,
- ако възникнат допълнителни оплаквания.



Други лекарства и ГАСТРОКИНД

Взаимодействия с други лекарства не са наблюдавани. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вашето дете приема, доскоро е приемало или е възможно да приема други лекарства.

ГАСТРОКИНД с храна, напитки и алкохол

Употребата на това лекарство с храна и напитки не е препоръчителна. Спазвайте интервал от най-малко половин час.

Бременност, кърмене и фертилитет

Това лекарство е предназначено за деца.

Шофиране и работа с машини

Това лекарство е предназначено за деца.

ГАСТРОКИНД съдържа лактоза (млечна захар).

Ако Вашият лекар Ви е казал, че детето Ви има непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да използвате това лекарство.

3. Как да използвате ГАСТРОКИНД

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза е:

Деца на възраст от 1 до 6 години:

При остри оплаквания се приемат по 1 таблетка на всеки час, до максимум 6 таблетки на ден. След отшумяване на оплакванията се приемат по 1 таблетка 4 пъти на ден.

Таблетките се оставят да се разтопят бавно в устата. Ако е необходимо, таблетките могат да се разтворят в малко вода.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ГАСТРОКИНД

Не се очакват никакви вредни ефекти в случай на предозиране.

Ако сте пропуснали да използвате ГАСТРОКИНД

Не давайте на Вашето дете двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на ГАСТРОКИНД

Не се очакват никакви вредни ефекти.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



Няма известни нежелани лекарствени реакции.

Забележка: При употреба на хомеопатични лекарства съществуващите оплаквания могат да се влошат временно (начално хомеопатично влошаване). В тези случаи прекратете приема на ГАСТРОКИНД и се консултирайте с Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако детето Ви получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ГАСТРОКИНД

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ГАСТРОКИНД

- Активните вещества са: Арсеникум албум (Arsenicum album) D6 20 mg, Кротон тиглиум (Croton tiglium) D6 20 mg, Окубака (Okoubaka) D4 20 mg, Вератрум албум (Veratrum album) D12 20 mg в 1 таблетка (100 mg). (Активните вещества съдържат лактоза).
- Другите съставки са: Целулоза, микрокристална, талк, магнезиев стеарат

Как изглежда ГАСТРОКИНД и какво съдържа опаковката

Бутилка от кафяво стъкло, с пластмасова капачка, съдържаща 150 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител :

Deutsche Homöopathie-Union,
DNU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe
Германия

За допълнителна информация за това лекарство, моля обърнете се към локалния представител на Притежателя на разрешението за употреба:



Алпен Фарма ООД
България

Дата на последно преразглеждане на листовката:

11/2016

