

ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

GENTOS® oral drops, solution

Гентос перорални капки, разтвор

ИЗДЪЛЖИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Листовка № 20 112333	
Сървешение № 11 - 1373	31.05.2011
Обсърбение №	

Прочетете листовката внимателно, защото тя съдържа важна информация за Вас.

Това лекарство е достъпно без рецепт. Въпреки това трябва да използвате GENTOS® капки внимателно, за да имате най-добрите резултати от него.

- Пазете тази листовка. Може би ще имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате нужда от повече информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако симптомите продължават или състоянието се влоши, задължително се консултирайте с лекар.
- Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка или отбелязаните нежелани лекарствени реакции станат сериозни, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представляват GENTOS® капки, и за какво се използват
2. Каква информация трябва да имате преди да използвате GENTOS® капки
3. Как да приемате GENTOS® капки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате GENTOS® капки
6. Допълнителна информация

1. Какво представляват GENTOS® капки, и за какво се използват

GENTOS® капки са хомеопатичен лекарствен продукт.

Показания

Симптоматично лечение на остри и хронични заболявания на простатата, заболявания на пикочния мехур и смущения в уринирането.

В съответствие с хомеопатичната фармакологична природа на съставките на GENTOS® капки спомагат за облекчаване и лечение на следните симптоми:

Populus tremuloides	Увеличение на простатата и катарални цистити. Придружаващо лечение при катарални цистити. Спастична болка в областта на пикочния мехур след уриниране.
Serenoa repens	Аденом на простатата и нощно уриниране. Изпускане на капки урина при кашлица. Придружаващо лечение при простатити и епидидимити.
Conium maculatum	Увеличение на простатата. Често уриниране с изпускане на капки урина. Придружаващо лечение при цистити.
Kalium iodatum	Раздразнен пикочен мехур. Болезнено уриниране с никтурия. Придружаващо лечение при заболявания на тестисите и простатата.
Ferrum picrinicum	Сенилна хипертрофия на простатата с чувство на тежест към дебелото черво. Болка в уретрата и парене.

2. Каква информация трябва да имате преди да използвате GENTOS® капки

Преди да приемете лечение с GENTOS® капки се обърнете към вашия лекар за потвърждаване на диагнозата.

Не приемайте GENTOS® капки, ако сте алергични към активните или някои от съставните съставки на GENTOS® капки.

Обърнете специално внимание при лечение с GENTOS® капки



GENTOS® капки съдържа за единична доза (10 капки) 50,6 % (V/V) етанол. В предвид алкохолното съдържание в продукта, приемът трябва да се преценява индивидуално при пациенти с висок риск, страдащи от чернодробни заболявания или епилепсия. Не се препоръчва при лица, страдащи от алкохолизъм.

Ако страдате от заболяване на щитовидната жлеза, използвайте GENTOS® капки само след консултация с лекар.

Ако симптомите не се подобряват или не се достигат очакваните резултати, приемайки GENTOS® капки, моля, консултирайте се с Вашия лекар възможно най-скоро.

Прием на други лекарства

До сега не са известни взаимодействия с други лекарства.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насъкоро сте приемали други лекарства, включителни и такива, отпусканi без рецептa.

Прием на GENTOS® капки с храна и течности

GENTOS® капки се приемат сублингвално (под езика) 30 минути преди или 1 час след храна за по-добър ефект.

Бременност и кърмене

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемате каквото и да е лекарство. Поради липса на експериментални и клинични данни да се избягва употребата на GENTOS® капки по време на бременност и кърмене.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

GENTOS® капки няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Да се има предвид съдържанието на 50,6 % (V/V) етанол.

3. Как да приемате GENTOS® капки

Приемайте GENTOS® капки по инструкциите, описани в тази листовка. Моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

Добропачествена хиперплазия на простатата

	Доза	Дозиране
Възрастни	10 капки	Първоначално продукта се приема 4 пъти дневно по 10 капки. След подобряване на състоянието приемите се редуцират на 2 пъти дневно за 3 месеца.

Простатит

	Доза	Дозиране
Възрастни	10 капки	Остър простатит: Първоначално продукта се приема 4 пъти дневно по 10 капки. След подобряване на състоянието приемите се редуцират на 2 пъти дневно за 3 месеца. Рецидивиращ простатит: Първоначално продукта се приема 4 пъти дневно по 10 капки. След подобряване на състоянието приемите се редуцират на 2 пъти дневно за 2 седмици.

Цистит и слабост на мехура

	Доза	Дозиране
--	------	----------

Възрастни и подрастващи	10 капки	Цистит: Първоначално продукта се приема 4 пъти дневно по 10 капки, а деца от 1 до 12 години 4 пъти дневно по 5 капки. След подобряване на състоянието приемите се редуцират на 2 пъти дневно за 2 седмици.
Деца	5 капки	Слабост на мехура: Първоначално продукта се приема 4 пъти дневно. След подобряване на състоянието приемите се редуцират на 2 пъти дневно за 3 месеца.

Смущения в уринирането (изпускане, нощно уриниране, непълно уриниране)

	Доза	Дозиране
Възрастни и подрастващи	10 капки	Първоначално продукта се приема 4 пъти дневно по 10 капки, а деца от 1 до 12 години 4 пъти дневно по 5 капки. След подобряване на състоянието приемите се редуцират на 2 пъти дневно за 3 месеца.
Деца	5 капки	

GENTOS® капки се приемат сублингвально (под езика) 30 минути преди или 1 час след храна за по-добър ефект.

GENTOS® капки може да се приемат чисти или да се разтворят с малко количество вода.

При деца да се разреждат с вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза GENTOS® капки:
Не са известни случаи на предозиране.

Ако сте пропуснали да вземете GENTOS® капки:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Вземете следващата доза, колкото е възможно по-скоро.

Ако имате някави допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Не са известни нежелани лекарствени реакции от GENTOS® капки.

Като всяко лекарство, GENTOS® капки би могло да предизвика нежелани лекарствени реакции.

Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате GENTOS® капки

Да се съхранява в оригиналната картонена опаковка с оглед предпазване от слънчева светлина, при температура под 30°C.

Срок на годност след първоначално отваряне на опаковката: 6 месеца.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте GENTOS® капки след срока на годност, отбелязан на картонената опаковка и флакона. Датата на годност се отнася за последния ден на месеца.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

100 ml GENTOS® перорални капки, разтвор съдържат:

Populus tremuloides D1 7ml

Serenoa repens D6 10ml

Conium maculatum D6 10ml

Kalium iodatum D12 10ml



Ferrum picrinicum D12

10ml

Помощни вещества: етанол, пречистена вода.

Как изглежда GENTOS® капки като съдържание и опаковка

GENTOS® капки е бистра течност с жълтенников до кафениково-оранжев цвят.

Бутилка от кафяво стъкло с апликатор- капкомер от LDPE и капачка на винт от HDPE.

Опаковка: 20 ml, 50 ml и 100 ml.

Притежател на Разрешението за Употреба

Richard Bittner AG, Reisnerstraße 55-57; 1030 Vienna, Австрия

tel.: +43/(0)1-50 30 972

fax.: + 43/(0)1-50 30 972/40

e-mail: office.vienna@richard-bittner.com

Производител

Richard Bittner AG, Ossiacherstrasse 7, 9560 Feldkirchen, Австрия

tel.: +43/(0)4276-37888-0

fax.: +43/(0)4276-37131

e-mail: office@richard-bittner.com

Дата на последно одобрение на листовката

Март 2011

