

Листовка: информация за потребителя

20200200

Грипекс Хот Синус прах за перорален разтвор
Gripex Hot Sinus powder for oral solution

B6/17171b-593d9

24-06-2022

парацетамол / псевдофедринов хидрохлорид /
декстреметорфанов хидробромид / хлорфенаминов maleат
(Paracetamol / Pseudoephedrine hydrochloride /
Dextromethorphan hydrobromide / Chlorphenamine maleate)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Грипекс Хот Синус и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Грипекс Хот Синус
3. Как да използвате Грипекс Хот Синус
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Грипекс Хот Синус
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Грипекс Хот Синус и за какво се използва

Многокомпонентен лекарствен продукт с аналгетично, температуропонижаващо и противокашлично действие, което отпушва носните пътища и синусовите отвори на носа, намалява количеството на отделения лигавичен секрет и зачервяването и подуването на носната лигавица.

Показания:

Краткосрочно лечение на симптомите на настинка, грип, грипподобни състояния или възпаление на колатералните носни синуси, синузит, включително повишена температура, хрема, кашлица, главоболие, възпалено гърло или болки в мускулите и ставите.

Облекчава симптомите на простуда, грип и синузит.

Комбиниран продукт с комплексно действие.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Грипекс Хот Синус**Не използвайте Грипекс Хот Синус**

- ако сте алергични към някое от активните вещества или към някоя от съставките на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако имате тежка чернодробна или бъбречна недостатъчност;
- ако имате анемия (понижен брой на червените кръвни клетки);




- ако приемате едновременно други лекарства, съдържащи парацетамол, дексетрометорфан, псевдоэфедрин или хлорфенамин (вижте точка "Други лекарства и Грипекс Хот Синус");
- ако приемате едновременно инхибитори на протеини (ензими), наречени моноаминооксидазни инхибитори (МАО-инхибитори) като фенелзин, изокарбоксазид, селегилин, моклобемид. Не приемайте това лекарство в продължение на две седмици след спиране на приема на моноаминооксидазни инхибитори;
- при деца на възраст под 12 години, без да е препоръчано от лекар;
- по време на бременност и в периода на кърмене;
- ако имате продуктивна/влажна кашлица или голямо количество секрети;
- ако имате бронхиална астма и кашлица, свързана с бронхиална астма;
- ако имате хипертония;
- ако имате тежка исхемична болест на сърцето;
- ако имате кистозна фиброза (вродено генетично заболяване, което се проявява например със склонност към бронхит и пневмония).

Предупреждения и предпазни мерки

Това лекарство може да доведе до зависимост. Затова лечението трябва да е с малка продължителност.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Грипекс Хот Синус:

- ако страдате от тежка чернодробна и/или бъбреchnа недостатъчност;
- ако сте в старческа възраст, поради по-високия рисков от нежелани реакции от страна на нервната система;
- ако сте с отслабени сили или неподвижни от дълго време;
- ако имате затруднено дишане;
- ако имате емфизем, астма, хроничен бронхит, хиперплазия на простатата, хипертиреоидизъм, диабет, повищено кръвно налягане, сърдечно заболяване, артериална болест, закритоъгълна глаукома, феохромоцитом (надбъбречен тумор, проявяващ се с повищено кръвно налягане);
- ако приемате лекарства, като някои антидепресанти или антипсихотици, Грипекс Хот Синус може да взаимодейства с тези лекарства и може да изпитате промени в психическото състояние (напр. възбуда, халюцинации, кома), и други ефекти, като телесна температура над 38°C, ускорена сърдечна дейност, нестабилно кръвно налягане и усиливане на рефлексите, мускулна ригидност, липса на координация и/или стомашно-чревни симптоми (напр. гадене, повръщане, диария).
- Ако при Вас се появят нервност, замаяност и безсъние, спрете приема на лекарството и се съвржете с лекар.
- Не използвайте по-високи от препоръчителните дози.
- Потърсете съвет от лекар, ако симптомите продължават повече от 3 дни.
- Консумацията на алкохол е забранена, докато приемате лекарството, поради повишен рисков от чернодробно увреждане.
- Да не се използва едновременно с други лекарства, потискащи ЦНС (напр. лекарства със сънотворно или седативно действие).
- Поради съобщени случаи на злоупотреба с дексетрометорфан, препоръчва се да се внимава изключително много при употреба на Грипекс Хот Синус от млади хора, както и пациенти, които злоупотребяват с лекарства и психоактивни вещества.
- Препоръчва се да се внимава при пациенти със забавен метаболизъм, медиран от ензима CYP2D6, или използващи вещества, които инхибират активността на ензима CYP2D6 (изброени в точка „Други лекарства и Грипекс Хот Синус“).
- Моля, консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате лекарства, инхибиращи ензима CYP2D6. Ако се налага да приемате лекарства, инхибиращи ензима CYP2D6, едновременно с дексетрометорфан, трябва да бъдете под непосредствено наблюдение от лекар. Може да се наложи да се намали дозата на дексетрометорфан.



- Пациенти с лош метаболизъм на този ензим, както и пациенти, които употребяват едновременно CYP2D6 инхибитори, може да почувстват по-силни и/или продължителни ефекти от действието на дексетрометорфан. При едновременна употреба на лекарства със силно инхибиращо действие върху ензима CYP2D6 се повишава рисък от отравяне с дексетрометорфан, което се проявява с възбуда, дезориентация, трепер, сънливост, диария и потискане на дишането. Това може да доведе до развитие на животозастрашаващ серотонинов синдром (ускорено сърцебиене, дезориентация, прекомерно изпотяване, халюцинации, неволни мускулни движения, тръпки по тялото, трепер). При поява на такива симптоми, след прием Грипекс Хот Синус, лечението трябва да се спре и да се потърси съвет от лекар.
- Ако имате повищена температура с генерализиран кожен еритем и пустулозен (гноен) обрив, Грипекс Хот Синус трябва да се спре и незабавно и да се потърси лекарска помощ. Вижте точка 4.
- Може да възникнат внезапна коремна болка или ректално кървене при употреба на Грипекс Хот Синус, поради възпаление на дебелото черво (исхемичен колит). Ако развиете тези стомашно-чревни симптоми, спрете приема на Грипекс Хот Синус и се свържете с Вашия лекар, или потърсете незабавно медицинска помощ. Вижте точка 4.
- Може да се получи намаление на кръвния поток към Вашия оптичен нерв при Грипекс Хот Синус. Ако получите внезапна загуба на зрение, спрете приема на Грипекс Хот Синус и се свържете с Вашия лекар или незабавно потърсете медицинска помощ. Вижте точка 4.

Други лекарства и Грипекс Хот Синус

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, насърко сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Грипекс Хот Синус не трябва да се използва с други лекарства, съдържащи парacetамол, псевдофедрин или други симпатикомиметици (като лекарства, намаляващи зачервяването на носната лигавица, апетитопонижаващи средства или подобни на амфетамина психостимуланти), дексетрометорфан и/или хлорфенамин или други антихистамини (противоалергични лекарства).

Лекарства, които ускоряват изпразването на стомаха, напр. метоклопрамид и домперидон, ускоряват абсорбцията на парacetамол, докато лекарства, които забавят изпразването на стомаха, напр. холестирамин и всички холинолитици, могат да забавят абсорбцията на парacetамол и неговото действие. Наркотичните алгетици (пентазоцин, петидин, диаморфин) също забавят абсорбцията на парacetамол в кръвта.

Салициламид удължава действието на парacetамол.

Сънотворните и седативните средства засилват аналгетичното действие.

Употребата на лекарства като пропранолол (при сърдечно заболяване), низатидин (при язвено заболяване), зидовудин (противовирусно лекарство) и пробеницид (при подагра) може да повиши вредните ефекти на парacetамол, като увеличава концентрацията му в кръвта.

Салбутамол, приложен перорално, може да намали скоростта на абсорбция на парacetамол.


Парacetамол може да засили действието на лекарства, използвани при диабет и антикоагуланти, например варфарин (кумарин), и да засили действието на кофеина върху нервната система.

Парacetамол може да увеличи вредните ефекти на хлорамфеникол.

Съпътстващата употреба на парacetамол с рифампицин, антиепилептични лекарства, барбитурати и други лекарства, повлияващи метаболизма в черния дроб, повишават риска от чернодробно увреждане.

Парacetамол, приложен с МАО-инхибитори, може да причини повишаване на кръвното налягане, сърдечна аритмия, възбуда и повищена температура.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате флуоксацин (антибиотик), тъй като съществува сериозен риск от отклонения в кръвните показатели и алкално-киселинното равновесие (метаболитна ацидоза с голяма анионна разлика), което изисква спешно лечение и може да се прояви особено при пациенти с тежка степен на бъбречно увреждане, сепсис (когато бактерии и техните токсини са попаднали в кръвообращението,



което води до увреждане на органите), недохранване, хроничен алкохолизъм и при употреба на максималната дневна доза парацетамол.

Псевдофедрин повишава ефекта на други симпатикомиметични лекарства (разширяване на бронхите), но може да отслаби ефекта на метилдопа, гванетидин и резерпин.

Трицикличните антидепресанти засилват действието на псевдофедрин. Съществащата употреба на инхалаторни анестетици и псевдофедрин може да причини сърдечна аритмия. Пропранолол и МАО-инхибитори могат да повишат действието на симпатикомиметичните лекарства, включително псевдофедрин, и да причинят хипертонични кризи (внезапно повишаване на кръвното налягане). Съществащата употреба на псевдофедрин и МАО-инхибитори е противопоказана и времето между спирането на МАО-инхибиторите и приложението на псевдофедрин трябва да е най-малко 14 дни.

Алуминиев хидроксид (използван, например, за киселини) увеличава абсорбцията на псевдофедрин, докато каолинът намалява абсорбцията на псевдофедрин.

Декстрометорфан може да увеличи ефектите на МАО-инхибиторите, средствата, потискащи нервната система, алкохола и антидиаричните средства.

Лекарствата, които инхибират действието на ензима CYP2D6, като флуоксетин, пароксетин, хинидин, тербинафин, амиодарон, флекайнид, пропафенон, сертгравин, бупропион, метадон, цинакалцет, халоперидол, перфеназин и тиоридазин могат да повишат концентрацията на декстрометорфан в кръвта.

Декстрометорфан, приложен заедно с лидокаин или нестероидни аналгетици, може да повиши техния ефект.

Хлорфенамин може да повиши ефектите на МАО-инхибиторите, сънотворните и анксиолитичните (противотревожни) лекарствени продукти отベンзодиазепиновата група, антидепресантите и други лекарства, действащи върху нервната система, антималарийните лекарства (напр. хлорохин) и алкохола.

Грипекс Хот Синус с храна, напитки и алкохол

Храната може да забави абсорбцията на парацетамол.

Декстрометорфан и хлорфенамин могат да повишат ефекта от приема на алкохол.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Грипекс Хот Синус е противопоказан по време на бременност и в периода на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Грипекс Хот Синус може да повлияе в значителна степен способността за шофиране и работа с машини.

Не шофирайте или не работете с машини, докато приемате това лекарство, тъй като Грипекс Хот Синус може да попречи на безопасното извършване на тези дейности.

В една доза Грипекс Хот Синус се съдържат 15 g захароза.

Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (<23 mg) на саше, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

3. Как да използвате Грипекс Хот Синус

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



Грипекс Хот Синус е лекарство за перорално приложение.

Разтворете съдържанието на сашето в чаша с топла вода и изпийте топлата течност на малки гълтъки.

Препоръчителна доза:

Възрастни и юноши над 12 години - 1 саше; при нужда дозата може да се повтаря, но не по често от всеки 4-6 часа. Дневната доза не трябва да надвишава 4 сашета. Не използвайте лекарствения продукт по-дълго от 3 дни, без да се консултирате с лекар.

Употреба при деца и юноши

Не използвайте това лекарство при деца и юноши под 12-годишна възраст.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Грипекс Хот Синус

Ако приемете повече Грипекс Хот Синус отколкото трябва, може да изпитате следните симптоми: гадене и повръщане, неволни мускулни съкращения, възбуда, объркане, съниливост, нарушения в съзнанието, неволни и бързи движения на очите, сърдечни нарушения (ускорена сърдечна дейност), нарушения на координацията, психоза с визуални халюцинации и свръхвъзбудимост.

Други симптоми в случай на тежко предозиране може да бъдат: кома, сериозни проблеми с дишането и гърчове.

Свържете се с Вашия лекар или с болницата веднага, ако изпитате някой от горните симптоми.

Ако сте забравили да приемете Грипекс Хот Синус

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Грипекс Хот Синус

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарство това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Активните вещества, които се съдържат в Грипекс Хот Синус, може да причинят следните нежелани реакции:

Редки (засягат от 1 до 10 на 10 000 пациенти):

съниливост, замаяност, еуфория, прекалено спокойствие, чувство на празнота в главата, беспокойство, нервност, раздразнителност, нарушения на настроението, психомоторна стимулация, гадене, повръщане, болки в корема, запек, алергични реакции.

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти):

агранулоцитоза (недостатъчно бели кръвни клетки), тромбоцитопения (недостатъчно тромбоцити) неутропения (недостачно бели кръвни клетки).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Може да възникнат внезапно повишаване на температурата, зачеряване на кожата или множество малки пустули (гнойни мехурчета) (възможно е това да са симптоми на остра генерализирана екзематозна пустулоза - ОГЕП) през първите 2 дни от употребата на Грипекс Хот Синус. Вижте точка 2.

Ако се появят такива симптоми, Грипекс Хот Синус трябва да се спре и веднага да се потърси лекарска помощ.

Намален кръвен поток към оптичния нерв (исхемична оптична невропатия).

Възпаление на дебелото черво поради недостатъчно кръвоснабдяване (исхемичен колит).

Освен това Грипекс Хот Синус може да причини:

- сърдечна аритмия;
- хипопнея;
- обрив, сърбеж;
- промени в кръвното налягане;
- чернодробни симптоми с различна тежест, от клинично незначими повишавания на чернодробните ензими до чернодробно увреждане. Нежеланият ефект върху черния дроб е по-голям в случай на недохранване, алкохолизъм и наличие на други заболявания, както и съпътстваща употреба на някои лекарства.

Някои симптоми (например гадене, повръщане, съниливост, замаяност, хипопнея) може да са по-чести и по-тежки при неподвижни пациенти.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителната агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев“ № 8,
1303 София,
тел.: +3592 8903417,
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Грипекс Хот Синус

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелзан върху опаковката след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да съхранявате лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Грипекс Хот Синус

- Активните вещества са: парациетамол, псевдофедринов хидрохлорид, дексетрометорфанов хидробромид, хлорфенаминов малеат
Едно саше съдържа: 650 mg парациетамол, 60 mg псевдофедринов хидрохлорид, 20 mg дексетрометорфанов хидробромид и 4 mg хлорфенаминов малеат
- Другите съставки са: аскорбинова киселина, лимонена киселина, аромат на лимон, повидон, натриев цитрат, царевично нишесте, стеаринова киселина, захароза, титанов диоксид, калцийев фосфат, хинолиново жълто.

Как изглежда Грипекс Хот Синус и какво съдържа опаковката

Грипекс Хот Синус е опакован в ламинирани сашета от хартия/полиетилен/алуминий/сурлин (смола-йономер); В една картонена кутия се съдържат 6, 8 или 12 сашета.



Притежател на разрешението за употреба
US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław, Полша

Производители
US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław, Полша

MEDICOFARMA S.A.
ul. Tarnobrzeska 13
26-613 Radom, Полша

Дата на последно преразглеждане на листовката
април 2022

