

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Хепкарсил® 45 mg твърди капсули

Hepcarsil® 45 mg capsules, hard

(Сух екстракт от плодове на бял трън, съответстващ на 45 mg Силимарин) (Silybi mariani fructus extractum siccum, equivalent to 45 mg Silymarin)

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Хепкарсил и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемате Хепкарсил
3. Как да приемате Хепкарсил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хепкарсил
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	9900437
Разрешение №	BG/MA/HB-7-98/
Одобрение №	17 -04- 2018

1. Какво представлява Хепкарсил и за какво се използва?

Хепкарсил е лекарствен продукт, чието активно вещество Силимарин има растителен произход. Действа стабилизиращо върху клетъчните мембрани на чернодробните клетки, възстановява тяхната структура и стимулира обмяната на веществата в тях, по-специално тази на белъците и въглехидратите (гликоген и гликопротеини). В резултат на това действие Хепкарсил значително подобрява нарушените чернодробни функции.

Хепкарсил се прилага за симптоматично лечение на хронични токсични чернодробни увреждания, за поддържащо лечение при пациенти с хронични възпалителни заболявания на черния дроб или чернодробна цироза.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Хепкарсил

Не приемайте Хепкарсил

- ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство.

Обърнете специално внимание при употреба на Хепкарсил

- Да не се употребява при деца под 12 години поради липса на данни за тази възрастова група.
- Когато приемате лекарството, трябва да се избягват причините за увреждане на черния дроб, като употреба на алкохол.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или накратко сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускані без рецепт. До момента не са известни неблагоприятни взаимодействия с други лекарства.

Прием на Хепкарсил с храни и напитки

Не са известни взаимодействия с храни и напитки.



Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Само Вашият лекар може да прецени необходимостта от лечението при такива състояния.

Шофиране и работа с машини

Хепкарсил не повлиява активното внимание и рефлексите при шофиране и при лица, работещи с машини.

Важна информация относно някои съставки на Хепкарсил

Капсулите съдържа оцветител Е 122, който може да предизвика алергични реакции.

3. Как да приемате Хепкарсил

Ако Вашият лекар не Ви е препоръчал друго, обичайната доза е 3 пъти по 1 капсула дневно. Капсулите се приемат несдъвкани с малко течност.

По препоръка на лекаря продуктът може да се приема 3 пъти по 2 капсули дневно. Продължителността на лечебния курс е не по-малка от 3 месеца.

За продължително лечение дневната доза е две капсули дневно.

Ако оплакванията продължат, да се потърси отново лекарски съвет.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Хепкарсил

При редки случаи нежеланите лекарствени реакции могат да се появят в засилена форма. В такива случаи да се потърси лекуваният лекар за симптоматично лечение.

Ако сте пропуснали да приемете Хепкарсил

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Възстановете обичайната си схема.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, Хепкарсил може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Могат да се появят вестибуларни нарушения.

Много рядко Силимарин може да предизвика болки в стомаха и диария, а още по-рядко алергични реакции - кожни обриви и сърбеж. Рядко може да се наблюдава засилване на съществуващи вестибуларни нарушения (световъртеж).

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Хепкарсил

Съхранявайте Хепкарсил в оригинални опаковки, на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25° C.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца!

Не използвайте Хепкарсил след срока на годност, отбелзан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

6. Допълнителна информация

Активно вещество: сух екстракт от плодове на бял трън 70-90 mg, съответстващ на 45% силимарин.

Другите съставки са: манитол, кроскармелоза натрий, натриев лаурил сулфат, колоиден бензоиден силициев диоксид, прежелатинизирано нишесте, повидон, полисорбат 80, талк,магнезиев стеарат.



Състав на капсулната обвивка: азорубин (Е122), патентно синьо (Е131), титанов диоксид (Е171), желатин.

Как изглежда Хепкарсил и какво съдържа опаковката

10 капсули в блистери от PVC/ алуминиево фолио

4 броя блистери в картонена кутия

Притежател на разрешението за употреба

БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ АД

бул. „Тракия“ №75,

8800 Сливен, България

Производител

СОФАРМА АД

Индустриална зона

2800 Сандански, България

Дата на последно одобрение на листовката:

Декември, 2017

