

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**ХЮМЕКСКОФ ЗА ВЪЗРАСТНИ 5g/100ml сироп****HUMEXCOUGH ADULTS 5g/100ml syrup
Карбоцистеин (Carbocisteine)**

Прочетете внимателно тази листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ХЮМЕКСКОФ за възрастни и за какво се използва?
2. Преди да приемете ХЮМЕКСКОФ за възрастни
3. Как да приемате ХЮМЕКСКОФ за възрастни
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ХЮМЕКСКОФ за възрастни
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Какво се използва?
Към РУ №:
Одобрено: <i>48/ 08.22.10</i>

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХЮМЕКСКОФ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Това лекарство е показано за лечение на скорошно заболяване на дихателната система, свързано със затруднения в отхрачването при възрастни и деца над 15-годишна възраст.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ХЮМЕКСКОФ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Не приемайте ХЮМЕКСКОФ за възрастни

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки,

Ако имате съмнения, посъветвайте се с лекар или с фармацевт.


Обърнете специално внимание при употреба на ХЮМЕКСКОФ за възрастни

- Ако имате силно отделяне на храчки, инфектирани храчки и висока температура;
- Ако имате хронично бронхиално или белодробно заболяване;
- Ако имате язва на стомаха и дванадесетопръстника.

Тъй като това лекарство съдържа захароза, то не трябва да се използва в случай на непоносимост към фруктоза, синдром на лошо усвояване на галактоза и глюкоза или в случай на недостиг на захароза-изомалтаза (редки обменни заболявания).

Това лечение трябва винаги да се съпровожда със съзнателно усилие за откашляне, за да може да се отделят храчките.

ТРЕБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ЛЕКАР, АКО ЛИПСВА ПОДОБРЕНИЕ НА СЪСТОЯНИЕТО ВИ.



Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или доскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Не комбинирайте карбоцистеин с други лекарства, предназначени да намалят бронхиалната секреция.

Този лекарствен продукт съдържа карбоцистеин. Други лекарства може също да съдържат това активно вещество. Внимавайте да не комбинирате тези лекарства, защото може да надхвърлите препоръчаните максимални дози (виж раздел: "КАК ДА ПРИЕТЕТЕ ХЮМЕКСКОФ за възрастни")

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевта преди употребата на което и да е лекарство!

Шофиране и работа с машини

Няма данни.

Важна информация относно някои от помощните съставки на ХЮМЕКСКОФ за възрастни

Този лекарствен продукт съдържа:

- Захароза. Когато се приема, съгласно препоръките за дозиране, всяка доза (1 супена лъжица от 15 ml) набавя до 5 g захароза. Неподходящ при хора с вродена непоносимост към фруктозата, глюкозен/галактозен синдром на лошо усвояване или захарозно/изомалтазен недостиг.
- Ако сте диабетик или спазвате диета с ниско съдържание на захар, имайте предвид, че всяка супена лъжица от 15 ml от това лекарство съдържа 5 g захароза.
- Натриев метил-парахидроксибензоат. Известно е, че причинява уртикария.

Спорт: Няма данни за влияние

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ХЮМЕКСКОФ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Винаги приемайте ХЮМЕКСКОФ за възрастни точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НАД 15-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.

Приема се през устата.

- Обичайната доза е: 1 супена лъжица от 15 ml - 3 пъти дневно, за предпочитане на гладно.
- Продължителността на лечение е ограничена - до 5 дни.

Ако сте приели повече от необходимата доза ХЮМЕКСКОФ за възрастни

При случайно предозиране, СПРЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО И НЕЗАБАВНО УВЕДОМЕТЕ ЛЕКАР.

Ако сте пропуснали да приемете ХЮМЕКСКОФ за възрастни


Не вземайте двойна доза, заради пропуснатата единична доза.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства ХЮМЕКСКОФ за възрастни може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава:

Възможни са храносмилателни оплаквания: гадене, повръщане, диария.

В такъв случай е препоръчително да намалите дозата.



Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ХЮМЕКСКОФ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Съхранявайте при температура под 25°C.

Не използвайте ХЮМЕКСКОФ за възрастни след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ХЮМЕКСКОФ за възрастни

- Активно вещество: Карбоцистеин (5.000 g на 100 ml)
- Другите съставки са: натриев метил парахидроксibenзоат, разтвор на натриев хидроксид, аромат на карамелов пунш, лимонена киселина монохидрат, разтвор на захароза, пречистена вода.

Една доза (1 супена лъжица от 15 ml) съдържа 750 mg карбоцистеин и 5 g захароза.

Как изглежда ХЮМЕКСКОФ за възрастни и какво съдържа опаковката
Сироп; бутилка от 125 ml.

Притежател на разрешението за употреба:

Laboratoires URGO, 42, rue de Longvic - 21300 CHENOVE, Франция

Производител

Laboratoires URGO, ZI Excellence 2000 - 21800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR, Франция

Дата на последно одобрение на листовката: Септември, 2008

