

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Инфлуцид таблетки
Influcid tablets

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОВАТА	
Кратка характеристика на продукта Приложение 1	
Към Рег. №	20040331
Разрешение №	04-09-2024
BG/MA/MP -	66471
Одобрение №	/

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 таблетка (250 mg) съдържа:

Активни вещества:

Аконитум (Aconitum) trit. D3	25,0 mg
Гелземиум (Gelsemium) trit. D3	25,0 mg
Ипекакуана (Ipecacuanha) trit. D3	25,0 mg
Фосфорус (Phosphorus) trit. D5	25,0 mg
Бриония (Bryonia) trit. D2	25,0 mg
Еупаториум перфолиатум (Eupatorium perfoliatum) trit. D1	25,0 mg

Помощни вещества с известно действие: лактоза монохидрат, захароза
За пълния списък на помощните вещества виж 6.1

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка. Бяла до почти бяла, плоска таблетка със скосени ръбове и делителна черта, понякога с мозаична структура.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

За лечение на простудни и грипозни заболявания, съпроводени с повишена температура.

4.2 Дозировка и начин на употреба

Дозировка

Възрастни и деца от 12 годишна възраст: при остри състояния приемат по 1 таблетка на всеки 2 часа, докато настъпи подобрене. Максималната дневна доза е 6 таблетки. За по-нататъшно лечение се приемат по 1-3 таблетки дневно.

За профилактика на инфекции се приема по 1 таблетка 3 пъти дневно.

Педиатрична популация

Деца на 1 година: приемат по 1/2 таблетка 2 пъти дневно. Максималната дневна доза е 1 таблетка.

Деца на 2 години: приемат 1/2 таблетка 3 пъти дневно. Максималната дневна доза е 1,5 таблетки.

Деца на от 3 до 4 години: приемат по 1/2 таблетка на всеки 4 часа. Максималната дневна доза е 2 таблетки.

Деца на 5 години: приемат по 1/2 таблетка на всеки 3 часа. Максималната дневна доза е 2,5 таблетки.

Деца от 6 до 11 години: приемат по 1/2 таблетка на всеки 2 часа. Максималната дневна доза е 3 таблетки.



За профилактика на инфекции деца на възраст от 6 до 11 години: приемат по 1 таблетка 2 пъти дневно. Инфлуцид не трябва да се използва за профилактика на инфекции при деца под 6 години.

Начин на приложение

Таблетките трябва да се оставят да се разтопят бавно в устата. За малки деца е възможно таблетките да се разтварят в малко вода.

Необходимо е да се спазва интервал от поне половин час между хранене и приема на лекарството.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към Еупаториум перфолиатум, към други растения от семейство Сложноцветни, към някои от активните или помощните вещества на продукта (изброени в точка б)

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Този лекарствен продукт съдържа лактоза и пшенично нишесте. Пациенти, които страдат от наследствена галактозна непоносимост, Lарр лактазна недостатъчност или глюкозен / галактозен синдром на малабсорбция не трябва да приемат този лекарствен продукт. Пшеничното нишесте може да съдържа глутен, но в незначителни количества, поради това употребата на продукта при пациенти с цьолиакия се счита за безопасна. Пациенти с алергия към пшеница (различна от цьолиакия) не трябва да приемат този продукт.

Преценка на терапията е необходима:

- ако състоянието не се подобри или се влоши
- ако възникнат допълнителни оплаквания
- ако температурата не спада или се повиши над 39°C

Педиатрична популация

Инфлуцид не трябва да се прилага при деца под една година, поради липсата на достатъчно данни за употребата на продукта в тази възраст.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са наблюдавани взаимодействия с други лекарствени продукти. Употребата на този хомеопатичен лекарствен продукт не изключва употребата на други лекарствени продукти.

Пациентите се съветват да се консултират с лекар, ако приемат, наскоро са приемали или може да приемат други лекарствени продукти.

Забележка: Действието на хомеопатичните лекарствени продукти може да бъде неблагоприятно повлияно от вредни фактори на житейските навици, както и от стимуланти, алкохол и тютюн.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Препоръчва се консултация с лекар преди употребата на този продукт.

Както при всички други лекарства, по време на бременност и кърмене, Инфлуцид трябва да се приема само след отчитане на съотношението полза-риск.



4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Инфлуцид няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Много редки (<1/10,000) или с неизвестна честота (честотата не може да бъде оценена според наличните данни):

Реакции на свръхчувствителност, например кожен обрив или гастро-интестинални оплаквания. В тези случаи е необходимо да се преустанови лечението с Инфлуцид и да се предприемат подходящи терапевтични мерки.

Забележка: Съществуващите оплаквания могат временно да се влошат, когато се приемат хомеопатични лекарства (начално хомеопатично влошаване). В тези случаи е необходима консултация с лекар и преустановяване на лечението.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции:

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.: +359 28903417
уебсайт: www.bda.bg

4.9 Предозиране

Няма докладвани случаи на предозиране.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

Фармацевтична група: Хомеопатичен лекарствен продукт

Хомеопатичната терапия се различава значително от конвенционалната медицина по отношение на разбирането за заболяванията и използването на лечебните вещества. Хомеопатичните средства не се използват като сурови материали или билки. Те обикновено са потенцирани чрез последователни разреждания. Затова хомеопатията е регулираща терапия, която не влияе директно на симптомите. Хомеопатичните средства стимулират механизмите за собствена защита на организма и по този начин активират самолечителните сили. Тя не е предимно лекарствена терапия, тъй като желаното действие е собствената реакция на организма. Отговорът на организма на хомеопатичните действия е строго индивидуален, според различните симптоми. Поради тези причини не могат да бъдат определени специфични за дозата фармакологични ефекти, фармакокинетични и фармакодинамични данни.

5.1. Фармакодинамични свойства

Неприложимо

5.2. Фармакокинетични свойства

Неприложимо

5.3 Предклинични данни за безопасност



Неприложимо. Инфлуцид като хомеопатичен лекарствен продукт не е преминавал през предклинични проучвания.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1. Списък на помощните вещества

Лактоза монохидрат
магнезиев стеарат
пшенично нишесте

6.2 Несъвместимости

Неприложимо

6.3 Срок на годност

5 години
Да не се използва след срока на годност, отбелязан на опаковката.

6.4 Специални условия за съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

6.5 Вид и съдържание на опаковка

20 таблетки в блистер. Опаковка, съдържаща 2 блистера в картонена кутия.
20 таблетки в блистер. Опаковка, съдържаща 3 блистера в картонена кутия.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Alpen Pharma GmbH
Steinfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Германия

8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

20040331

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА



Дата на първо разрешаване: 08.07.2004
Дата на последно подновяване: 19.11.2009

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

07/2024

