

Листовка: информация за потребителя

Иноседа 500 таблетки
Inoseda 500 mg tablets

инозин пранобекс/inosine pranobex

ОПЛАНИТЕ ОНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Код Рег. №	20220013
Разрешение №	
20858	08-01-2026

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Иноседа и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Иноседа
3. Как да приемате Иноседа
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Иноседа
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Иноседа и за какво се използва

Иноседа съдържа активната съставка инозин пранобекс, която се използва за лечение на някои вирусни инфекции и за засилване на естествения имунитет на организма и имунния му отговор към вирусни инфекции. Лекарството повлиява най-вече компонентите на клетъчния имунитет. То има и антивирусен ефект.

Иноседа се използва с цел да стимулира Вашата имунна система да преодолее вирусни инфекции, като:

- грип/вирусни инфекции на дихателните пътища;
- повтарящ се/рекурентен генитален херпес;
- повтарящ се/рекурентен херпес симплекс на устните;
- херпес зостер (болезнена инфекция с мехурчета по хода на нерв);
- варицела (лещенка);
- морбили (дребна шарка - инфекция на дихателните пътища с повишена температура и кожен обрив);
- паротит/заушка (вирусна инфекция, която може да доведе до подуване и болки в околоушните слюнчени жлези);
- вирусен хепатит;
- генитални брадавици и други инфекции, причинени от човешкия папилома;
- други вирусни инфекции, като инфекциозна мононуклеоза (инфекция, причинена от вируса на Епщайн-Бар), инфекция, причинена от цитомегаловирус;
- подостър склерозиращ паненцефалит (неврологично заболяване на деца и млади хора, което засяга централната нервна система).



2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Иноседа

Не приемайте Иноседа

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към инозин пранобекс или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако страдате от подагра;
- ако имате високи нива на пикочната киселина.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Иноседа ако:

- знаете, че имате подагра или повишени нива на пикочната киселина;
- знаете, че имате камъни в бъбреците;
- страдате от бъбречно заболяване (трябва да бъдете проследявани);
- Ви предстои продължително лечение (ще трябва да провеждате редовни изследвания на кръвта и проверка на бъбречната и чернодробната функции). При пациенти на продължително лечение е възможно образуване на камъни в бъбреците;
- забележите признаци на алергична реакция, като обрив, сърбеж, затруднено дишане или подуване на лицето, устните, гърлото или езика. В такъв случай веднага спрете лечението и посетете лекаря си.

Деца

Лекарството не трябва да се използва при деца под 1-годишна възраст.

Други лекарства и Иноседа

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Ако приемате някое от изброените по-долу лекарства, обърнете специално внимание на лекаря си, тъй като те могат да взаимодействат с Иноседа:

- алопуринол или други лекарства за подагра;
- диуретици (обезводняващи лекарства);
- лекарства, които потискат имунната система, напр. след трансплантация на орган;
- азидотимидин (лекарство за лечение на СПИН).

Иноседа с храна, напитки и алкохол

Иноседа таблетки могат да се приемат със или без храна. Приемайте Иноседа с чаша вода и не сдъвквайте таблетките.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Иноседа не трябва да се прилага по време на бременност или кърмене, освен ако Вашият лекар не счита това за наложително.

Шофиране и работа с машини

Иноседа не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Иноседа

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

За перорално приложение.



Приемайте това лекарство със или без храна, по всяко време на деня.

Възрастни

Обичайната доза е по 2 таблетки до 4 пъти дневно.

Лица в старческа възраст (над 65 години)

Не е необходима корекция на дозата.

Деца над 1 годишна възраст

При деца с телесно тегло под 20 кг: 1 таблетка дневно/10 кг телесно тегло.

При деца с телесно тегло над 20 кг: по 2 таблетки, до 4 пъти дневно.

Вашият лекар ще определи правилната за Вас доза, в зависимост от Вашето телесно тегло и вида и тежестта на Вашето заболяване и ще Ви посъветва колко дълго да приемате лекарството. Важно е да приемате лекарството през целия период на предписаното Ви лечение, дори ако симптомите отзвучат.

Ако сте приели повече от необходимата доза Иноседа

До този момент няма съобщения за случаи на предозиране. Ако сте приели повече таблетки от необходимото, моля свържете се с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Иноседа

Ако сте пропуснали доза, вземете я възможно най-скоро след като си спомните, освен ако не е наближило времето за Вашата следваща доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Иноседа

Ако спрете лечението, желаният ефект няма да бъде постигнат или симптомите могат да се влошат отново. Консултирайте се с Вашия лекар, преди да спрете лечението.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете употребата на лекарството и се свържете с Вашия лекар, ако получите:

- внезапно хриптене/свирене в гърдите;
- затруднено дишане и/или замайване;
- подуване на клепачите, лицето или гърлото;
- обрив или сърбеж (особено засягащ цялото тяло).

При лечение с това лекарство са възможни следните нежелани лекарствени реакции.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

- временно повишени стойности на пикочната киселина в кръвта и урината.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

- повишени стойности на чернодробните ензими;
- повишени стойности на урея (отпадъчен продукт) в кръвта;
- кожен обрив;
- сърбеж;
- болки в ставите;
- повръщане;



- гадене;
- болки в стомаха;
- умора;
- слабост (неразположение);
- главоболие;
- световъртеж (вертиго).

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

- диария;
- запек;
- сънливост;
- невъзможност за заспиване и нарушен сън (инсомния);
- нервност;
- увеличено количество на урината (полиурия).

С неизвестна честота (честотата не може да се определи от наличните данни):

- болки в корема;
- подуване на лицето, устните, клепачите или гърлото (ангиоедем);
- копривна треска;
- алергична реакция, засягаща цялото тяло (анафилактична реакция);
- нарушена стабилност (замаяност);
- зачервяване на кожата (еритема).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Иноседа

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Иноседа

- Активното вещество е: инозин пранобекс. Всяка таблетка съдържа 500 mg инозин пранобекс.
- Другите съставки са: царевично нишесте, повидон К-90, микрокристална целулоза, стearинова киселина, магнезиев стеарат, пречистена вода.



Как изглежда Иноседа и какво съдържа опаковката

Иноседа 500 mg таблетки са бели на цвят, с принтиран надпис INO, без делителна черта, кръгли, гладки. Опаковани са в непрозрачни PVC – PVDC / Alu блистери, съдържащи 10, 20, 40 или 100 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Ворлд Медисинс Европа ЕООД
ул. „Борис Руменов“ 16
1407 София, България

Дата на последно преразглеждане на листовката

11/2025

