

Уважаеми пациенти,
Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация! Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар или фармацевт!

IRS® 19
ИРС 19



Комбинация от бактериални лизати

Кое е лекарственото вещество?

За 100 ml спрей за нос:

Суспензия от бактериални лизати* (43,27 ml):

* Streptococcus pneumoniae тип I	1,11 ml
Streptococcus pneumoniae тип II	1,11 ml
Streptococcus pneumoniae тип III	1,11 ml
Streptococcus pneumoniae тип V	1,11 ml
Streptococcus pneumoniae тип VIII	1,11 ml
Streptococcus pneumoniae тип XII	1,11 ml
Haemophilus influenzae тип B	3,33 ml
Klebsiella pneumoniae подвид pneumoniae	6,66 ml
Staphylococcus aureus	9,99 ml
Acinetobacter calcoaceticus var. baumannii	3,33 ml
Moraxella catarrhalis	2,22 ml
Neisseria subflava var. flava	2,22 ml
Neisseria subflava var. perflava	2,22 ml
Streptococcus pyogenes група A	1,66 ml
Streptococcus dysgalactiae група C	1,66 ml
Enterococcus faecium	0,83 ml
Enterococcus faecalis	0,83 ml
Streptococcus група G	1,66 ml

Какво представлява ИРС 19?

ИРС 19 е имуностимулиращ лекарствен продукт

За какво се използва ИРС 19?

ИРС 19 се използва за краткотрайна профилактика на повтарящи се инфекции в областта на ушите, носа и гърлото.

Това лекарство е предписано лично за Вас и не трябва да го давате на други хора!

Кога не трябва да използвате ИРС 19?

ИРС 19 не трябва да използвате в следните случаи:

- При алергия към някоя от съставките на продукта
- При бременност или кърмене (освен с изричната препоръка на Вашия лекар!)

За повече информация, се обърнете към Вашия лекар!

Какво трябва да имате предвид по време на бременност или кърмене?

ИРС 19 **НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА** по време на бременност или кърмене, освен с изричната препоръка на Вашия лекар!



Ако имате съмнения за евентуална бременност по време на употребата на *ИРС 19*, консултирайте се с Вашия лекар! Той ще реши дали да продължите приема на лекарството!

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид?

В случай на съмнения, свързани с употребата на *ИРС 19*, се обърнете за съвет към Вашия лекар.

Предупредете Вашия лекар, ако имате някаква алергия!

Внимание!

- Ако се появи кашлица с гнойно възпаление на гърлото или втрисане, консултирайте се с Вашия лекар, за да може той да промени лечението Ви по подходящ начин!

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на *ИРС 19*?

За да избегнете възможни взаимодействия между няколко лекарства, трябва редовно да уведомявате Вашия лекар за всяко друго лечение, което провеждате в момента.

В каква доза и колко често можете да приемате *ИРС 19*?

Следните препоръки важат за *ИРС 19*, ако Вашият лекар не е предписал друго:
2 пъти по 1 впръскване дневно във всяка ноздра в продължение на 2 седмици

Кога и как можете да приемате *ИРС 19*?

- 2 пъти на ден (напр. сутрин и вечер)
- *ИРС 19* се впръсква в носа!
- За да впръскате, дръжте бутилката изправена и еднократно, бързо и кратко натиснете капачката надолу!

ВАЖНО!

- Поставете накрайника върху бутилката, като го центрирате добре без да натискате силно!
- Поставете го в ноздрата леко, без натиск.
- По време на впръскване, **дръжте главата си изправена, а бутилката – строго вертикално.**
- **Едно впръскване** означава едно краткотрайно натискане на накрайника на бутилката.
- Натискането на накрайника **при наклонена бутилка**, може да освободи за няколко секунди цялото количество изтласкващ газ от бутилката, при което тя да стане **НЕИЗПОЛЗВАЕМА!**
- При употребявана, неизползвана за известно време бутилка е възможно запушване на изхода на накрайника от изкристализирала капка изпарила се течност! Това обикновено става, ако накрайникът е свален и обърнат надолу! Затова се препоръчва, накрайникът да остане на мястото си, след като веднъж е поставен и използван!
- В случай, че накрайникът е запушен – натиснете го неколккратно до отпушването му, ако няма ефект – потопете накрайника за няколко минути в хладка вода.

Колко дълго можете да приемате *ИРС 19*?

Профилактичният курс с *ИРС 19* продължава средно 2 седмици!



Какви нежелани реакции може да предизвика ИРС 19?

Както всички активни продукти *ИРС 19* може да доведе до повече или по-малко неприятни нежелани реакции!

ИРС 19 може да предизвика алергични реакции (копривна треска и др.)! При поява на такава реакция, преустановете употребата на *ИРС 19* и се консултирайте с лекар!

Информирайте Вашия лекар или фармацевт за всякакви други нежелани реакции, неспоменати в тази листовка!

Какви указания за съхранение трябва да спазвате?

Внимание! Опаковка под налягане!

- Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура под 25°C!
- Не оставяйте бутилката при температура над 50°C или на пряка слънчева светлина!
- Не я пробивайте!
- Не я изгаряйте, дори когато е празна!
- Да се съхранява на недостъпни за деца места!

Какъв е срокът на годност на ИРС 19?

- Срокът на годност на *ИРС 19* е 3 години, от датата на производство!
- Не използвайте опаковката след изтичане срока на годност, (датата върху опаковката!)

Какво още съдържа ИРС 19?

За 100 ml: глицин (4250,000 mg), аромат на портокалови цветове (12,500 mg), натриев меркуротиолат (тиомерсал, 1,08 mg), дестилирана вода (до обем 100,000 ml), азот за изтласкване под налягане.

В какви опаковки се предлага ИРС 19?

IRS® 19 спрей за нос в бутилка под налягане, 20 ml (= 60 впръсквания)

Притежател на разрешението за употреба:

Solvay Pharma

42, rue Rouget de Lisle-B.P. 22

92151, Suresnes, Cedex France

Производител:

Solvay Pharmaceuticals

Avenue Foch-B.P. 25

014000 Chatillon-sur-Chalaronne France

Кой е отговорен за продажбата на ИРС 19 в България?

Солвей Фарма ЕООД

1680 София

Ул. Хайдушка гора № 48А

Кога е изготвена тази листовка?

август, 2003 г.

Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар

