



перорална ротавирусна ваксина

Rotarix™
само с 2 дози през устата

Rotarix™ се приема през устата в 2 дози. Ваксинационният курс може да започне още след 6-тата седмица на бебето и трябва да завърши до 6-ия месец, за да се осигури ранна защита срещу ротавируси на бебето, във възрастта, когато имунитетът от майчините антитела спада и се наблюдава пик на заболяването.

Ротавирусите са силно заразни и много устойчиви във външна среда. На суха твърда повърхност издържат 10 дни, а в канализацията цели 2 месеца. За това и ротавирусните инфекции засягат 95% от децата преди да навършат 5 г. и причиняват диарии и повръщане, което може да доведе до:

- Тежка дехидратация, която може да бъде животозастрашаваща.
- Прием в болница.
- Мъчително последващо хранване.
- Лактозна непоносимост, което налага преминаване към безлактозно мляко.
- Вторична непоносимост към белтъка на кравето мляко.
- Ротавирусната инфекция може да отключи аутоимунно заболяване като диабет тип 1 или да провокира поява на алергии (при генетична предиспозиция).



**РОТАВИРУСНАТА ИНФЕКЦИЯ МОЖЕ ДА ИМА ПОСЛЕДИЦИ
ОТВЪД ДИАРИЯТА И ПОВРЪЩАНЕТО!**

Rotarix е запазена марка на ГлаксоСмитКлайн. Лекарствен продукт по лекарско предписание. Прилага се при деца от 6 седмици до 6 месеца. Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за ГлаксоСмитКлайн. Ако считате, че имате нежелана лекарствена реакция, ако имате неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на телефон: (02) 953 10 34/ факс: (02) 950 56 05. Материалът е получил разрешение от ИАЛ номер А-428/19.04.2012. BG/ROT/0006/12. Материалът е одобрен до 01/2014

gsk
GlaxoSmithKline