

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Клацид 125 mg/5 ml гранули за перорална суспензия

Klacid 125 mg/5 ml granules for oral suspension

разрешение №

B6/14174/р 56256

22.04.2021

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

5 ml от готовата суспензия за перорално приложение съдържат съответно 125 mg кларитромицин (*clarithromycin*).

Помощно вещество с известно действие: захароза 550 mg/ml.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Гранули за перорална суспензия.

Гранулите за приготвяне на пероралната суспензия са бели до почти бели на цвят.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ**4.1 Терапевтични показания**

Клацид гранули за перорална суспензия е показан за лечение на инфекции, причинени от чувствителни микроорганизми, като:

- Инфекции на горните дихателни пътища (напр. фарингит, синуит)
- Инфекции на долните дихателни пътища (напр. бронхит, пневмония) (вж. точки 4.4 и 5.1 относно тестване за чувствителност)
- Остър отит на средното ухо
- Инфекции на кожата и подкожните тъкани (напр. фоликулит, целулит, еризипел) (вж. точки 4.4 и 5.1 относно тестване за чувствителност)
- Дисеминирани или локализирани микобактериални инфекции, причинени от *Mycobacterium avium* или *Mycobacterium intracellulare*; локализирани инфекции, причинени от *Mycobacterium cheloneae*, *Mycobacterium fortuitum* или *Mycobacterium kansasii*

4.2 Дозировка и начин на приложениеДозировка

Деца под 12 годишна възраст

Клинични проучвания са били проведени при деца от 6 месечна възраст до 12 годишна възраст с кларитромицин суспензия. Следователно, деца под 12 годишна възраст трябва да използват кларитромицин суспензия (гранули за перорална суспензия).

Препоръчиваната дневна доза на кларитромицин суспензия за деца (125 mg/5 ml) при деца е 7,5 mg/kg два пъти дневно до максимална доза от 500 mg дневно при не микобактериални инфекции. Обичайната продължителност на лечението е от 5 до 14 дни, в зависимост от причинителя и от тежестта на заболяването. Приготвената суспензия може да се приеме с или без храна, и може да бъде взета с мляко.



На следващата таблица е представено помошно ръководство за определяне на дозата, въз основа на телесното тегло на детето и концентрацията на супензията (125 mg/5 ml или 250 mg/5 ml).

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОЗИРАНЕ ПРИ ПЕДИАТРИЧНИ ПАЦИЕНТИ, въз основа на телесното тегло		
Тегло*	7,5 mg/kg доза в ml давана два пъти дневно	
Kg	125 mg/5 ml	250 mg /5 ml
8-11	2,5 ml	1,25 ml
12-19	5 ml	2,5 ml
20-29	7,5 ml	3,75 ml
30-40	10 ml	5 ml

* При деца с тегло под 8 kg, дозата трябва да се определя на база килограм телесно тегло (около 7,5 mg/kg, два пъти дневно).

Дозировка при пациенти с микобактериални инфекции

При деца с дисеминирани или локализирани микобактериални инфекции (*M. avium*, *M. intracellulare*, *M. cheloneae*, *M. fortuitum*, *M. kansasii*), препоръчваната доза е 7,5 до 15 mg/kg кларитромицин два пъти дневно, без да се превишава максимална доза от 500 mg два пъти дневно.

Лечението с кларитромицин трябва да продължи докато има клинична полза. Добавянето на друг антимикобактериален лекарствен продукт може да бъде от полза.

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОЗИРАНЕ ПРИ ПЕДИАТРИЧНИ ПАЦИЕНТИ С МИКОБАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ, въз основа на телесното тегло		
Тегло*	Доза в ml давана два пъти дневно (КЛАРИТРОМИЦИН 250 mg/5 ml)	
Kg	7,5 mg/kg два пъти дневно	15 mg/kg два пъти дневно
8-11	1,25 ml	2,5 ml
12-19	2,5 ml	5 ml
20-29	3,75 ml	7,5 ml
30-40	5 ml	10 ml

* При деца с тегло под 8 kg, дозата трябва да се определя на база килограм телесно тегло (7,5 mg/kg до 15 mg/kg, два пъти дневно).

Бъбречно увреждане

При деца с креатининов клирънс под 30 ml/min/1,73 m², дозата на кларитромицин трябва да бъде намалена наполовина, т.е. до 250 mg дневно, или 250 mg два пъти дневно при по-тежки инфекции. Дозирането не трябва да продължава повече от 14 дни при тези пациенти.

Начин на приложение

За указания относно начина на приготвяне на пероралната супензия вижте табла



4.3 Противопоказания

- Свръхчувствителност към макролидни антибиотици или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.
- Едновременно приложение на Клацид с някое от следните лекарства е противопоказано: астемизол, цизаприд, домперидон, пимозид, терфенадин, тъй като това може да доведе до удължаване на QT и сърдечни аритмии, включително камерна тахикардия, камерно мъждане и *torsades de pointes* (вж. точки 4.4 и 4.5).
- Едновременно приложение на Клацид с ерг алкалоиди (напр. ерготамин или дихидроерготамин) е противопоказано, тъй като това може да доведе до ерг токсичност (вж. точка 4.5).
- Едновременно приложение на Клацид и перорален мидазолам е противопоказано (вж. точка 4.5).
- Съпътстващото приложение на кларитромицин и ломитапид е противопоказано (вж. точка 4.5).
- Клацид не трябва да се прилага при пациенти с анамнеза за удължен QT (вродено или документирано придобито удължаване на QT-интервала) или камерна сърдечна аритмия, включително *torsades de pointes* (вж. точки 4.4 и 4.5).
- Клацид не трябва да се дава на пациенти с електролитни нарушения (хипокалиемия или хипомагнеземия, поради риск от удължаване на QT-интервала).
- Клацид не трябва да се използва при пациенти с тежка чернодробна недостатъчност в комбинация с бъбречно увреждане.
- Клацид не трябва да се прилага едновременно с HMG-CoA редуктазни инхибитори (статини), които се метаболизират основно от CYP3A4 (ловастатин или симвастатин), поради повишен риск от миопатия, включително рабдомиолиза (вж. точка 4.4).
- Както и при други мощни CYP3A4 инхибитори Клацид не трябва да се употребяват едновременно с колхицин (вж. точки 4.4 и 4.5).
- Едновременно приложение на Клацид с тикагрелор или ранолазин.
-

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Лекарят не трябва да предписва Клацид на бременни жени без да е направена внимателна оценка на ползите спрямо риска, особено през първите три месеца на бременността.

Дълготрайната употреба, както и при други антибиотици, може да доведе до колонизация с повишен брой не чувствителни бактерии и гъби. Ако се появят суперинфекции, трябва да се започне подходяща терапия.

Клацид се отделя главно през черния дроб. Следователно се изисква повищено внимание при назначаване на антибиотика на пациенти с увредена чернодробна функция.

Повищено внимание е необходимо и при приложението на Клацид при пациенти с умерено до тежко бъбречно увреждане.

При приложение на Клацид са били докладвани чернодробна дисфункция, включително повищени чернодробни ензими, и хепатоцелуларен и/или холестатичен хепатит, с или без жълтеница. Тази чернодробна дисфункция може да бъде тежка и обикновено е обратима. В ~~най-честите случаи~~ е докладвана чернодробна недостатъчност с фатален изход и обикновено е свързана с хепатит. Причините за хепатит са сървиозни придръжаващи заболявания и/или съпътстващи лекарствени средства. Пациентите трябва да прекъснат незабавно приема на Клацид ако се развият признаки и симптоми на хепатит, като анерексия, жълтеница, тъмна урина, сърбеж, или напрегнат корем.

Псевдомемброзен колит е съобщаван при почти всички антибактериални лекарствени продукти.



включително макролиди и може да варира от леко до живото-застрашаващо състояние. *Clostridioides difficile*-свързана диария (CDAD) е съобщаван при приложението на почти всички антибактериални лекарствени продукти, включително Клацид и може да варира от лека диария до фатален колит. Лечението с антибактериални лекарствени продукти нарушава нормалната флора на дебелото черво, което може да доведе до свръхрастеж на *C. difficile*. CDAD трябва да се има предвид при всички пациенти с диария след приложението на антибиотици. Необходимо е внимателното снемане на медицинска анамнеза, тъй като случаи на CDAD са съобщавани около два месеца след приложението на антибактериалните лекарствени продукти.

Колхицин

По време на пост-маркетинговия период са съобщавани случаи на колхицинова токсичност при едновременното приложение на Клацид и колхицин, особено при пациенти в старческа възраст, като някои от пациентите са били с бъбречна недостатъчност. Докладвани са смъртни случаи при някои от тези пациенти (вж. точка 4.5). Едновременното приложение на Клацид и колхицин е противопоказано (вж. точка 4.3).

Повишено внимание се препоръчва при едновременното прилагане на Клацид и триазолобензодиазепини, като триазолам и интравенозен или оромукозен мидазолам (вж. точка 4.5).

Сърдечносъдови събития

Удължена сърдечна реполяризация и удължаване на QT-интервала, свързани с риск за развитие на сърдечна аритмия и *torsades de pointes*, са наблюдавани при пациенти лекувани с макролиди, включително кларитромицин (вж. точка 4.8). Следователно, тъй като следните ситуации могат да доведат до повишен риск от камерни аритмии (включително *torsades de pointes*), Клацид трябва да се използва с повищено внимание при следните пациенти:

- Пациенти с исхемична болест на сърцето, тежка сърдечна недостатъчност, проводни нарушения или клинично значима брадикардия.
- Клацид не трябва да се дава на пациенти с електролитни нарушения, като хипокалиемия или хипомагнезиемия (вж. точка 4.3).
- Пациенти, приемащи едновременно други лекарствени продукти, които се свързват с удължаване на QT-интервала (вж. точка 4.5).
- Съпътстващото приложение на Клацид и астемизол, цизаприд, домперидон, пимозид и терфенадин е противопоказано (вж. точка 4.3).
- Клацид не трябва да се използва при пациенти с вродено или документирано удължаване на QT-интервала или анамнеза за камерна аритмия (вж. точка 4.3).

Епидемиологични проучвания, изследващи риска от нежелани сърдечносъдови последствия при прилагане на макролиди, са показвали различни резултати. Някои неинтervенционални проучвания са идентифицирали рядък краткосрочен риск от аритмия, инфаркт на миокарда и сърдечно-съдова смъртност, свързана с макролиди, включително кларитромицин. Вземането предвид на тези данни трябва да се балансира с ползите от лечението при предписване на Клацид.

Пневмония

Поради засилващата се резистентност на *Streptococcus pneumoniae* към макролиди е необходимо предварително тестване за резистентност при изписване на Клацид за пневмонии придобити в обществото. При вътреболнични пневмонии Клацид трябва да се използва в комбинация с допълнителни подходящи антибиотици.

Кожни и меко-тъканни инфекции с лека до умерена тежест

Тези инфекции най-често се причиняват от *Staphylococcus aureus* и *Streptococcus pyogenes*, като двата причинителя могат да бъдат резистентни на макролиди. Затова е необходимо да се проведат тестове за чувствителност. В случаи, когато бета-лактамни антибиотици не могат да бъдат използвани (напр. алергия), други антибиотици като клиндамицин може да бъдат използвани на пръв избор. В момента само за макролидите се счита, че имат роля при някои кожни и меко-тъканни инфекции причинени от *Corynebacterium minutissimum*, акне вулгарис и *Corynebacterium* в



случаи, където не може да се използва пеницилиново лечение.

Терапията с Клацид трябва да се преустанови незабавно и подходящо лечение трябва да се започне спешно при сериозни ости реакции на свръхчувствителност, като анафилаксия, тежки кожни нежелани реакции (SCAR) (напр. остра генерализирана екзантематозна пустулоза (AGEP)), синдром на *Stevens-Johnson*, токсична епидермална некролиза и кожен обрив с еозинофилия и системни симптоми (DRESS)).

Клацид трябва да се използва с повищено внимание при приложение с лекарства, които индуцират цитохром CYP3A4 ензима (вж. точка 4.5).

Необходимо е също повищено внимание поради възможността за кръстосана резистентност между Клацид и други макролиди, както и с линкомицин и клиндамицин.

HMG-CoA редуктазни инхибитори (статини):

Едновременно приемане на Клацид с ловастатин и симвастатин е противопоказано (вж. точка 4.3). Необходимо е повищено внимание, когато се изписва Клацид с други статини. Докладвани са случаи на рабдомиолиза при пациенти, приемали кларитромицин и статини. Пациентите трябва да се наблюдават за признания и симптоми на миопатия. В случаи когато едновременната употреба на Клацид със статини не може да се избегне, препоръчва се да се изпише най-ниската регистрирана доза на статин. Може да се обмисли използването на статин, който не зависи от метаболизма на CYP3A (напр. флувастатин) (вж. точка 4.5).

Перорални хипогликемични лекарства/Инсулин

Едновременното приемане на перорални хипогликемични лекарства (като сулфанилурея) и/или инсулин с Клацид може да доведе до значима хипогликемия. Препоръчва се внимателно проследяване на нивата на глюкозата.

Перорални антикоагуланти

Съществува риск от сериозна хеморагия и значителни повишавания на INR и протромбиновото време, когато варфарин и кларитромицин се прилагат едновременно. INR и протромбиновото време трябва да се проследяват често в периода на едновременен прием на перорални антикоагуланти и Клацид.

Трябва да се обръща особено внимание, когато кларитромицин се прилага едновременно с директно действащи перорални антикоагуланти, като дабигатран, ривароксабан и апиксабан, особено при пациенти с висок риск от кървене (вж. точка 4.5).

Помощни вещества

Клацид гранули за перорална суспензия съдържат захароза. Пациенти с редки наследствени проблеми като непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или захароза-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат това лекарство.


Когато се предписва на пациенти с диабет, съдържанието на захароза трябва да се взима под внимание.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Приложението на посочените по-долу лекарствени продукти е строго противопоказано поради възможността от появата на тежки ефекти на лекарствени взаимодействия.

Астемизол, цизаприл, домперидон, пимозид и терфенадин

Докладвани са повищени нива на цизаприл при пациенти, лекувани едновременно с цизаприл и Клацид. Това може да доведе до удължаване на QT-интервала и сърдечни аритмии, вкл. камерна тахикардия, камерна фибрилация и *torsades de pointes*. Подобни ефекти са наблюдавани при пациенти, приемащи едновременно Клацид и пимозид (вижте точка 4.3).



Докладвано е, че макролидите повлияват метаболизма на терфенадин, което води до повишаване на плазмените му нива и се свързва със сърдечни аритмии като удължаване на QT-интервала, камерна тахикардия, камерна фибрилация и камерно мъждане и *torsades de pointes* (вж. точка 4.3). В едно проучване при 14 здрави доброволци, едновременното приложение на Клацид и терфенадин е довело от двукратно до трикратно повишаване на серумните нива на киселия метаболит на терфенадин и до удължаване на QT-интервала, който не е довел до каквито и да е клинично проявени ефекти. Подобни ефекти са наблюдавани и при едновременно лечение с астемизол и други макролиди.

Еrgo алкалоиди

Пост-маркетинговите съобщения показват, че едновременното приложение на Клацид и ерготамин или дихидроерготамин е свързано с остра ерготаминова токсичност, характеризираща се с вазоспазъм и исхемия на крайниците и други тъкани, включително централната нервна система. Едновременното приложение на Клацид и ерго алкалоиди е противопоказано (вж. точка 4.3).

Перорален мидазолам

Когато мидазолам е бил приеман едновременно с таблетки Клацид (500 mg два пъти дневно), частта под кривата (AUC) на мидазолам е била увеличена 7 пъти след перорално приложение на мидазолам. Едновременното приложение на перорален мидазолам и Клацид е противопоказано (вж. точка 4.3).

HMG-CoA редуктазни инхибитори (статини)

Едновременно приемане на Клацид с ловастатин и симвастатин е противопоказано (вж. точка 4.3), тъй като тези статини се метаболизират основно от CYP3A4 и едновременното лечение с Клацид повишава техните плазмени концентрации, което повишава риска от миопатия, включително рабдомиолиза. Докладвани са случаи на рабдомиолиза при пациенти, приемали едновременно Клацид и тези статини. Ако лечението с Клацид не може да се избегне, терапията с ловастатин или симвастатин трябва да бъде прекъсната.

Необходимо е повишено внимание при предписването на Клацид със статини. В случаи когато едновременната употреба на Клацид със статини не може да се избегне, препоръчва се да се изпише най-ниската регистрирана доза на статин. Може да се обмисли използването на статин, който не зависи от метаболизма на CYP3A (напр. флувастиatin). Пациентите трябва да се наблюдават за признания и симптоми на миопатия.


Ефект на други лекарствени продукти върху Клацид

Лекарства, които са индуктори на CYP3A4 (напр. рифампицин, фенитоин, карbamазепин, фенобарбитал, жълт кантарион) може да индуцират метаболизма на Клацид. Това може да доведе до субтерапевтични нива на Клацид, водещо до намалена ефикасност. Освен това може да е необходимо да се мониторират плазмените нива на CYP3A4 индуктора, които може да се увеличат поради инхибицията на CYP3A4 от Клацид (вижте също продуктовата информация за приеманите CYP3A4 инхибитори). Едновременното приложение на рифабутин и Клацид може да доведе до повишаване серумните нива на рифабутин и понижаване на серумните нива на Клацид, едновременно с повишен риск от увеит.

За посочените по-долу лекарства е известно или се предполага, че повлияват циркулиращите концентрации на Клацид; може да е необходима промяна в дозата на Клацид или обмислянето на алтернативно лечение.

Ефавирениц, невипарин, рифампицин, рифабутин и рифапентин

Мощни индуктори на цитохром P450 метаболитната система като ефавирениц, невипарин, рифампицин, рифабутин и рифапентин могат да засилят метаболизма на Клацид и да понижат плазмените му нива, като повишават тези на 14(R)-хидрокси-кларитромицин (14-OH-кларитромицин), който е също микробиологично активен метаболит. Тъй като микробиологичната



активност на Клацид и 14-OH-кларитромицин е различна за различните бактерии, желаният терапевтичен ефект може да бъде нарушен при едновременно прилагане на Клацид и ензимни индуктори.

Етравирин

Експозицията на Клацид е била понижена от етравирин; но концентрациите на активния метаболит 14-OH-кларитромицин са били повишени. Поради това, че 14-OH-кларитромицин има намалена активност към *Mycobacterium avium complex* (MAC), общата активност към този патоген може да бъде нарушена; затова трябва да се имат предвид алтернативи на Клацид за лечение на MAC.

Флуконазол

Едновременното приложение на флуконазол 200 mg дневно и Клацид 500 mg два пъти дневно при 21 здрави доброволци е довело до повишаване на средните минимални равновесни концентрации (C_{min}) на Клацид и площта под кривата (AUC), съответно с 33% и 18%. Равновесните концентрации на активния метаболит 14-OH-кларитромицин не са променени значително при едновременното приложение с флуконазол. Не се налага адаптиране на дозата на Клацид.

Ритонавир

Фармакокинетично проучване е демонстрирало, че едновременно приемане на ритонавир 200 mg на всеки 8 часа и Клацид 500 mg на всеки 12 часа е довело до значително потискане на метаболизма на Клацид. Максималната концентрация (C_{max}) на Клацид се повишава с 31%, C_{min} се повишава с 182% и AUC – със 77% при едновременно приемане на ритонавир. Наблюдавано е пълно потискане на образуването на 14-OH-кларитромицин. Поради широкия терапевтичен прозорец на Клацид, при пациенти с нормална бъбречна функция не се налага намаляване на дозата. Въпреки това, при пациенти с бъбречно увреждане, трябва да се обмисли следното: при пациенти с креатининов клирънс от 30 до 60 ml/min дозата на Клацид трябва да се намали с 50%. При пациенти с креатининов клирънс < 30 ml/min дозата на Клацид трябва да се намали със 75%. Дози на Клацид по-високи от 1 g дневно не трябва да се прилагат заедно с ритонавир.

Подобно адаптиране на дозата трябва да се има предвид при пациенти с намалена бъбречна функция, когато ритонавир се използва като фармакокинетичен подобрител с други HIV протеазни инхибитори, включително атазанавир и саквинавир (вижте „Двупосочни фармакокинетични взаимодействия“).

Ефекти на Клацид върху други лекарства

Антиаритмици

Съществуват постмаркетингови съобщения за *torsades de pointes*, настъпващи при едновременно приложение на Клацид и хинидин или дизопирамид. При едновременно прилагане на Клацид с тези лекарства, електрокардиограмите трябва да се наблюдават за удължаване на QT-интервала. По време на лечението трябва да се мониторират серумните нива на тези лекарства.

Докладвани са постмаркетингови съобщения за хипогликемия при едновременно приложение на Клацид и дизопирамид. Следователно трябва да бъдат мониторирани нивата на кръвната захар при едновременното приложение на Клацид и дизопирамид.

Перорални хипогликемични лекарства/Инсулин

При някои хипогликемични лекарства като натеглинид и репаглинид може да се включи инхибиция на CYP3A ензими от Клацид и това може да причини хипогликемия при едновременно приемане. Препоръчва се внимателно проследяване на нивата на глюкозата.

Взаимодействия, базирани на CYP3A

Едновременното приложение на Клацид, за който е известно, че инхибира CYP3A за други лекарства, метаболизирани основно от CYP3A може да доведе до повишаване концентрациите на тези лекарства, което да повиши или удължи, както терапевтичния, така и нежеланият ефекти на



едновременно прилаганото лекарство. Необходимо е внимание, когато Клацид се прилага едновременно с други лекарства, за които се знае, че са субстрати на ензим CYP3A, особено ако субстрата на CYP3A има тесни терапевтични граници (напр. карбамазепин) и/или субстрата се метаболизира екстензивно от този ензим. Може да се обмисли корекция на дозата, и когато е възможно, да се проследяват внимателно серумните концентрации на лекарствата, които се метаболизират от CYP3A, при пациенти, които получават едновременно кларитромицин.

Съпътстващото приложение на кларитромицин и ломитапид е противопоказано поради възможността за значително повишаване на трансаминазите (вж. точка 4.3).

За следните лекарства или лекарствени класове се знае или се предполага, че се метаболизират от същия CYP3A изoenзим: алпразолам, астемизол, карбамазепин, цилостазол, цизаприд, циклоспорин, дизопирамид, домперидон, ерго алкалоиди, ибрутиниб, ломитапид, ловастатин, метилпреднизолон, мидазолам, омепразол, перорални антикоагуланти (напр. варфарин, ривароксабан, апиксабан), атипични антипсихотици (напр. кветиапин), пимозид, хинидин, рифабутин, силденафил, симвастатин, такролимус, терфенадин, тиазолам и винбластин, като този списък не е пълен.

Лекарства, които взаимодействват чрез подобни механизми с други изoenзими от цитохром P450 системата, са фенитоин, теофилин и валпроат.

Директно действащи перорални антикоагуланти (DOAC)

Директно действащият перорален антикоагулант дабигатран е субстрат за ефлуксния транспортер P-gr. Ривароксабан и апиксабан се метаболизират чрез CYP3A4 и също са субстрати за P-gr. Трябва да се обръща особено внимание, когато кларитромицин се прилага едновременно с тези средства, особено при пациенти с висок риск от кървене (вж. точка 4.4).

Омепразол

Клацид (500 mg на всеки 8 часа) е прилаган в комбинация с омепразол (40 mg дневно) на здрави възрастни лица. Равновесните плазмени концентрации на омепразол се увеличават (C_{max} , AUC_{0-24} и $t_{1/2}$ се увеличават с 30%, 89% и 34%, съответно) при едновременно прилагане на Клацид. Средната 24-часова стойност на pH на stomаха е била 5,2, когато омепразол е бил прилаган самостоятелно и 5,7, когато омепразол е бил прилаган с Клацид.

Силденафил, тадалафил и варденафил

Всеки един от тези фосфодиестеразни инхибитори се метаболизира поне отчасти от CYP3A, като CYP3A може да бъде инхибиран при едновременното приложение на Клацид. Едновременното приложение на Клацид със силденафил, тадалафил и варденафил, обикновено води до повишаване експозицията на фосфодиестеразния инхибитор. При едновременното приложение на силденафил, тадалафил и варденафил с Клацид трябва да се обмисли възможността за понижаване на тяхната доза.

Теофилин, карбамазепин

Резултати от клинични проучвания показват, че съществува умерено, но статистическо значимо ($p \leq 0.05$) повишаване на нивата на циркулиращия теофилин или карбамазепин, когато едно от тези лекарства се прилага едновременно с Клацид.

Толтеродин

Метаболизът на толтеродин се осъществява основно чрез 2D6 изоформата на цитохром P450 (CYP2D6). Въпреки това, при част от популацията с липса на CYP2D6, е установено че метаболизът се извършва с помощта на CYP3A. При тази част от популацията, инхибирането на CYP3A води до значително по-високи серумни концентрации на толтеродин. Може да е необходимо намаляване дозата на толтеродин в присъствието на CYP3A инхибитор, като Клацид, при популацията на слабо метаболизиращи чрез CYP2D6.

Триазолベンзодиазепини (напр. алпразолам, мидазолам, триазолам)



Когато мидазолам се прилага заедно с Клацид таблетки (500 mg два пъти дневно), AUC на мидазолам е повищено 2,7-пъти след интравенозно приложение на мидазолам. При интравенозно приложение на мидазолам с Клацид, пациентите трябва да бъдат редовно наблюдавани с оглед евентуална промяна на дозата. Приложението на мидазолам по оромукозен път, което може да заобиколи пресистемното елиминиране на лекарството, е по-вероятно да доведе до взаимодействие, подобно на наблюдаваното след интравенозно приложение на мидазолам, отколкото до взаимодействие, подобно на това след перорално приложение.

Същите предпазни мерки трябва да се приложат и по отношение на другитеベンзодиазепини, метаболизирани от CYP3A, включително триазолам и алпразолам. Приベンзодиазепините, чието елиминиране не е зависимо от CYP3A (темазепам, нитразепам, лоразепам) не се очаква клинично значимо взаимодействие с Клацид.

Има постмаркетингови съобщения за лекарствени взаимодействия и ефекти върху централната нервна система (ЦНС) (напр. сомнолентност и обръканост) при едновременното приложение на Клацид и триазолам. Препоръчва се проследяване на пациентите по отношение на повишаване на фармакологичните ефекти върху ЦНС.

Други лекарствени взаимодействия

Колхицин

Колхицин е субстрат както на CYP3A, така и на ефлуксния транспортер P-гликопротеин (Pgp). Известно е, че Клацид и други макролиди са инхибитори на CYP3A и Pgp. При едновременното приложение на Клацид и колхицин, инхибирането на Pgp и/или CYP3A от Клацид може да доведе до повишаване експозицията на колхицин. Едновременното прилагане на колхицин и Клацид е противопоказано (вж. точки 4.3 и 4.4).

Дигоксин

Счита се, че дигоксин е субстрат на ефлуксния транспортер P-гликопротеин (Pgp). Известно е, че Клацид инхибира Pgp. При едновременното приложение на Клацид и дигоксин, инхибирането на Pgp от Клацид може да доведе до повишаване експозицията на дигоксин. В постмаркетинговия период също са съобщавани случаи на повишаване на серумни концентрации на дигоксин при пациентите, приемащи Клацид и дигоксин. Някои от пациентите са показвали клинични признания на дигоксинова интоксикация, включително потенциално фатални аритмии. Серумните концентрации на дигоксин трябва да бъдат внимателно проследявани при пациентите, приемащи едновременно дигоксин и Клацид.

Зидовудин

Едновременното перорално приложение на Клацид таблетки и зидовудин при HIV-инфекцирани възрастни пациенти може да доведе до понижено равновесно състояние на концентрациите на зидовудин. Тъй като най-вероятно Клацид повлиява резорбцията на едновременно приложения перорален зидовудин, това взаимодействие може да се избегне в голяма степен чрез разделяне на дозите на Клацид и зидовудин за постигане на 4-часови интервали между приема на лекарствата. Това взаимодействие не се появява при педиатрични HIV-инфекцирани пациенти, приемащи Клацид суспензия със зидовудин или дидеоксиинозин. Това взаимодействие е малко вероятно, когато Клацид се прилага чрез интравенозна инфузия.

Фенитоин и валпроат

Има спонтанни или публикувани съобщения за взаимодействия на CYP3A4 инхибитори, включително Клацид с лекарства, за които се счита, че не се метаболизират от CYP3A4 (напр. фенитоин и валпроат). Препоръчва се измерване на серумните нива на тези лекарства, когато се прилагат едновременно с Клацид. Съобщавани са повишени серумни нива.

Двупосочни фармакокинетични взаимодействия

Атазанавир



Клацид и атазанавир са субстрати и инхибитори на CYP3A и съществуват данни за двупосочно лекарствено взаимодействие. Едновременното приложение на Клацид (500 mg два пъти дневно) с атазанавир (400 mg веднъж дневно) води до двукратно повишение експозицията на Клацид и 70% понижение на експозицията 14-OH-кларитромицин, при 28% повишение AUC на атазанавир. Поради широкия терапевтичен прозорец на Клацид, не се налага понижаване на дозата при пациенти с нормална бъбречна функция. При пациентите с умерена увредена бъбречна функция (креатининов клирънс 30 до 60 ml/min), дозата на Клацид трябва да бъде намалена с 50%. При пациентите с креатининов клирънс <30 ml/min, дозата на Клацид трябва да бъде намалена със 75% при използването на подходяща лекарствена форма на Клацид. Дози на Клацид, по-високи от 1 000 mg дневно не трябва да се прилагат заедно с протеазни инхибитори.

Блокери на калциевите канали

Препоръчва се повищено внимание при едновременното приложение на Клацид и блокери на калциевите канали, които се метаболизират от CYP3A4 (напр. верапамил, амлодипин, дилтиазем) поради рисък от хипотония. Плазмените концентрации на Клацид, както и на блокерите на калциевите канали може да се увеличат, което се дължи на взаимодействието им. Хипотония, брадикардия и лактатна ацидоза са били наблюдавани при пациенти, приемащи едновременно Клацид и верапамил.

Итраконазол

Клацид и итраконазол са субстрати и инхибитори на CYP3A, което води до двупосочко лекарствено взаимодействие. Клацид може да повиши плазмените нива на итраконазол, а итраконазол може да повиши плазмените нива на Клацид. Пациентите, приемащи едновременно итраконазол и Клацид трябва да бъдат редовно проследявани за признаки или симптоми на повишен или удължен фармакологичен ефект.

Саквинавир

Клацид и саквинавир са субстрати и инхибитори на CYP3A и двупосочни лекарствени взаимодействия. Едновременното приложение на Клацид (500 mg два пъти дневно) и саквинавир (мяки желатинови капсули, 1 200 mg три пъти дневно) при 12 здрави доброволци е довело до стойности в равновесно състояние на AUC и C_{max} на саквинавир, съответно 177% и 187% по-високи от тези при самостоятелното приложение на саквинавир. Стойностите на AUC и C_{max} на Клацид са били с около 40% по-високи в сравнение с тези при самостоятелното приложение на Клацид. Не се налага промяна на дозата при едновременното приложение на двете лекарства за ограничен период от време в проучваните дози/лекарствени форми. Данните от проучванията върху лекарствените взаимодействия при приложението на мяките желатинови капсули може да не са показателни по отношение на ефектите при приложението на саквинавир под формата на твърди желатинови капсули. Данните от проучванията върху лекарствените взаимодействия при самостоятелно приложението на саквинавир може да не са показателни по отношение на наблюдаваните ефекти при лечението със саквинавир/ритонавир. При едновременното приложение на саквинавир с ритонавир, трябва да се имат предвид потенциалните ефекти на ритонавир върху Клацид (вж. точка 4.5).

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Безопасността на Клацид по време на бременност не е установена. Въз основа на променливи резултати, получени от проучвания при животни и опита при хора, не може да се изключи вероятността от нежелани реакции върху ембриофеталното развитие. В някои обсервационни проучвания, оценявачи експозицията на кларитромицин през първия и втория триместър, се съобщава за повишен рисък от спонтанен аборт в сравнение с неизползвания антибиотик или използването на друг антибиотик през същия период. Наличните епидемиологични проучвания относно риска от сериозни вродени малформации при употребата на Клацид, включително кларитромицин, по време на бременност предоставят противоречиви резултати. Поради това не се препоръчва приемът на Клацид по време на бременност без да е направена оценка на ползите спрямо рисковете.



Кърмене

Безопасността на Клацид по време на кърмене не е установена. Клацид се отделя в кърмата в малки количества. Изчислено е, че кърмачето, ще получи около 1,7% от дозата кларитромицин, коригираната според теглото на майката.

Фертилитет

Проучванията при плъхове не показват данни за вредни ефекти върху фертилитета (вж. точка 5.3).

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма данни за влиянието на Клацид върху способността за шофиране или работа с машини. Преди шофиране или работа с машини трябва да се има предвид възможността за появя на замаяност, вертиго, обърканост и дезориентация, които могат да се появят при приема на това лекарство.

4.8 Нежелани лекарствени реакции


Най-често срещаните нежелани лекарствени реакции, свързани с терапията с Клацид при възрастни и педиатрична популация са коремна болка, диария, гадене, повръщане и променен вкус. Тези нежелани реакции обикновено са леки по интензивност и са в съответствие с познатия профил на безопасност на макролидните антибиотици.

Няма значима разлика в честотата на тези стомашно-чревни нежелани реакции по време на клинични изпитвания между популациите пациенти с или без предшестващи микобактериални инфекции.

Следващата таблица показва докладваните нежелани реакции от клинични изпитвания и от постмаркетинговия опит с Клацид гранули за перорална суспензия, таблетки с изменено освобождаване, филмирани таблетки и прах за инфузионен рътвър.

Реакциите, считани като поне възможно свързани с Клацид са показани по системно-органна класификация и определени по честота като: много чести ($\geq 1/10$), чести ($\geq 1/100$ до $< 1/10$), нечести ($\geq 1/1\,000$ до $< 1/100$) и с неизвестна честота (нежелани реакции от постмаркетинговия опит; от наличните данни не може да бъде направена оценка). Във всяка група по честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред на тяхната сериозност, там където сериозността може да бъде оценена.

MedDRA-база данни на Системо- органни класове	Много чести ($\geq 1/10$)	Чести ($\geq 1/100$ до $< 1/10$)	Нечести ($\geq 1/1\,000$ до $< 1/100$)	С неизвестна честота* (от наличните данни не може да бъде направена оценка)
Инфекции и инфекци			Целулит ¹ , кандидаза, гастроентерит ² , инфекция ³ , вагинални инфекции	Псевдомемброзен колит, еритипел,
Нарушения на кръвта и лимфната система			Левкопения, неутропения ⁴ , тромбоцитемия ³ , еозинофилия ⁴	Агранулоцитоза, тромбоцитопения
Нарушения на имунната система			Анафилактоидна реакция ¹ , свръхчувствителност	Анафилактична реакция, антибодем
Нарушения на метаболизма и храненето			Анорексия, понижен апетит	
Психични нарушения		Безсъние	Тревожност, нервност ³ ,	Психични нарушения, состояние



				на обърканост, деперсонализация, депресия, дезориентация, халюцинация, необичайни сънища, мания
Нарушения на нервната система	Дисгеузия главоболие	Загуба на съзнание ¹ , дискинезия ¹ , замаяност, съниливост, трепор	Конвулсии, агеузия, паросмия, аносмия, парестезия	
Нарушения на ухото и лабиринта		Вертиго, нарушения на слуха, тинитус	Глухота	
Сърдечни нарушения		Сърдечен арест ¹ , предсърдно мъждене ¹ , удължен QT в ЕКГ, екстрасистоли ¹ , палпитации	<i>Torsade de pointes</i> , камерна тахикардия, камерно мъждене	
Съдови нарушения	Вазодилатация ¹			Хеморагия
Респираторни, гръден и медиастинални нарушения		Астма ¹ , епистаксис ² , белодробен емболизъм ¹		
Стомашно-чревни нарушения	Диария, повръщане, диспепсия, гадене, коремна болка	Езофагит ¹ , гастроезофагеална рефлуксна болест ² , гастрит, прокталгия ² , стоматит, глосит, , подуване на корема ⁴ , констипация, сухота в устата, оригване, флатуленция	Остър панкреатит, промени в цвета на езика, промени в цвета на зъбите	
Хепатобилиарни нарушения	Абнормен чернодробен функционален тест	Холестаза ⁴ , хепатит ⁴ , повищена аланин аминотрансфераза, повищена аспартат аминотрансфераза, повищена гама-глутамилтрансфераза ⁴	Чернодробна недостатъчност, хепатоцелуларна жълтеница	
Нарушения на кожата и подкожната тъкан	Обрив, хиперхидроза	Булозен дерматит ¹ , сърбеж, уртикария, макуло-папулозен обрив ³	Тежки кожни нежелани реакции (SCAR) (напр. остра генерализирана екзантематозна пустулоза (AGEP), синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза, лекарствен обрив с еозинофилия и системни симптоми (DRESS), акне	
Нарушения на мускуло-скелетната система и съединителната тъкан		Мускулни спазми ³ , мускуло-скелетна скованост ¹ , миалгия ²	Радомиолиза ^{**} , миопатия	
Нарушения на бъбреците и пикочните пътища		Увеличение на креатинина в кръвта ¹ , увеличение на уреята в кръвта ¹	Бъбречна недостатъчност, интерстициален нефрите	



Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение	Флебит на мястото на инжект иране ¹	Болка на мястото на инжеектиране ¹ , възпаление на мястото на инжеектиране ¹	Неразположение ⁴ , повишенена температура ³ , астения, гръден болка ⁴ , втрисане ⁴ , умора ⁴	
Изследвания			Абнормно отношение албумин глобулин ¹ , повишение на алкалната фосфатаза в кръвта ⁴ , повишение на лактат дехидрогеназата в кръвта ⁴	Повишен INR, удължено протромбиново време, абнормен цвят на урина

*Поради това, че тези реакции да докладвани доброволно от популация с неопределен размер, не винаги е възможно да се предположи надежно тяхната честота или да се установи причинно-следствена връзка с експозицията към лекарството. Експозицията на пациентите се предполага да е по-голяма от 1 милиард дни пациенто-лечenie за Клацид.

**В някои от докладите за рабдомиолиза, Клацид е прилаган едновременно с други лекарства, за които е известно, че са свързани с появата на рабдомиолиза (като статини, фиброли, колхицин или алопуринол).

¹ НЛР докладвани само за прах за инфузионен разтвор

² НЛР докладвани само за таблетки с удължено освобождаване

³ НЛР докладвани само за гранули за перорална супензия

⁴ НЛР докладвани само за таблетки с незабавно освобождаване

Честотата, вида и тежестта на нежеланите лекарства при деца се очаква да бъдат същите както при възрастни.

Имунокомпрометирани пациенти

При пациенти със СПИН и други имунокомпрометирани пациенти, лекувани за микобактериални инфекции с по-високи перорални дози Клацид за продължителен период, често е било трудно да се отличат нежеланите събития, свързани с Клацид от симптомите на СПИН или съпътстващото заболяване.

При възрастни пациенти, лекувани с Клацид 1 000 mg обща дневна доза, най-често докладваните нежелани реакции са гадене, повръщане, промяна на вкуса, коремна болка, диария, обриви, флатуленция, главоболие, запек, нарушения на слуха, повишени серумна глутамат оксалоацетат трансаминаза (SGOT) и серумна глутамат пируват трансаминаза (SGPT). Допълнителни събития с по-ниска честота са задух, безсъние и сухота в устата.

При тези имунокомпрометирани пациенти лабораторните показатели са оценени при анализиране на тези стойности без включване на големите отклонения (т.е. екстремно високи и екстремно ниски) за конкретното изследване. На базата на тези критерии, около 2% до 3% от тези пациенти, които получават 1 000 mg Клацид дневно са имали сериозно повишени нива на SGOT и SGPT и абнормно нисък брой бели кръвни клетки и тромбоцити. Нисък процент пациенти са имали повишени нива на урея.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/рисков за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изиска да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303, гр. София

Тел.: +35 928903417

Уебсайт: www.bda.bg



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

4.9 Предозиране

Симптоми

Получените съобщения показват, че приема на големи количества Клацид може да доведе до появата на стомашно-чревни симптоми. При един пациент с анамнеза за биполярно разстройство, приел осем грама Клацид е наблюдавано нарушение на менталните функции, параноидно поведение, хипокалиемия и хипоксемия.

Лечение

Нежеланите реакции, придружаващи предозирането, трябва да се лекуват със своевременно елиминиране на неабсорбираното лекарство и поддържащи мерки. Както при останалите макролиди, не се очаква серумните нива на кларитромицин да се повлият значително при хемодиализа или перitoneална диализа.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: анти-бактериални лекарствени продукти за системно приложение, макролиди, ATC код: J01FA09

Кларитромицин е полусинтетичен макролиден антибиотик получен чрез замяна на CH_3O група с хидроксилна (OH) група на позиция 6 от еритромицин лактонен пръстен. По-конкретно кларитромицин е 6-O-метил еритромицин А. Белият до почти бял антибиотичен прах е горчив, практически без миризма, по същество нерастворим във вода и слабо разтворим в етанол, метанол и ацетонитрил. Неговото молекулно тегло е 747.96.

Микробиология

Кларитромицин упражнява антибактериалното си действие чрез свързване с 50S рибозомната субединица на чувствителните бактерии и потиска протеиновата синтеза.

Кларитромицин демонстрира отлична *in vitro* активност срещу стандартни щамове бактерии и клинични изолати. Той притежава много мощно антибактериално действие срещу широк спектър от аеробни и анаеробни Грам-положителни и Грам-отрицателни организми. Минималните инхибиторни концентрации (МИК) на кларитромицин като цяло са с едно \log_2 разреждане по-силни от МИК на еритромицин.

In vitro данните също показват, че кларитромицин има отлична активност срещу *Legionella pneumophila* и *Mycoplasma pneumoniae*. Той е бактерициден за *Helicobacter pylori*; тази активност на кларитромицин е по-висока при неутрално pH, отколкото при кисело pH. *In vitro* и *in vivo* данните показват, че този антибиотик има активност срещу клинично значими микобактериални видове. *In vitro* данните показват, че *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas* видовете и други не ферментативни лактозо-отрицателни Грам-отрицателни бактерии не са чувствителни към кларитромицин.

Кларитромицин е показал активност срещу повечето щамове на следните микроорганизми *in vitro*, така и при клинични инфекции, както е описано в точка 4.1:

Аеробни Грам-положителни микроорганизми
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae



Streptococcus pyogenes
Listeria monocytogenes

Аеробни Грам-отрицателни микроорганизми

Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Moraxella catarrhalis
Neisseria gonorrhoeae
Legionella pneumophila

Други микроорганизми

Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae (TWAR)

Микобактерии

Mycobacterium leprae
Mycobacterium kansasii
Mycobacterium cheloneae
Mycobacterium fortuitum
Mycobacterium avium complex (MAC), състоящи се от: Mycobacterium avium
Mycobacterium Intracellulare

Бета-лактамазната продукция не трябва да има ефект върху активността на кларитромицин.

ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето щамове метицилин-резистентни и оксацилин-резистентни стафилококки са резистентни към кларитромицин.

Helicobacter

Helicobacter pylori

H. pylori е изолиран в култури, получени преди терапията, като кларитромицин МИК са определени преди лечението при 104 пациента. От тях четирима пациенти имат резистентни щамове, двама пациенти имат щамове с международна чувствителност и 98 пациента имат чувствителни щамове.

Следните *in vitro* данни са налични, но тяхната клинична значимост не е известна. Кларитромицин показва *in vitro* активност срещу повечето щамове на следните микроорганизми; все пак безопасността и ефективността на кларитромицин при лечение на клинични инфекции, дължащи се на тези микроорганизми, не са установени при подходящи и добре контролирани клинични изпитвания.

Аеробни Грам-положителни микроорганизми

Streptococcus agalactiae
Streptococci (Група C,F,G)
Viridans група streptococci

Аеробни Грам-отрицателни микроорганизми

Bordetella pertussis
Pasteurella multocida

Анаеробни Грам-положителни микроорганизми

Clostridium perfringens
Peptococcus niger
Propionibacterium acnes

Анаеробни Грам-отрицателни микроорганизми

Bacteroides melaninogenicus



Спирохети

Borrelia burgdorferi

Treponema pallidum

Кампилобактер

Campylobacter jejuni

Основният метаболит на кларитромицин при човека и други примати е микробиологично активният метаболит 14-ОН-кларитромицин. Този метаболит е също толкова активен или 1 до 2 пъти по-малко активен от изходното съединение за повечето организми, с изключение на *H. influenzae*, срещу който е два пъти по-активен. Изходното вещество и 14-ОН метаболитът упражняват адитивен или синергичен ефект върху *H. influenzae* *in vitro* и *in vivo*, в зависимост от бактериалните щамове.

За кларитромицин е установено, че е два до десет пъти по-активен от еритромицин в няколко експериментални животински инфекциозни модели. Показано е например, че е по-ефективен от еритромицин при миши системни инфекции, миши подкожни абсцеси и миши инфекции на дихателните пътища, причинени от *S. pneumoniae*, *S. aureus*, *S. pyogenes* и *H. influenzae*. При морски свинчета с легионелна инфекция този ефект е по-силно изразен; интраперитонеална доза от 1,6 mg/kg/ден кларитромицин е по-ефективна от 50 mg/kg/ден еритромицин.

Тестове за чувствителност

Количествени методи, които изискват измерването на зонови диаметри, дават най-точните преценки за чувствителността на бактериите към антимикробни лекарства. Една препоръчана процедура използва дискове, напоени с 15 µg кларитромицин, за изследване на чувствителността (дифузионен тест на Кърби-Бауер); интерпретирането корелира диаметрите на инхибиторната зона на този дисков тест с МИК стойностите на кларитромицин. МИК стойностите се определят чрез бульонен или метод на разреждане в агар.

При тези процедури резултат „чувствителен“ на лабораторията показва, че инфектиращият организъм вероятно ще се повлияе от терапията. Резултат „резистентен“ показва, че инфектиращият микроорганизъм вероятно няма да се повлияе от терапията. Резултат „междинна чувствителност“ предполага, че терапевтичният ефект на лекарството може да е несигурен или микроорганизмът ще бъде чувствителен, ако се използват по-високи дози. (Междинната чувствителност също се нарича умерена чувствителност.)

Моля, вижте специфичната информация за Вашата страна или регион относно гранични стойности за чувствителност, резистентност и междинна чувствителност.

Клинична ефикасност и безопасност

Клиничен опит при пациенти с немикобактериални инфекции

В клинични изпитвания е било демонстрирано, че кларитромицин в доза 7,5 mg/kg два пъти дневно е безопасен и ефективен при лечението на педиатрични пациенти с инфекции, изискващи орално антибиотично лечение. Кларитромицин е бил оценен при повече от 1 200 деца на възраст от шест месеца до 12 години със среден отит, фарингит, кожни инфекции и инфекции на долните дихателни пътища.

При тези изпитвания кларитромицин в доза от 7,5 mg/kg два пъти дневно е показвал сравнима клинична и бактериологична ефикасност с референтни лекарствени продукти, които включват пеницилин V, амоксицилин, амоксицилин/claveуланова киселина, еритромицин, азtreпtицин, цефаклор и цефадроксил.

Клиничен опит при пациенти с микобактериални инфекции



Едно изпитване с педиатрични пациенти (някои от които HIV-позитивни) с микобактериални инфекции демонстрира, че кларитромицин е бил безопасно и ефективно лечение, даден самостоятелно и в комбинация със зидовудин или дидеоксиинозин. Кларитромицин педиатрична суспензия е била приложена като 7,5; 15 или 30 mg/kg/ден в две отделни дози.

Някои статистически значими ефекти върху фармакокинетичните параметри са наблюдавани, когато кларитромицин е бил приложен с антиретровирусни лекарства; все пак тези промени са били малки и вероятно нямат клинична значимост. Кларитромицин в дози до 30 mg/kg/ден се понася добре.

Кларитромицин е бил ефективен за лечението на дисеминирани инфекции с *M. avium* комплекс при педиатрични пациенти със СПИН, като някои пациенти са демонстрирали продължителна ефикасност след повече от една година след терапията.

5.2 Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Началните фармакокинетични данни са получени с таблетни форми на кларитромицин. Тези данни показват, че лекарството бързо се абсорбира от stomashno-chrevния тракт и абсолютната бионаличност на 250 mg таблетка кларитромицин е приблизително 50%. Както началото на абсорбцията, така и формирането на антимикробно-активния метаболит 14-OH-кларитромицин се забавят леко от храна, но бионаличността не се повлиява от приложението на лекарството с храна.

Разпределение, биотрансформация и елиминиране

In vitro

In vitro проучвания показват, че свързването на кларитромицин с протеини в човешка плазма е средно около 70% при клинично значими концентрации от 0,45 до 4,5 µg/ml.


Здрави индивиди

Бионаличността и фармакокинетиката на кларитромицин педиатрична суспензия са изследвани при възрастни и при педиатрични пациенти. Проучване с единична доза при възрастни пациенти установява, че общата бионаличност на педиатричната форма е еквивалентна или малко по-голяма от тази на таблетката (дозировката с всяка от тях е 250 mg). Както при таблетката, приложението на педиатричната форма с храна води до леко забавяне на началото на абсорбцията, но не повлиява общата бионаличност на кларитромицин. Сравнителните C_{max} , AUC и $T_{1/2}$ на кларитромицин за педиатричната форма (с храна) са 0,95 µg/ml, 6,5 µg час/ml и 3,7 часа, съответно, а за 250 mg таблетка (на гладно) са 1,10 µg/ml, 6,3 µg час/ml и 3,3 часа, съответно.

В проучване с многократни дози, при което възрастни приемат 250 mg кларитромицин педиатрична суспензия на всеки 12 часа, кръвните нива в равновесно състояние почти се достигат по времето на петата доза. Фармакокинетичните параметри след петата доза кларитромицин педиатрична суспензия са C_{max} 1,98 µg/ml, AUC 11,5 µg час/ml, T_{max} 2,8 часа и $T_{1/2}$ 3,2 часа за кларитромицин и 0,67, 5,33, 2,9 и 4,9, съответно за 14-OH-кларитромицин.

При здрави хора на гладно, пиковите серумни концентрации се достигат до два часа след орално дозиране. С b.i.d. дозиране, като се използва таблетка от 250 mg на всеки 12 часа, пиковите серумни концентрации в равновесно състояние на кларитромицин се достигат за два до три дни и са приблизително 1 µg/ml. Съответстващите пикови серумни концентрации са 2 до 3 µg/ml с доза 500 mg, прилагана на всеки 12 часа.

Елиминационният полуживот на кларитромицин е около три до четири часа с 250 mg таблетка, прилагана на всеки 12 часа, но се повишава до пет до седем часа при 500 mg прилагани на всеки 12 часа. Основният метаболит 14-OH-кларитромицин достига пикова концентрация в равновесно състояние около 0,6 µg/ml и има елиминационен полуживот пет до шест часа след 250 mg доза на всеки 12 часа. При доза 500 mg на всеки 12 часа пиковите концентрации в равновесно състояние на 14-OH-кларитромицин са малко по-високи (до 1 µg/ml), а елиминационният полуживот е около



седем часа. И с двете дози концентрацията в равновесно състояние на този метаболит обикновено се достига за два до три дни.

Приблизително 20% от 250 mg орална доза, давана на всеки 12 часа, се екскретира в урината като непроменен кларитромицин. След доза от 500 mg на всеки 12 часа уринната екскреция на непромененото изходно лекарство е приблизително 30%. Бъбречният клирънс на кларитромицин все пак е относително независим от размера на дозата и приблизително е равен на нормалната скорост на гломерулна филтрация. Главният метаболит откриван в урината е 14-OH-кларитромицин, на когото се дължат допълнителни 10% до 15% от 250 mg или 500 mg приложена доза на всеки 12 часа.

Пациенти

Кларитромицин и неговият 14-OH метаболит се разпределят бързо в телесните тъкани и течности. Концентрациите в тъканите обикновено са няколко пъти по-високи от серумните концентрации. Примери за тъканни и серумни концентрации са представени по-долу:

КОНЦЕНТРАЦИЯ (след 250 mg на всеки 12 часа)		
Вид тъкан	Тъкан ($\mu\text{g/g}$)	Серум ($\mu\text{g/ml}$)
Сливица	1,6	0,8
Бял дроб	8,8	1,7

При педиатрични пациенти нуждаещи се от орално антибиотично лечение кларитромицин демонстрира добра бионаличност с фармакокинетичен профил в съответствие с предишните резултати при възрастни, като се използва същата суспензионна формула. Резултатите показват бърза и екстензивна лекарствена абсорбция при деца и с изключение на леко забавяне на началото на абсорбцията, храната изглежда няма значим ефект върху лекарствената бионаличност или фармакокинетичните профили. Фармакокинетичните параметри в равновесно състояние, достигнати след деветата доза на петия лечебен ден, са както следва за изходното лекарство: C_{\max} 4,60 $\mu\text{g/ml}$, AUC 15,7 $\mu\text{g/час/ml}$, и T_{\max} 2,8 часа; кореспондирящите стойности за 14-OH метаболита са съответно 1,64 $\mu\text{g/ml}$, 6,69 $\mu\text{g/час/ml}$ и 2,7 часа. Елиминационният полуживот е определен приблизително на 2,2 часа и 4,3 часа, съответно за изходното лекарство и метаболита.

В друго проучване е получена информация за проникването на кларитромицин в течността на средното ухо при пациенти със среден отит. Приблизително 2,5 часа след получаването на петата доза (дозировката е 7,5 mg/kg два пъти дневно), средната концентрация на кларитромицин е 2,53 $\mu\text{g/g}$ течност в средното ухо, а за 14-OH метаболита е 1,27 $\mu\text{g/g}$. Концентрациите на изходното лекарство и 14-OH метаболита обикновено са два пъти по-високи от съответните концентрации в серума.

Чернодробно увреждане

Концентрациите в равновесно състояние на кларитромицин при хора с увредена чернодробна функция не се различават от тези при здрави индивиди; все пак концентрациите на 14-OH-кларитромицин са по-ниски при пациенти с чернодробно увреждане. Намаленото формиране на 14-OH-кларитромицин се компенсира поне частично от повишение на бъбречния клирънс на кларитромицин при хора с увредена чернодробна функция в сравнение със здрави индивиди.

Бъбречно увреждане

Фармакокинетиката на кларитромицин също е променена при пациенти с нарушен бъбречна функция, които получават многократни перорални дози от 500 mg. Елиминационният полуживотът, C_{\max} и C_{\min} за кларитромицин и неговия 14-OH метаболит са по-ниски. AUC е много по-голяма при хора с бъбречно увреждане в сравнение със здрави индивиди. Степента, до която тези



параметри се различават, корелира със степента на бъбречното увреждане; колкото по-тежко е бъбречното увреждане, толкова по-значима е разликата (вж. точка 4.2).

Пациенти в старческа възраст

В сравнително изпитване на здрави млади хора и здрави лица в старческа възраст, получаващи многократни перорални дози 500 mg кларитромицин, циркулиращите плазмени нива са по-високи, а елиминацията е по-бавна в по-възрастната група в сравнение с по-младата група. Все пак няма разлика между двете групи, когато бъбречният клирънс на кларитромицин се корелира с креатининовия клирънс. Заключението от тези резултати е, че всеки ефект при използването на кларитромицин е свързан с бъбречната функция, а не с възрастта на пациента.

Пациенти с микобактериални инфекции

Концентрациите в равновесно състояние на кларитромицин и 14-OH-кларитромицин, наблюдавани след приложението на обичайни дози при пациенти с HIV инфекция (таблетки за възрастните; гранули за суспензия за деца), са подобни на тези, наблюдавани при здрави индивиди. Все пак при по-високите дози, които могат да бъдат необходими за лечение на микобактериалните инфекции, концентрациите на кларитромицин могат да бъдат значително по-високи от тези, наблюдавани при обичайните дози.

При деца с HIV инфекция, приемащи 15 до 30 mg/kg/ден кларитромицин, разделен в две дози, стойностите на C_{max} в равновесно състояние обикновено варират от 8 до 20 $\mu\text{g}/\text{ml}$. Все пак са наблюдавани и стойности на C_{max} до 23 $\mu\text{g}/\text{ml}$ при HIV-инфицирани педиатрични пациенти, приемащи 30 mg/kg/ден, разделени в две отделни дози като кларитромицин педиатрична суспензия. Елиминационните полуживоти изглеждат удължени при тези по-високи дози в сравнение с тези, наблюдавани при обичайните дози при здрави индивиди. По-високите плазмени концентрации и по-дългите елиминационни полуживоти, наблюдавани при тези дози, са в съответствие с известната нелинейност на фармакокинетиката на кларитромицин.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Проучвания за остра и подостра орална токсичност

Острите орални LD₅₀ стойности на кларитромицин суспензия, приложена на тридневни мишки, са 1 290 mg/kg за мъжки и 1 230 mg/kg за женски. LD₅₀ стойностите при тридневни пълхове са 1 330 mg/kg за мъжки и 1 270 mg/kg за женски. За сравнение, LD₅₀ за орално приложен кларитромицин е около 2 700 mg/kg за възрастни мишки и около 3 000 mg/kg за възрастни пълхове. Тези резултати са в съответствие с други антибиотици от пеницилиновата група, цефалоспориновата група и макролидната група с това, че LD₅₀ обикновено е по-ниска при млади животни, отколкото при възрастни.

При мишки и пълхове телесното тегло е намалено или неговото покачване е потиснато, а сукателният рефлекс и спонтанните движения са потиснати през първите няколко дни след лекарственото приложение. Аутопсия на животни, които са умрели, показва тъмно-червеникави бели дробове при мишки и около 25% при пълхове; за пълховете, третирани с 2 197 mg/kg или повече кларитромицин суспензия, също е забелязано, че имат червеникаво-черно вещество в червата, вероятно поради кървене. Смъртта на тези животни се счита, че се дължи на изтощение, което е резултат от потиснат сукателен рефлекс или кървене от червата.

На пълхове преди отбиването (на възраст пет дни) е приложена кларитромицин суспензионна форма за две седмици при дози от 0, 15, 55 и 200 mg/kg/ден. Животните от групата 200 mg/kg/ден имат намалено покачване на телесно тегло, намалени средни стойности на хемоглобин и хематокрит и повищено средно относително бъбречно тегло в сравнение с контролната група. Наблюдавана е минимална до лека мултилокална вакуозна дегенерация на епитела на интрахепаталните жълчни пътища, която е свързана с лечението, а също и повишената честота на бъбречни лезии при животни от тази лечебна група. Дозировката за това проучване е 55 mg/kg/ден.



Проведено е проучване за перорална токсичност, при което на млади плъхове е приложена кларитромицин суспензия за шест седмици при дневни дозировки от 0, 15, 50 и 150 mg база/kg/ден. Няма смъртни случаи, а единственият наблюдаван клиничен белег, е повишена саливация при някои от животните с най-високата дозировка от един до два часа след приложението по време на последните три седмици от лечението. Плъховете от дозова група 150 mg/kg имат по-ниско средно телесно тегло по време на първите три седмици и е забелязано, че имат понижени средни стойности на серумен албумин и повишено относително чернодробно тегло в сравнение с контролите.

Не са открити макро- или микроскопски хистопатологични промени, свързани с лечението. Дозировката от 150 mg/kg/ден води до лека токсичност в третираните плъхове и е счетено, че „дозировката без ефект“ е 50 mg/kg/ден.

Млади кучета от порода бигъл на възраст от три седмици са третирани орално всеки ден за четири седмици с 0, 30, 100 или 300 mg/kg кларитромицин, последвано от четиристедмичен период на възстановяване. Няма смъртни случаи и не са наблюдавани промени в общото състояние на животните. Аутопсията не показва аномалии. При хистологично изследване със светлинна микроскопия са наблюдавани мастни отлагания в центролобуларните хепатоцити и клетъчна инфильтрация на порталните зони, и е забелязано увеличаване на хепатоцелуларните мастни капки чрез електронна микроскопия в дозовата група 300 mg/kg. Счетено е, че токсичната доза при млади кучета от порода бигъл е по-висока от 300 mg/kg, а „дозировката без ефект“ - 100 mg/kg.

Фертилност, репродукция и тератогенност

Проучвания за фертилност и репродукция показват, че дневни дозировки от 150 до 160 mg/kg/ден при мъжки и женски плъхове не предизвикват нежелани ефекти върху половия цикъл, фертилността, раждането и броя и жизнеността на потомството. Две проучвания за тератогенност с плъхове *Wistar* (p.o.) и *Sprague-Dawley* (p.o. и i.v.), едно проучване с новозеландски бели зайци и едно проучване с маймуни макак не демонстрират, каквато и да е тератогенност на кларитромицин. Само в едно допълнително проучване с плъхове *Sprague-Dawley* при подобни дози и практически подобни условия се открива много ниска, статистически незначима честота (приблизително 6%) на сърдечно-съдови аномалии. Тези аномалии изглежда се дължат на спонтанна експресия на генетични промени в колонията. Две проучвания с мишки също показват променлива честота на цепнато небце (3 до 30%) след дози 70 пъти над горната граница на обичайната дневна клинична доза при хора (500 mg b.i.d.), но не и при 35 пъти максималната дневна клинична доза при хора, което предполага майчина и фетална токсичност, но не тератогенност.

За кларитромицин е установено, че причинява загуба на ембриона при маймуни, когато се прилага приблизително десет пъти над горната граница на обичайната дневна доза при хора (500 mg два пъти дневно), започвайки от 20 гестационен ден. Този ефект се отдава на майчина токсичност на лекарството при много високи дози. Допълнително проучване с бременни маймуни при дозировки приблизително 2,5 до 5 пъти максималната планирана дневна дозировка от 500 mg два пъти дневно не показва уникална опасност за плода.

Доминантен летален тест при мишки, на които се дават 1 000 mg/kg/ден (приблизително 70 пъти максималната дневна клинична доза при хора от 500 mg два пъти дневно) е видимо отрицателен за мутагенна активност, а в Сегмент I проучване на плъхове третирани с до 500 mg/kg/ден (приблизително 35 пъти максималната дневна клинична доза при хора от 500 mg два пъти дневно) за 80 дни, не е показвано доказателство за функционално увреждане на мишка фертилност, дължащо се на тази продължителна експозиция на тези много високи дози кларитромицин.

Мутагенност



Извършени са проучвания за оценка на мутагенния потенциал на кларитромицин, като са използвани неактивни и активирани пълни чернодробни микрозомни тестове системи (тест на Ames). Резултатите от тези проучвания не предоставят доказателство за мутагенен потенциал при лекарствени концентрации от 25 µg/петрива паничка или по-ниски. При концентрация от 50 µg лекарството е токсично за всички изследвани щамове.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Състав на гранули и обвивката

Карбопол карбомери

Повидон

Хипромелоза

Рициново масло

Други помощни вещества

Захароза

Силициев диоксид

Ксантанова гума

Калиев сорбат

Лимонена киселина

Малтодекстрин

Титанов диоксид

Аромат на плодов пунш

6.2 Несъвместимости

Неприложимо.

6.3 Срок на годност

Клацид 125 mg/5ml гранули за перорална суспензия - 2 години.

6.4 Специални условия на съхранение

Не се изискват специални условия за съхранение.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Веднъж приготвена, пероралната суспензия Клацид може да се употребява в рамките на 14 дни, съхранявана под 25°C.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

Гранули за перорална суспензия са поставени в бутилка от HDPE - 60 ml или 100 ml.

Всяка бутилка е поставена в картонена кутия, придружена с мерителна лъжичка или спринцовка и листовка.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Приготвяне на пероралната суспензия

Към гранули в бутилката се добавя вода до мерителната линия, отбележана от рука, стикер на бутилката. Разклаща се бутилката докато се получи суспензијата. Да се избягва много времето и/или



продължително разклащане. Обикновено след първоначалното добавяне на вода и разклащане до получаване на суспензия, нивото на водата спада под мерителната линия. Поради това може да е необходимо да се допълни с вода, точно до същата мерителна линия, за да се достигне желаната концентрация на антибиотика в крайната суспензия. 5 ml от така пригответа суспензия съдържат 125 mg кларитромицин. Да се разклаща преди всяка последваща употреба с цел да се осигури ресуспендиране.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Майлан ЕООД
Офис сграда „Сердика офиси“
бул. Ситняково № 48, ет. 7
1505 София, България

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Регистрационен номер: 20010617

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 15 юни 2001 г.

Дата на последно подновяване: 2 февруари 2011 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

02/2021

