

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА

Кратка характеристика на продукта - Приложение 1

Към Рег. № 20070084

Разрешение № BG/1717/16-55126

перорална супензия

ASPIRIN COMPLEX 500 mg / 30 mg granules for oral suspension

30. 06. 2021

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТАСПИРИН КОМПЛЕКС 500 mg / 30 mg гранули за перорална супензия
ASPIRIN COMPLEX 500 mg / 30 mg granules for oral suspension**2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ**

Всяко саше съдържа 500 mg ацетилсалицилова киселина (*acetylsalicylic acid*) и 30 mg псевдофедринов хидрохлорид (*pseudoephedrine hydrochloride*).

Помощни вещества с известно действие:

Всяко саше съдържа 2 g захароза.

Всяко саше съдържа 3,78 mgベンзиолов алкохол.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Гранули за перорална супензия

Бели до жълтеникави гранули

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ**4.1 Терапевтични показания**

Симптоматично лечение на назална/синусна конгестия (риносинуит) с болка и повищена температура, свързани с общи простудни и/или грипоподобни симптоми.

АСПИРИН Комплекс е показан при възрастни и юноши след 16-годишна възраст.

4.2 Дозировка и начин на приложениеДозировка

Съдържанието на 1-2 сашета за възрастни и юноши над 16 години.

Ако е необходимо, единичната доза може да се повтори според нуждата след минимален период от 4 часа. Не трябва да се надвишава максимална дневна доза от 6 сашета.

Когато един от симптомите е силно изразен, е по-подходящо лечение с монотерапия.

АСПИРИН Комплекс не трябва да се приема повече от 3 дни без консултация с лекар.

Педиатрична популация

АСПИРИН Комплекс не се препоръчва за употреба при деца и юноши под 16-годишна възраст освен по съвет на лекар. Поради ограничения опит с АСПИРИН Комплекс при деца и юноши не може да се направят специфични препоръки за дозиране.

Пациенти с чернодробно увреждане

Ацетилсалициловата киселина трябва да се използва внимателно при пациенти с извънредна чернодробна функция. (вж. точка 4.4)



Пациенти с бъбречно увреждане

Ацетилсалициловата киселина трябва да се използва с повищено внимание при пациенти с увредена бъбречна функция или увредена сърдечно-съдова циркулация. (вж. точка 4.4)

Начин на приложение

АСПИРИИН Комплекс трябва да се суспендира в чаша с вода преди прием. Получената суспензия има вкус на портокал.

4.3 Противопоказания

- Свръхчувствителност към псевдофедрин, към ацетилсалицилова киселина или други салицилати, или някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1;
- Анамнеза за астма, предизвикана от приложението на салицилати или вещества с подобно действие, особено нестероидни противовъзпалителни средства;
- Активни язви на стомашно-чревния тракт;
- Хеморагична диатеза;
- Бременност;
- Кърмене;
- Тежка чернодробна недостатъчност;
- Тежка бъбречна недостатъчност;
- Тежка сърдечна недостатъчност;
- Комбинация с метотрексат в дози 15 mg/седмица или повече; точка 4.5;
- Тежка хипертония;
- Тежко заболяване на коронарните артерии;
- Лечение с инхибитори на моноаминооксидаза през предшестващите две седмици;
- Тесноъгълна глаукома;
- Задържане на урина.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

- Съпътстващо лечение с антикоагуланти; точка 4.5;
- Анамнеза за стомашно-чревни язви, включително хронична или рецидивираща язвена болест, или анамнеза за стомашно-чревно кървене;
- пациенти с увредена бъбречна функция или болни с увредена сърдечно-съдова функция (напр. бъбречно съдово заболяване, застойна сърдечна недостатъчност, намален обем на кръвта, голяма операция, сепсис или големи хеморагични събития), тъй като продукта може допълнително да увеличи риска от бъбречно увреждане и остра бъбречна недостатъчност;
- Увредена чернодробна функция;
- Бъбречна тубулна ацидоза поради натрупване на PSE и повишен риск от нежелани реакции;
- Свръхчувствителност към аналгетици / противовъзпалителни или противоревматични лекарствени продукти или други алергени;
- Хипертриоидизъм, лека до средно тежка хипертония, захарен диабет, исхемична болест на сърцето, повищено вътрешно налягане (глаукома), хипертрофия на простатата или чувствителност към симпатикомиметични средства;
- Пациентите в старческа възраст може да са особено чувствителни към ефектите на псевдофедрин върху централната нервна система.



Ацетилсалициловата киселина може да предизвика бронхоспазъм и да индуцира астматичен пристъп или други реакции на свръхчувствителност. Рискови фактори са наличие на бронхиална астма, сенна хрема, назални полипи или хронично заболяване на дихателната система. Това се отнася и до пациенти с алергични реакции (напр. кожни реакции, сърбеж, уртикария) към други вещества.

Поради инхибиращия ефект върху агрегацията на тромбоцитите, която персистира няколко дни след приложението, ацетилсалициловата киселина може да доведе до повишена склонност към кървене по време и след хирургични операции (включително малки операции, напр. изваждане на зъб).

В ниски дози, ацетилсалициловата киселина намалява екскрецията на пикочна киселина. Това може да отключи подагра при пациенти, които вече са със склонност към намалена екскреция на пикочна киселина.

Редовното използване на аналгетици (особено комбинации от различни аналгетични продукти) може да увреди необратимо бъбреците (аналгетична нефропатия).

АСПИРИН Комплекс съдържа 2 g захароза за саше (еквивалентна на 0,17 въглехидратни единици). Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет.

Пациенти с редки наследствени проблеми на фруктозна непоносимост, глюкозо-галактозна малабсорбция или сукраза-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат това лекарство.

АСПИРИН Комплекс съдържа 3,78 mgベンзилов алкохол на всяко саше. Бензиловият алкохол може да причини алергични реакции.

Пациентите с чернодробни или бъбречни заболявания трябва да се свържат със своя лекар, защото големи количестваベンзилов алкохол могат да предизвикат метаболитна ацидоза.

При пациенти, страдащи от тежка глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна (Г6ФД) недостатъчност, ацетилсалициловата киселина може да предизвика хемолиза или хемолитична анемия.

Фактори, които може да увеличат риска от хемолиза, са напр. високи дози, повишена температура или остри инфекции.

Тежки кожни реакции като остра генерализирана екзантематозна пустулоза (AGEP), може да възникне при продукти, съдържащи псевдофефрин. Този остръ пустулозен обрив може да се появи в рамките на първите 2 дни от лечението, с повишена температура и многобройни малки, предимно нефоликуларни пустули, възникващи върху обширен едематозен еритем и локализирани главно в кожните гънки, по торса и горните крайници. Пациентите трябва да се наблюдават внимателно. Ако се появят признания и симптоми като пирексия, еритема или множество малки пустули, приложението на АСПИРИН Комплекс трябва да се преустанови и ако е необходимо, да се вземат подходящи мерки.

Исхемичен колит

Съобщени са случаи на исхемичен колит при употреба на псевдофефрин. Ако се развие внезапна коремна болка, ректално кървене или други симптоми на исхемичен колит, лечението с псевдофефрин трябва да се преустанови и да се потърси консултация с лекар.

Исхемична оптична невропатия

Получени са съобщения за случаи на исхемична оптична невропатия при псевдофефрин. Псевдофефрин трябва да се прекрати, ако се появи внезапна загуба на зрение или намаление на зрителната острота, като скотома.



Спортсите трябва да знаят, че този лекарствен продукт може да предизвика положителна реакция при „анти-допингови“ изследвания.

Педиатрична популация

Съществува възможна връзка между ацетилсалициловата киселина и синдрома на Reye, когато се прилага при деца и юноши за вирусна инфекция със или без повишена температура. Поради това, не давайте АСПИРИН Комплекс на деца и юноши под 16-годишна възраст освен по съвет на лекар.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Противопоказани комбинации (виж точка 4.3):

Метотрексат, прилаган в дози от 15 mg/седмица или по-големи:

Повишена хематологична токсичност на метотрексат (намален бъбречен клирънс на метотрексат от противовъзпалителните средства по принцип и известване на метотрексат от свързването му с плазмените протеини от салицилатите).

Приложение на инхибитори на моноамино оксидазата (MAOIs) през предшестващите 2 седмици повишава риска от сърдечно-съдови нежелани събития (напр. аритмия, хипертензивни реакции)

Комбинации, налагани предпазни мерки при употреба:

Метотрексат, прилаган в дози под 15 mg/седмица:

Повишена хематологична токсичност на метотрексат (намален бъбречен клирънс на метотрексат от противовъзпалителните средства по принцип и известване на метотрексат от свързването му с плазмените протеини от салицилатите).

Антикоагуланти, тромболитици/други инхибитори на агрегацията на тромбоцитите / хемостазата:

Повишен риск от кървене.

Други нестероидни противовъзпалителни средства със салицилати

Повишен риск от язви и стомашно-чревно кървене поради синергичен ефект.

Селективни инхибитори на обратното поемане на серотонина (SSRIs):

Повишен риск от кървене от горните отдели на стомашно-чревния тракт поради евентуален синергичен ефект

Дигоксин:

Плазмените концентрации на дигоксин са повишени поради намалена бъбречна екскреция.

Антидиабетни средства, напр. инсулин, сулфанилурейни продукти:

Засилен хипогликемичен ефект при високи дози на ацетилсалициловата киселина посредством хипогликемично действие на ацетилсалициловата киселина и известване на сулфанилурейния продукт от свързването му с плазмените протеини.

Диуретици в комбинация с ацетилсалицилова киселина:

Намалена гломерулна филтрация посредством намалена бъбречна синтеза на простагландини.

Системни глюкокортикоиди с изключение на хидрокортизон, използван като заместителна терапия при Адисонова болест:



Намалени кръвни нива на салицилатите по време на лечение с кортикоステроиди и риск от предозиране на салицилатите след като се спре това лечение посредством засилено елиминиране на салицилатите от кортикостеоидите.

Инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE) в комбинация с ацетилсалицилова киселина:

Намалена гломерулна филтрация посредством инхибиране на вазодилататорните простагландини. Освен това, намален антихипертензивен ефект.

Валпроева киселина:

Повищена токсичност на валпроевата киселина поради изместване от свързването с плазмените протеини.

Алкохол:

Повищено увреждане на стомашно-чревната лигавица и удължено време на кървене поради адитивни ефекти на ацетилсалициловата киселина и алкохола.

Урикозурици, като напр.ベンзбромарон, пробенецид:

Намален урикозуричен ефект (конкуриране за елиминиране на пикочната киселина през бъбречните тубули).

Албутерол таблетки:

Засилване на ефектите (екзацербация на сърдечно-съдовите нежелани ефекти); това не изключва предизвика употреба на аерозолен бронходилататор от адренергичен тип.

Антидепресанти

Засилени ефекти.

Други симпатомиметични лекарства.

Засилени ефекти.

Антихипертензивни лекарства като гванетидин, метилдопа, β-блокери:

Намалени ефекти.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Като се има предвид, че няма данни за комбинацията от двете съединения, АСПИРИН Комплекс е противопоказан при бременност.

Потискането на синтезата на простагландини може да повлияе неблагоприятно бременността и/или развитието на ембриона/плода. Данните от епидемиологичните проучвания показват, че има повишен рисков от аборт и сърдечни малформации, и гастрохиза при прием на инхибитори на простагландиновия синтез в началото на бременността. Абсолютният рисков от сърдечно-съдови малформации се повишава от под 1% до приблизително 1,5%. Счита се, че рисът се повиши с дозата и продължителността на лечението. При животни е доказано, че прилагането на инхибитор на синтезата на простагландини води до пре- и постимплантационна загуба и леталитет на ембриона-плода. Освен това повишената честота на различните малформации, включително сърдечно-съдови, е наблюдавана при животни, получавали инхибитори на простагландиновата синтеза през периода на органогенезата.

През първия и втори триместър на бременността, ацетилсалицилова киселина не трябва да се прилага, освен ако е абсолютно необходимо. Ако ацетилсалицилова киселина се използва при



жена, която се опитва да забременее или през първия и втория триместър на бременността, дозата трябва да бъде възможно най-малка, а продължителността на прилагането ѝ – възможно най-кратка.

През третия триместър на бременността, всички инхибитори на простагландиновата синтеза могат да изложат плода на:

- кардиопулмонарна токсичност (с по-ранно затваряне на дуктус артериозус и белодробна хипертония);
- бъбречна дисфункция, която може да прогресира до бъбречна недостатъчност с олигохидроамниоза;

майката и новороденото, в края на бременността, на:

- възможно удължаване на времето на кървене, анти-агрегантен ефект, който може да се появи дори и в много ниски дози.
- потискане на маточните контракции, водещо до забавено или продължително раждане.

Поради това, продуктът е противопоказан през третото тримесечие на бременността.

Ограниченията от приложението на псевдофедрин при бременност не предполага съществуването на повишен риск от малформации. Независимо от това, псевдофедрин не трябва да се взема по време на бременност.

Проучванията при животни на двете активни вещества показват данни за репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3).

Кърмене

Салицилатите, а също и псевдофедрин преминават в кърмата в малки количества. Тъй като няма данни за комбинирането на двете вещества, АСПИРИН Комплекс е противопоказан при кърмещи жени.

Фертилит

Има някои данни, че лекарствата, които потискат синтезата на простагландините могат да причинят увреждане на женския фертилит чрез повлияване на овуляцията. Това е обратимо при прекратяване на лечението. Проучванията при животни показват неблагоприятни ефекти върху фертилитета при мъжете и жените (вж. точка 5.3).

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Аспирин КОМПЛЕКС има незначително до умерено влияние върху способността за шофиране и работа с машини. Рискът може да се увеличи допълнително при съпътстващ прием на алкохол.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Честота: с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Възможни нежелани реакции на ацетилсалициловата киселина са:

Нарушения на имунната система

Реакции на свръхчувствителност със съответните лабораторни и клинични профили, включително респираторно заболяване, обострено с аспирин, леки до умерени реакции, потенциално засягащи кожата, респираторния тракт, stomашно-чревният тракт и сърдечно-съдовата система, включително симптоми като напр. обрив, краткотрайна стомах



сърбеж, ринит, назална конгестия, кардио-респираторен дистрес и много рядко тежки реакции, включително анафилактичен шок.

Стомашно-чревни нарушения

Стомашно-дуоденални оплаквания (гастралгия, диспепсия, гастрит);

Гадене, повръщане, диария;

Стомашно-чревни язви, които могат да доведат до перфорация в изолирани случаи.

Болест на диафрагмата с чревни нарушения (особено при продължително лечение).

Хепато-билиарни нарушения

Преходно чернодробно увреждане с повишаване на трансаминазите.

Нарушения на кръвта и лимфната система

Повишаване на риска от кървене, кръвоизлив като напр. кръвоизлив при процедури, хематоми, епистаксис, кръвоизлив от пикочо-половите пътища и кървене от венците;

Хемолиза и хемолитична анемия при пациенти с тежки форми на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна (Г6ФД) недостатъчност;

Кръвоизливът може да доведе хеморагична анемия / желязодефицитна анемия (напр. поради окултурно микрокървене) със съответните лабораторни и клинични признания и симптоми, като напр. астения, бледност, хипоперфузия.

Нарушения на нервната система и нарушения на ухoto и лабиринта

Световъртежът може да бъде симптом на предозиране.

Нарушения на ухoto и лабиринта

Шумът в ушите може да бъде симптом на предозиране.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Има съобщения за бъбречно увреждане, остра бъбречна недостатъчност.

Възможни нежелани реакции на псевдофедрин са:

Съдови нарушения

Зачеряване на кожата;

Повишаване на кръвно налягане, макар и не в контролирана хипертония.

Сърдечни нарушения

Сърдечни ефекти (напр. тахикардия, сърцевиене, аритмии).

Нарушения на нервната система

Стимулиране на централната нервна система (напр. безсъние, рядко халюцинации).

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Задръжка на урина, особено при пациенти с хипертрофия на простатата.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Ефекти върху кожата (напр. обрив, уртикария, сърбеж).

Тежки кожни реакции, включително остра генерализирана екзантематозна пустулоза (AGEP) са съобщени при продукти, съдържащи псевдофедрин

Стомашно-чревни нарушения

Исхемичен колит

Сухота в устата



Нарушения на очите
Исхемична оптична невропатия

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/рисък за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез Изпълнителната агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

Уебсайт: www.bda.bg

4.9 Предозиране

Ацетилсалицилова киселина:

Има разлика между хронично предозиране с нарушения предимно на централната нервна система ("салицилизъм") и остра интоксикация, основната проява при която е тежко нарушение на киселинно-алкалното равновесие. В допълнение към нарушенията на киселинно-алкалното равновесие и електролитното равновесие (напр. загуба на калий), хипогликемия, кожни обриви, и стомашно-чревен кръвоизлив, симптомите могат да включват хипервентилация, шум в ушите, гадене, повръщане, увреждане на слуха и зрението, главоболие, световъртеж и обърканост.

При тежка интоксикация могат да се развитят делириум, трепор, задух, изпотяване, дехидратация, хипертермия и кома. При интоксикация с летален изход, смъртта обикновено настъпва поради дихателна недостатъчност.

Псевдофефедрин:

Засилени симпатикомиметични реакции могат да се развият след интоксикация, напр. тахикардия, болка в гърдите, възбуденост, хипертония, свиркащо дишане и недостиг на въздух, гърчове, халюцинации.

Методите, използвани за лечение на интоксикацията с АСПИРИН Комплекс зависят от степента, стадия и клиничните симптоми на интоксикация. Те съответстват на обичайните мерки за намаляване на абсорбцията на активните съставки: ускоряване на екскрецията, мониториране на водния и електролитен баланс, нарушената температурна регулация, дишане, сърдечно-съдова и мозъчна функция. Бързо предприемане на спешни мерки е от основно значение, дори ако няма видими прояви и симптоматика.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Нервна система, Други аналгетици и антипиретици – ацетилсалицилова киселина

ATC-код: N02B A01

Фармакотерапевтична група: Дихателна система, Деконгестанти за системно приложение – симпатикомиметики – Псевдофефедрин

ATC-код: R01B A02

Ацетилсалициловата киселина принадлежи към група киселинни нестероидни аналгетици/противовъзпалителни лекарства с аналгетични, антипиретични и противовъзпалителни свойства. Нейният механизъм на действие се основава на обратимо потискане на цикло-оксигеназните ензими, участващи в синтеза на простагландини.



Ацетилсалициловата киселина потиска също и агрегацията на тромбоцитите, като блокира синтезата на тромбоксан A₂ в тромбоцитите.

Псевдофефрин е симпатикомиметик с алфа-агонистична активност. Той е дексстроизомер на ефедрин, и двата продукта са еднакво ефективни като назални деконгестанти. Те стимулират алфа-адренергичните рецептори на съдовата гладка мускулатура, с което свиват дилатираниите артериоли в назалната лигавица и намаляват кръвотока към зоната на запушването.

5.2 Фармакокинетични свойства

Ацетилсалицилова киселина:

След орално приложение, ацетилсалициловата киселина се абсорбира бързо и напълно от stomashno-chrevnia trakt. По време и след абсорбцията ацетилсалициловата киселина се превръща в нейния основен метаболит салициловата киселина. Максимални плазмени нива се достигат след 13 - 19 минути за ацетилсалициловата киселина и след (диапазон на медиани) с максимални плазмени концентрации от 11 до 15 µg/mL (диапазон на геометрични средни стойности), както е показано в проучванията на Bayer..

Ацетилсалициловата киселина както и салициловата киселина се свързват изцяло с плазмените протеини и бързо се разпространяват до всички части на тялото. Салициловата киселина се появява в кърмата и преминава през плацентата.

Салициловата киселина се елиминира основно с чернодробен метаболизъм; метаболитите са салицилурейна киселина, салицил фенолен глюкоронид, салицил ацил глюкоронид, гентисикова киселина и гентисурикова киселина.

Елиминационната кинетика на салициловата киселина е зависима от дозата, като метаболизъмът се ограничава от капацитета на чернодробните ензими. При това елиминационният полуживот варира между 2 до 3 часа след ниски дози и около 15 часа при високи дози. Салициловата киселина и нейните метаболити се екскретират основно през бъбреците.

Псевдофефрин:

Лекарството се абсорбира бързо. Максимални плазмени нива се постигат след 40 до 50 минути (диапазон на медианите) с максимални плазмени концентрации от 122 до 147 µg/L (диапазон на геометричните средни стойности), както е показано в проучванията на Bayer. Обемът на разпределение на псевдофефрин е 2,4 до 3,3 L. Приблизително 70% до 90% от псевдофефрина се екскретира непроменено в урината. Основният активен метаболит норпсевдофефрина се екскретира в урината като около 1% от дозата псевдофефрин при нормални индивиди, но може да е около 6% от приложената доза при пациенти с хронично алкална урина. Алкализирането на урината може да намали екскрецията, особено при pH над 5.5. Псевдофефрин се екскретира в кърмата при хора.

Времето на полуживот на лекарството е 5 до 6 часа при pH на урината от 5 до 6. В същото време времето на полуживот на лекарството зависи от pH на урината: продължителност от 50 часа е докладвана при пациент с персистираща алкална урина и 1,5 часа са докладвани при пациент с много кисела урина.

Конвенционалната хемодиализа е само минимално ефективна по отношение премахване на псевдофефрин.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Предклиничният профил на безопасност на ацетилсалициловата киселина е добре документиран. При изследвания с животни салицилатите причиняват увреждане на бъбреците и stomashno-chrevni язви.

Ацетилсалициловата киселина е адекватно изследвана за мутагенност и канцерогенност, не са установени мутагенен или канцерогенен потенциал.



Установено е, че салицилатите имат тератогенни ефекти при някои животински видове. Има съобщения за нарушена имплантиране, ембриотоксични и фетотоксични ефекти, и нарушения на капацитета за обучение на новородените след пренатално въздействие.

Псевдофефедрин е назален деконгестант с продължителен пазарен опит при хора. Няма данни, че псевдофефедрин има мутагенен потенциал. При токсична за майката доза, псевдофефедрин индуцира фетотоксичност (намалено тегло на плода и забавена осификация) при пърхове. Проучванията на фертилитета или пери-постнатални проучвания за псевдофефедрин не са провеждани.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Лимонена киселина

Захароза

Хипромелоза

Захарин

Портокалов аромат, включително бензилов алкохол, оцетна киселина, алфа токоферол, модифицирано нишесте Е1450 и малтодекстрин.

6.2 Несъвместимости

Неприложимо.

6.3 Срок на годност

2 години

6.4 Специални условия на съхранение

Да не се съхранява над 30°C.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

5 x 2 и 10 x 2 сашета (съставени от хартия/алуминий/полиетилен), пакетирани в картонена опаковка.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Байер България ЕООД
Ул. "Резбарска" № 5
1510 София, България



8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Регистрационен номер: 20090034

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешение: 26 ноември 2001 г.

Дата на подновяване на разрешението: 25 ноември 2013 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

04/2021

