

Листовка: информация за потребителя

РИВАНОЛОВ РАЗТВОР КУПРО 0,1% разтвор за кожа

SOLUTIO RIVANOLI KUPRO 0,1% cutaneous solution

Етакридинов лактат (Ethacridine lactate)

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!

Състав: 100 ml от разтвора за кожа съдържа 0,1g етакридинов лактат и прецистена вода

Лекарствена форма и опаковка

Разтвор за кожа. Тъмни бутилки от полиетилентерефталат от 100 ml.

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба:

“Купро 94” ООД, ул. “Мано Тодоров” 28, 5100 Горна Оряховица, България,
тел./факс: 0618/600 14.

Име и адрес на производителя:

“Купро 94” ООД, ул. “Иван Момчилов” 2, 5100 Горна Оряховица, България,
тел./факс: 0618/600 14.

Показания

Антисептично средство за външно приложение, за дезинфекция на рани, язви на кожата, пилеодерми, вторични пифектирани дерматози и изгаряния.

ИНФОРМАЦИЯ НЕ ОБОХДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА

Когато не трябва да се използва риванолов разтвор 0,1%

Риваноловия разтвор не трябва да се използва при контактни алергии към акридинови багрила и по-специално към етакридинов лактат. Да не се употребява при настъпващо нарушение на функциите на бъбреците с албуминурия.

Специални предупреждения при употреба

* Да не се приема вътрешно.

* Да се пазят очите.

Лекарствени и други взаимодействия Не са известни.

Бременност и кърмене

Да не се употребява по време на бременост и кърмене!



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Макет на опаковката - Приложение 3

Към Рег. №

Разрешение №

Датум на издаване № **ТАЛ-13769/19.03.13г.**

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Не са известни.

Важна информация относно някои от съставките на риванол
Възможна е реакция на свръхчувствителност, проявяваща се с контактен
дерматит, фотосенсибилизация, рядко оток на лицето, уртикария, главоболие.

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА
РИВАНОЛОВ РАЗТВОР КУПРО 0,1%**

Дозировката и начини на употреба
Нанася се външно се нанася с помощта на подходящ тампон върху кожата 1-2
пъти дневно.

Необходими действия при предозироване

Поради начина на приложение и ниската концентрация предозироването не е от
практическо значение. При по-продължително прилагане може да причини
иритативни и корозивни увреждания на кожата.

Нежелани лекарствени реакции

Възможна е реакция на свръхчувствителност, проявяваща се с контактен
дерматит, фотосенсибилизация, рядко оток на лицето, уртикария, главоболие.

Съхранение

Риваноловия разтвор трябва да се съхранява в оригинална опаковка при
температура под 25°C, на сухо и защитено от пряка слънчева светлина място.

Да се съхранява на недостъпно за деца място!

Срок на годност

Не използвайте риванолов разтвор след срока на годност, отбелязан върху
вторичната опаковка, след текста “годен до...”!

На опаковката – 6 (шест) месеца.

След първоначално отваряне на опаковката – 1 (един) месец.

Дата на последна редакция на листовката

Юли 2011г.

Мес