

ДОПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Документ № - Приложение 2	
Листовка: информация за потребителя	
Удължено № <i>20140239</i>	
ЕРАЗАБАН 10% крем Докозанол	
ERAZABAN 10% cream Docosanol	

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това трябва да използвате Еразабан внимателно, за да получите най-добри резултати от него.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако след 10 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да спрете използването на крема и да потърсите лекарска помощ.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Еразабан и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Еразабан
3. Как да използвате Еразабан
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Еразабан
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Еразабан и за какво се използва

Докозанол е антивирусно средство. Еразабан е бял крем, който се използва за лечение на ранните етапи на рецидивираща лабиален херпес симплекс инфекция (херпес) при възрастни и юноши (над 12 години).

За да бъде ефективно, лечението с Еразабан трябва да започне в най-ранните етапи на развитие на херпеса, преди да се появят мехури. Започнете да използвате Еразабан веднага след като получите някой от симптомите на херпес, като зачервяване, сърбеж, болка, изтръпване или мравучкане. Продължате да използвате до излекуване на херпеса, обикновено 4-6 дни.

Причината за появя на херпес е херпес симплекс вирусна инфекция. Инфекцията може да настъпи, когато имунната система е отслабена, по време на стрес или по време на менструалния цикъл. Вирусът причинява мехури или рани, главно по устните.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Еразабан

Не използвайте Еразабан

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към докозанол или към някоя от останалите крема, изброени в края на тази листовка (вижте точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки



- Еразабан е предназначен само за прилагане върху кожата. Избягвайте нанасяне на крема в или близо до очите си, тъй като това може да предизвика дразнене. Ако той случайно попадне в очите, ги изплакнете обилно с вода.
- Не използвайте този продукт, ако Ви е казано, че сте имунокомпрометирани (ако е известно, че способността на имунната система да се бори с инфекциозни заболявания е намалена, например вследствие от по-сериозно заболяване, като левкемия или СПИН или ако сте имали трансплантирана на органи). Ако сте имунокомпрометирани и развиете херпес, трябва незабавно да се консултирате с Вашия лекар.
- Не използвайте крема, ако херпесът вече е формирал мехур или рана.

Деца

Деца под 12-годишна възраст не трябва да използват Еразабан.

Други лекарства и Еразабан

Еразабан не трябва да се използва заедно с други продукти за локално приложение (лекарства, козметични продукти, кремове) върху едно и също място на приложение.

Малко вероятно е Еразабан да повлияе или да се влияе от други лекарства, тъй като е предназначен за прилагане върху кожата. Въпреки това не прилагайте други лекарства за лечение на херпес, докато използвате Еразабан.

Попитайте Вашия фармацевт, ако имате никакви въпроси относно това как Еразабан се повлиява от или влияе върху други лекарства.

Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насърко сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

Бременност и кърмене

Еразабан може да се използва по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Еразабан не повлиява способността за шофиране или работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Еразабан

Еразабан съдържа пропиленгликол, който може да предизвика дразнене на кожата.

3. Как да използвате Еразабан

- Възрастни и юноши над 12 години: започнете лечението веднага щом забележите първите симптоми или признания на херпес, например сърбеж, смъдене, парене или мравучкане в засегнатата зона.
- Измийте добре ръцете си преди и след нанасянето на крема, за да се избегне разпространението на инфекцията.
- Нанесете тънък слой внимателно върху целия херпес пет пъти дневно (Продължително на всеки 3 часа по време на будните часове).
- Използвайте върха на пръстите си или, за предпочитане, памучен тампон и избягвайте да докосвате края на тубата, след като сте докосвали херпеса.



- Продължете лечението до пълно излекуване, обикновено между 4 и 6 дни.
- Ако не забележите разлика след 10 дни, трябва да спрете лечението и да се свържете с Вашия лекар.
- Не забравяйте, че Еразабан е Вашето лекарство. Ако дадете тубата на друг, рискувате да предадете инфекцията на други хора.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Еразабан

Не би трявало да възникне сериозен проблем, ако сте използвали голямо количество от крема върху кожата си. Не се налага предприемане на специални мерки.

Ако сте пропуснали да използвате Еразабан

Ако сте пропуснали да използвате Еразабан, използвайте го веднага след като се сетите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За честотата на появя на нежелани реакции, се използват следните изрази: много чести (повече от 1 на 10 потребители), чести (между 1 на 100 потребители и 1 на 10 потребители), нечести (между 1 на 1000 потребители и 1 в 100 потребители), редки (между 1 на 10 000 потребители и 1 на 1000 потребители), много редки (по-малко от 1 на 10 000 потребители).

Проблеми с нервната система:

Много чести: главоболие.

Кожни проблеми:

Чести: нарушения на кожата, включително суха кожа, кожни обриви и подуване на лицето, появяващи се на мястото на приложение на крема.

Ако се появи по-тежка кожна реакция, трябва да прекратите лечението, и ако проблемът не изчезне, свържете се с Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Еразабан



Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Еразабан след срока на годност, отбелзан върху картонената опаковка и тубата с „Годен до: месец/година”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Изхвърлете 6 месеца след първото отваряне на тубата.

Да се съхранява под 25°C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Еразабан

- Активното вещество е докозанол. 1g крем съдържа 100 mg докозанол.
- Другите съставки са захарозен стеарат, леко минерално масло, пропиленгликол, бензилов алкохол, пречистена вода

Как изглежда Еразабан и какво съдържа опаковката

Еразабан е бял крем.

Наличен е в опаковки от 2 g, 2 g с прозрачен предпазен кальф, 5 g и 15 g.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производители

Притежател на разрешението за употреба

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Чешка Република

Производители

Pharmaceutical Works Jelfa S.A.
58-500 Jelenia Gora, 21 Wincentego Pola Street
Полша

Fleet Laboratories Limited
94 Rickmansworth Road, Watford, Hertfordshire WD18 7JJ
Великобритания

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите-членки на ЕИП под следните имена:

Австрия	ERAZABAN 100 mg/g Creme
Белгия	ERAZABAN 100 mg/g Crème
България	ЕРАЗАБАН 10 % крем
Хърватска	ERAZABAN 100 mg/g krema



Чехия	ERAZABAN 10 % Krém
Франция	ERAZABAN 10% crème
Германия	Muxan
Унгария	ERAZABAN 100 mg/g krém
Ирландия	Blistex Cold Sore Cream, 100mg/g Cream
Полша	ERAZABAN 10 % Krem
Португалия	Erazaban 100 mg/g Creme
Румъния	Erazaban 100 mg/g Cremă
Словакия	ERAZABAN 10 % Krém
Словения	ERAZABAN 100 mg/g krema
Испания	ERAZABAN 100 mg/g crema
Швеция	Healip 10% Kräm
Великобритания	Docosanol 10% Cream

Дата на последно преразглеждане на листовката 08/2017

