

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОДОБРено!

ДАТА 6900/09 02/2010

РУ-20100073

Lapozan 5 mg film coated tablets / Лапозан 5 mg филмирани таблетки

Lapozan 10 mg film coated tablets/ Лапозан 10 mg филмирани таблетки

оланзапин / olanzapine

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В гази листовка:

1. Какво представлява Лапозан и за какво се използва
2. Преди да приемете Лапозан
3. Как да приемате Лапозан
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Лапозан
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛАПОЗАН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ЛАПОЗАН принадлежи към групата лекарствени продукти, наречени антидепресанти. ЛАПОЗАН се използва за лечение на заболяване, при което са налице симптоми като чуване, виждане или усещане на несъществуващи обекти, объркане, убеждения,



необичайна подозрителност, затваряне в себе си. Хората с това заболяване може също да се чувстват подтиснати, тревожни или напрегнати.

ЛАПОЗАН може да се използва за лечение на състояния, които протичат със симптоми, като приповдигнато настроение, необичайна енергичност, необходимост от по-малко сън от обикновено, много бърз говор с идващи една след друга идеи и понякога силна раздразнителност. Той също гака стабилизира настроението, като предотвратява появата на водещи до недесспособност повишаване или потиснатост на настроението, свързани с това състояние.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЛАПОЗАН

Не приемайте Лапозан:

- Ако сте свръхчувствителни (алергични) към оланзапин или към някое от помощните вещества на Лапозан. Алергичната реакция може да се разпознае по появата на обрив, сърбеж, оток на лицето, подуване на устните или недосгиг на въздух. Ако го се случи с Вие, обърнете се към Вашия лекар.
- Ако някога Ви е поставена диагноза на заболяване на очите, като например някои видове глаукома (повищено налягане в окото).

Обърнете специално внимание при лечението с Лапозан:

- Лекарства от този тип могат да предизвикат необичайни движения предимно в областта на лицето и езика. Ако това се случи след като сте приемли ЛАПОЗАН, кажете на Вашия лекар.
- Много рядко, лекарства от този тип могат да предизвикат комбинация от температура, учестено дишане, изпотяване, скованост на мускулите и замаяност или съниливост. Ако това се случи, незабавно потърсете Вашия лекар.
- Не се препоръчва употребата на ЛАПОЗАН при пациенти в старческа възраст със слабоумие, тъй като това може да доведе до появата на сериозни нежелани реакции.

Ако страдате от някое от изброените по-долу заболявания, уведомете Вашия лекар
възможно най-бързо:



- Диабет
- Сърдечно заболяване
- Чернодробно или бъбречно заболяване
- Болест на Паркинсон
- Епилепсия
- Проблеми с простатата
- Чревна непроходимост (паралитичен илеус)
- Заболявания на кръвта
- Инсулт или "мини" инсулт

Ако страдате от деменция, Вие или човекът, който се грижи за Вас/Ваш родинца трябва да информира Вашия лекар, ако някога сте имали инсулт или "мини" инсулт.

Како обичайна предпазна мярка, ако сте на възраст над 65 години, Вашето кръвно налягане трябва да се проследява от Вашия лекар.

ЛАПОЗАН не е предназначен за пациенти под 18-годишна възраст.

Прием на други лекарства

Приемайте други лекарства по време на лечението със **ЛАПОЗАН**, само ако Вашият лекар Ви е казал, че това е възможно. Вие можете да почувствате съниливост, ако приемате **ЛАПОЗАН** в комбинация с антидепресанти или лекарства за лечение на тревожност или такива, които Ви помагат да заспите (гранкивилизатори).

Вие трябва да уведомите Вашия лекар, в случай, че приемате флуоксамин (антидепресант), или ципрофлоксацин (антибиотик), тъй като това може да наложи промяна на Вашата доза **ЛАПОЗАН**.

Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или насърко сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa. Непременно предупредете Вашия лекар, ако приемате лекарства за лечение на болестта на Паркинсон.

Прием на Лапозан с храни и напитки



Не пийте алкохол по време на лечението със ЛАПОЗАН, тъй като едновременната употреба на ЛАПОЗАН и алкохол може да Ви кара да се чувствате увесен.

Бременност и кърмене:

Уведомете Вашия лекар, възможно най-скоро, ако сте бременна или мислите, че може да съе бременна. Вие не трябва да приемате това лекарство, ако сте бременна, освен ако не сте го обсъдили с Вашия лекар.

Вие не трябва да приемате това лекарство, докато кърмите, тъй като малко количество от ЛАПОЗАН може да премине в кърмата.

Шофиране и работа с машини

Има опасност от появата на сънливост по време на приема на ЛАПОЗАН. Ако това се случва при Вас не шофирайте и не работете с никаква апаратура или машини.
Уведомете Вашия лекар.

Важна информация относно някои от съставките на Лапозан

ЛАПОЗАН съдържа лактоза. Ако Вашият лекар ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да вземете това лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЛАПОЗАН

Винаги приемайте ЛАПОЗАН точно, както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигури в нещо, почитайте Вашия лекар или фармацевт.

Вашият лекар ще Ви каже колко таблетки ЛАПОЗАН да приемате и колко дълго трябва да ги приемате. Дневната доза на ЛАПОЗАН е между 5 и 20 mg. Консултирайте се с Вашия лекар, ако симитоми Ви се възобновят, но не спирайте приема на ЛАПОЗАН, докато Вашият лекар не Ви посъветва да го направите.

Вие трябва да приемате ЛАПОЗАН веднъж дневно, следвайки препоръки на Вашия лекар. Опитвайте се да вземате таблетките по едно и също време, всяка денонощия, като значите дали приемате таблетките преди, по време на или след хранене. При приема погълнете таблетките ЛАПОЗАН цели с вода.



Ако сте приели повече от необходимата доза Лапозан

При пациентите, приели повече от необходимото количество ЛАПОЗАН се наблюдават следните симптоми: участена сърдечна дейност, възбуда/агресивност, проблеми с говора, необичайни движения (особено на лицето или езика) и различна степен на нарушение на съзнанието. Други симптоми може да бъдат: внезапна обърканост, принадък (епилепсия), кома, комбинация от треска, участено дишане, изпотяване, мускулна скованост и замаяност или съниливост, забавяне на сърдечната честота, аспирация, повищено или понижено кръвно налягане, нарушен сърден ритъм. Веднага потърсете Вашия лекар или незабавно отидете в най-близкото болнично заведение. Покажете на лекаря опаковката на Вашите таблетки.

Ако сте пропуснали да приемете Лапозан

Вземете таблетките веднага щом се сетите. Не приемайте две дози в един ден.

Ако сте спрели приема на Лапозан

Не спирайте лечението с таблетките само защото сте се почувствали по-добре. Важно е да продължите да приемате ЛАПОЗАН толкова дълго, колкото Ви е препоръчал Вашия лекар.

Ако внезапно спрете да приемате ЛАПОЗАН, може да се наблюдават признания като например изпотяване, невъзможност да заспите, трепор, тревожност или гадене и повръщане. Вашият лекар може да Ви предложи да намалите дозата постепенно, преди да спрете лечението.

Ако имате никакви допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитай ге Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ



Както всички лекарства, ЛАПОЗАН може да доведе до появата на нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много чести нежелани реакции: засягат 1 пациент на 10

- Наддаване на тегло.
- Съниливост.
- Повишение на нивото на пролактин в кръвта.

Чести нежелани реакции: засягат 1 до 10 пациенти на 100

- Промени в броя на някои кръвни клетки и нивата на лициди в кръвта.
- Повишение на нивото на захар в кръвта и появата ѝ в урината.
- Засилено чувство на глад.
- Замаяност.
- Безпокойство.
- Тремор.
- Мускулна скованост или спазъм (включително движения на очите).
- Проблеми с говора.
- Необычайни движения (особено на лицето или езика).
- Запек.
- Сухота в устата.
- Обрив.
- Загуба на сила.
- Необычайна умора.
- Задържане на вода, водещо до отичане на ръцете, глезените или на краката.
- В началото на лечението някои хора могат да почувстват замаяност или слабост (със забавяне на сърдечната честота), особено при изправяне от легнало или седнало положение. Това обикновено преминава от само себе си, но ако това не стане, уведомете Вашия лекар.

Нечести нежелани реакции: засягат 1 до 10 пациенти на 1 000

- Забавена сърдечна дейност.
- Чувствителност към слънчева светлина.



- Косопад.

Редки нежелани реакции: засягат 1 до 10 пациенти на 10 000

- Уголемяване на гърдите при мъже или жени.

Други възможни нежелани реакции: честотата не може да бъде оценена от наличните данни.

- Алергична реакция (например оток на устата и гърлото, сърбеж, обрив).
- Поява на диабет или влошаване на диабета, понякога свързано с кетоацидоза (кетони в кръвта и урината) или кома.
- Понижаване на нормалната телесна температура.
- Гърчове, обикновено свързани с данни за предходни епилептични пристъпи (епилепсия).
- Комбинация от температура, учестено дишане, изпотяване, мускулна скованост и унесеност или сънливост.
- Спазми на очните мускули, причиняващи кръгови движения на очите.
- Нарушения на сърдечния ритъм.
- Внезапна необяснима смърт.
- Образуване на кръвни съсиреци, запушващи дълбоките венозни съдове на краката или на белия дроб.
- Възпаление на задстомашната жлеза, причиняващо сирина коремна болка, температура и повръщане.
- Чернодробно заболяване, проявяващо се като пожълтяване на кожата и на бялата част на очите.
- Мускулно заболяване, проявяващо се с необяснима болка.
- Затруднено уриниране.
- Продължителна и/или болезнена ерекция.

Докато приемат оланзапин, пациентите в старческа възраст със слабоумие могат да получат инсулт, пневмония, нездържане на урина, надания, силно виждане на несъществуващи обекти, повишаване на температурата, залепват на кожата и да имат проблеми с походката. В тази специфична група пациенти имат съобщения и за няколко случая с фатален изход.



При пациенти с болестта на Паркинсон, ЛАПОЗАН може да доведе до влошаване на симптомите.

Рядко, при жени, приемащи лекарствени продукти от този тип за продължителен период от време, е наблюдавано отделянето на мляко от гърдите и периоди без менструация или нередовен менструален цикъл. Ако това продължава, уведомете Вашия лекар.

Много рядко при кърмачета, родени от майки, които са приемали ЛАПОЗАН в края на бременността (3-ти тримесец) може да се наблюдава треперене, сънливост или увеселеност.

Ако някой от нежеланите лекарствени ефекти стане сериозен, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани ефекти, моля уведомете Вашия лекар.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛАПОЗАН

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ЛАПОЗАН след изтичане срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Да се съхранява под 30° C.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите вече ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Лапозан

- Активната съставка е оланzapин (*olanzapine*). Всяка филмирани таблетка съдържа 5 или 10 mg оланзапин.
- Другите съставки са:



- Сърцевина на таблетката: лактозаmonoхидрат, царевично нишесте, хидроксипропилцелулоза, магнезиев стеарат.
- Покритие на таблетката: хипромелоза и титанов диоксид (E171).

- В допълнение, различните концентрации Лапозан филмирани таблетки съдържат и следни ге помощни вещества:

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ТАБЛЕТКАТА

Лапозан 5 mg и 10 mg

филмирани таблетки

ДРУГИ ПОМОЩНИ ВЕЩЕСТВА

(покритие на таблетката) Лактоза
монохидрат, Триацетин, Макрогол
3000

Как изглежда Лапозан и какво съдържа опаковката

Лапозан 5 mg и 10 mg филмирани таблетки са: бели, кръгли, без надпис от двете страни.

Лапозан 5 mg и 10 mg филмирани таблетки са налични в картонени кутии с 7, 14, 20, 28, 30, 35, 50, 56 или 70 таблетки в блистерни опаковки (трипластово Al /Al фолио).
Не всички видови опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:

Medochemie Ltd

1-10 Constantinoupoleos str,

P.O. Box 51409, Limassol,

CY 3505

Кипър

Производител:

Medochemie Ltd. – Factory AZ

Mich. Erakleous str., Ag. Athanasios, Industrial Area, Limassol, Кипър



Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните членки на ЕИО под следните имена:

Германия: Lapozan 2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg, 15mg Filmtabletten

Кипър: Lapozan 2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg, 15mg film coated tablets

Чешка Република: Lapozan 5mg, 10mg potahované tablety

Гърция: Lapozan 5mg, 10mg, 15mg film coated tablets

Литва: Lapozan 5mg, 10mg plėvele dengtos tabletės

Румъния: Lapozan 5mg, 10mg, 15mg comprimate filmate

Словашка Република: Lapozan 5mg, 10mg filmom obalené tablety

Латвия: Lapozan 5mg, 10mg apvalkotās tabletes

Дата на последно одобрение на листовката: 3 август 2009 година

