

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечението с Габитрил. Ако имате някакви въпроси се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

ГАБИТРИЛ

5 mg филмирани таблетки
10 mg филмирани таблетки
15 mg филмирани таблетки

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 3539 / ЛВ: М. 08
Одобрено: 26 / 11.11.08

Активно вещество: тиагабин (като хидрохлорид монохидрат) (tiagabine hydrochloride monohydrate)

ЗА ТАБЛЕТКИТЕ ГАБИТРИЛ

Какво съдържат таблетките Габитрил ?

Активното вещество на Габитрил е тиагабин (под форма на хидрохлорид монохидрат).
Таблетките Габитрил съдържат също помощни вещества: микрокристална целулоза (Е 460), аскорбинова киселина (Е 300), безводна лактоза, прежелатинизирано царевично нишесте, кросповидон, колоиден безводен силиций (Е 551), хидрогенирана растителна мазнина, стеаринова киселина, магнезиев стеарат, хипромелоза, хидроксипропилцелулоза (Е 463) и титанов диоксид (Е171).

Как изглеждат таблетките Габитрил?

Таблетките Габитрил 5 mg са бели, овални и маркирани с 251 от едната страна.
Таблетките Габитрил 10 mg са бели, овални и маркирани с 252 от едната страна.
Таблетките Габитрил 15 mg са бели, овални и маркирани с 253 от едната страна.

Всяка опаковка съдържа шишенце от 50 таблетки. Във всяка опаковка се съдържа малък контейнер с ексикаторен агент (подсушаващо вещество), който не трябва да се поглъща.

КОЙ ПРОИЗВЕЖДА ГАБИТРИЛ ?

Притежател на разрешението за употреба:

Torrex Chiesi Pharma GmbH
Gonzagagasse 16/16
1010 Vienna, Австрия

Производител:

Torrex Chiesi Pharma GmbH
Gonzagagasse 16/16
1010 Vienna, Австрия

ЗА КАКВО СЕ ПРЕДПИСВА ГАБИТРИЛ ?

Габитрил е антиепилептично лекарство, което се използва за лечение на парциални припадъци. Той повишава мозъчните нива на вещество, което помага за намаляване или предотвратяване на припадъците.

ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ ТАБЛЕТКИТЕ ГАБИТРИЛ

Дали Габитрил е подходящото за мен лекарство?

Преди да вземете таблетките Габитрил Вие трябва да предупредите Вашия лекар ако:

- имате свръхчувствителност към някое от помощните вещества в Габитрил (напр. към лактоза);
- сте бременна или планирате бременност;



- кърмите;
- страдате от чернодробно заболяване.

Мога ли да използвам Габитрил ако приемам други лекарства?

Габитрил може да бъде използван с други лекарства, включително антиепилептични лекарства и перорални контрацептиви. Независимо от това е важно да предупредите Вашия лекар, ако приемате или планирате да вземате други лекарства.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Ако усещате виене на свят или умора, докато приемате Габитрил е особено важно да не изпълнявате операции, които изискват повишено внимание, като напр. шофиране или работа с машини.

Обърнете специално внимание

Малка част от хората, лекувани с антиепилептици като тиагабин, активното вещество на Габитрил, са имали мисли за самонараняване или самоубийство. Ако се появят такива незабавно се обърнете към Вашия лекар.

КОГАТО ПРИЕМАТЕ ТАБЛЕТКИТЕ ГАБИТРИЛ

- Приемайте лекарството точно, както Вашият лекар и фармацевт са Ви посъветвали.
- Предписанието върху опаковката ще Ви посочи точно колко таблетки и колко често да ги вземете. Ако указанието не е ясно и имате някакви съмнения, моля посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.
- Таблетките се приемат по време на хранене и се поглъщат с вода.
- Вашият лекар ще прецени каква е точната за Вас дозировка.
- Дозата ще бъде повишавана постепенно, до постигане на контрол върху епилепсията. Обикновено това се постига с дози от 30 – 45 mg/ дневно, разделени в 3 дози/ дневно.

Какво би могло да се получи, ако приема повече таблетки?

Ако приемете много повече от предписаните Ви таблетки, моля обърнете се към Вашия лекар.

Какво да направя ако забравя да взема таблетките Габитрил?

Ако сте забравили да вземете една доза, вземете обичайната доза още в момента, когато осъзнаете този факт, но ако това е непосредствено преди следващия прием, не дублирайте дозата. По-нататък продължете както обикновено.

Колко продължително е необходимо да приемам Габитрил ?

Габитрил е предназначен за продължително лечение, затова Вие трябва да го приемате толкова време, колкото е препоръчал Вашият лекар. Не спирайте приема на лекарството преди да се посъветвате с Вашия лекар. Ако Вашият лекар прецени, че нямате повече нужда от Габитрил, дозата Ви ще бъде намалена бавно и постепенно за период от 2 – 3 седмици.

КАКВИ НЕЖЕЛАНИИ ЕФЕКТИ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ГАБИТРИЛ

При някои пациенти, особено през първите месеци от лечението, Габитрил може да причини някои нежелани ефекти. Най-често срежаните нежелани ефекти са:

- Чувство за замайване и нестабилност
- Чувство на умора или сънливост
- Безпричинна нервност

Други нежелани ефекти включват тремор, диария, затруднения в концентрацията, потиснато настроение, емоционална лабилност, забавен говор и риск от възстановяване на сериозни поведенчески проблеми.



Някои пациенти могат да изпитват други нежелани ефекти, като зрителни нарушения или поява на кръвонасядания.

ИНФОРМИРАЙТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ЗА ВСЕКИ НЕЖЕЛАН ЕФЕКТ, ПРИЧИНЯВАЩ ДИСКОМФОРТ, НЕСПОМЕНАТ В ТАЗИ ЛИСТОВКА.

ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- Не предлагайте вашето лекарство на никой друг, дори да Ви се струва, че има същите като Вашите симптоми.
- Не използвайте лекарството след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.
- Не използвайте таблетките, ако отбележите промена във външния им вид (например промени в цвета на таблетките).

СЪХРАНЕНИЕ НА ТАБЛЕТКИТЕ ГАБИТРИЛ

- Пазете лекарството на място, недостъпно за деца.
- Да не се охлажда (между 2 – 8⁰ С) и да не се замразява.
- Да се съхранява в оригинална опаковка. Да не се отстранява подсушаващия контейнер от шишенцето. Да не се поглъща подсушаващото вещество.
- Моля, върнете всички неизползвани таблетки във Вашата аптека.

Срок на годност

3 години

Дата на последна актуализация на текста:

Януари, 2005 г.

