

50 ml e

ANTIMYCO-BETA CHEMAX PHARMA
5 g/100 g+ 1 g/100 g cutaneous solution
Salicylic acid / 2-Naphthol

АНТИМИКО-БЕТА ХИМАКС ФАРМА
5 g/100 g+ 1 g/100 g

Дермален разтвор

**Салицилова киселина/
2-нафтол**

ХИМАКС



ФАРМА

Състав за 100 g: Салицилова киселина 5 g, 2-нафтол 1 g и помощни вещества етанол, глицерол, пречистена вода и ацетон.

Режим на отпускане: Без лекарско предписание. Прилага се външно с помощта на подходящ тампон. Да не се прилага при деца под 6 години, бременност и кърмене.

Показания: Съпътстваща терапия при лечение на дерматомикози на гладката кожа и окосмената част на главата; интердигитална и ингвинална епидермофития. Засегнатото място се намазва 1-2 пъти дневно. Да се употребява средно 10 дни (7-14 дни).

Противопоказания: Свръхчувствителност към някоя от съставките.

Предупреждения: Да не се прилага върху големи участъци от кожата, лигавици, открити рани и под оклузивна превръзка! Да се пазят очите! Да не се прилага при болни с бъбречна недостатъчност! Да се прилага с особено внимание при деца, пациенти с нарушения на периферното кръвообращение или с Diabetes melitus! Съдържа Етанол (32% об./об.) **Запалим продукт!**
Лекарствени взаимодействия: Да не се прилага съвместно с етерични масла, амонячни разтвори и живачни съединения. Терапевтичният ефект се намалява при използване на алкални сапуни и шампоани. Възможна е поява на алергични реакции, дерматити, разязвяване на кожата, а много рядко може интоксикация.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца! Да се съхранява под 25°C.

Съхранявайте опаковката плътно затворена. Да се пази от светлина и влага.

Срок на годност след отваряне на опаковката: Четири месеца.

Регистрационен № 20000012



Парт. №

Притежател на разрешението за употреба:

Годен до:

**„Химакс Фарма“ ЕООД, България
1618 София, ул. „Горица“ № 8А**

