

**Б. ЛИСТОВКА**

Листовка: информация за пациентта

20040693

Коринкер 20 mg таблетки с удължено освобождаване

Korincare 20 mg prolonged-release tablets

18.02.2021

B6154416-53488

нифедипин  
nifedipine

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате никакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признанияте на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите никакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

#### **Какво съдържа тази листовка**

1. Какво представлява Коринкер и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Коринкер
3. Как да приемате Коринкер
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Коринкер
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### **1. Какво представлява Коринкер и за какво се използва**

Коринкер съдържа нифедипин, който принадлежи към групата лекарства, наречени *калиеви антагонисти*.

Коринкер се използва за лечение на високо кръвно налягане или стенокардия (болка в гърдите).

*При високо кръвно налягане:* Коринкер действа, като отпуска и разширява кръвоносните съдове. Това позволява на кръвта да се движи по-лесно и намалява кръвното налягане. Понижаването на кръвното налягане намалява натоварването на Вашето сърце.

*При стенокардия:* Коринкер действа, като отпуска и разширява кръвоносните съдове на сърцето. Това позволява повече кръв и кислород да достигнат до сърцето и намалява натоварването му. Пристигите на стенокардия са по-леки и по-редки, ако натоварването на сърцето е по-малко.

#### **2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Коринкер**

##### **Не приемайте Коринкер**

- ако сте прекали сърден инфаркт в рамките на последния месец;
- ако почувствате внезапен пристъп на стенокардия. Коринкер не може бързо да облекчи симптомите на стенокардия;
- ако имате нестабилна стенокардия (болка в гърдите);



- ако сте алергични към нифедипин, други подобни лекарства (дихидропиридини) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако приемате рифампицин (антибиотик);
- ако имате чернодробно заболяване, което пречи на черния Ви дроб да работи правилно;
- ако имате възпаление на червата или болест на Крон;
- ако имате запушване или стесняване в червата, или сте имали токова в минало;
- ако някога сте имали запушване на хранопровода (хранопровода-тръбата, която свързва гърлото със стомаха);
- при високостепенна аортна стеноза (стеснение на аортната клапа);
- ако някога сте имали колапс причинен от сърдечен/съдов проблем (сърдечно-съдов шок), по време на който не Ви достига въздух, пребледнявате, избива Ви студена пот и имате сухота в устата;
- ако имате джоб „Kock“ (хирургично изграден чревен резервоар с отвор през коремната стена) в червата;
- ако кръвното Ви налягане продължава да се повишава, въпреки лечението (малигнена хипертония);

#### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашния лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Коринкер.

Особено внимателен медицински контрол е необходим:

- ако имате ниско кръвно налягане и Ви е предписан Коринкер за лечение на стенокардия. Вашето кръвно налягане може допълнително да се понижи от това лекарство;
- ако имате сърдечна слабост, която не може да бъде адекватно лекувана (декомпенсирана сърдечна недостатъчност);
- ако сте бременна;
- ако кърмите. Ако се налага да приемате Коринкер, Вие трябва да спрете да кърмите преди да започнете да приемате това лекарство.
- ако сте диабетик. Възможно е лечението на Вашия диабет да бъде коригирано;
- ако сте на диализа и имате високо кръвно налягане и намален циркулаторен кръвен обем (хиповолемия), Коринкер може да причини внезапно понижаване на кръвното налягане;
- Вашият черен дроб не функционира правилно, Вашият лекар може да Ви направи кръвни изследвания. Може да Ви предпишат по-ниска доза Коринкер.

Иформирайте Вашия лекар, преди да приемете следващата доза Коринкер, ако:

- болката в гърдите Ви се влошава или се появява по-често, или по-тежко след период от няколко часа или дни. Вашият лекар може да Ви посъветва да не приемате Коринкер.
- имате болка в гърдите след прием на първата доза Коринкер. Вашият лекар може да реши да промени лечението;
- забележите, че задухът Ви се задълбочава;
- забележите подуване на глезните.

Също така кажете на Вашия лекар:

- ако ви предстои изследване на урината. Нифедипин може да повлияе на резултатите от някои изследвания на урината;
- ако ви предстои изследване с бариев рентгенов контраст (бариева каша). Тези таблетки могат да повлият на резултатите от изследването.
- ако сте мъж с неколократни неуспешни опити да станете баща чрез *in vitro* оплождане. Доказано, е че лекарства като Коринкер влошават функцията на сперматозоидите.

#### **Други лекарства и Коринкер**

Иформирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, насърко сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.



Ефектът от лечението може да се повлияе от следните активни вещества или групи лекарства, приемани едновременно с Коринкер. Информирайте Вашия лекар, ако приемате:

- други лекарства за понижаване на високо кръвно налягане;
- рифампицин (антибиотик);
- циметидин (за лечение на язва на стомаха);
- дигоксин, дилтиазем, хлоридин или бета-блокери (за лечение на сърдечни заболявания);
- квинупристин/далфопристин (комбиниран антибиотик);
- фенитоин, карбамазепин или валпроева киселина (за лечение на епилепсия);
- цизаприл (за лечение на смущения в перисталтиката на хранопровода и стомаха);
- еритромицин (антибиотик);
- магнезиев сулфат, приложен инжекционно по време на бременност (може да предизвика спадане на кръвното налягане);
- кетоконазол, итраконазол или флуконазол (противогъбични лекарства);
- индинавир, нелфинавир, ритонавир, саквинавир или ампренавир (за лечение на HIV инфекции);
- флуоксетин или нефазодон (за лечение на депресия);
- таクロлimus (за профилактика на отхвърляне на трансплантирани органи);
- фенобарбитал (обикновено се използва за лечение на безсъние или тревожност).

#### **Коринкер с храна, напитки и алкохол**

Можете да приемате Коринкер със или без храна.

Не започвайте приема на Коринкер най-малко 3 дни след като сте пили сок от грейпфрут или сте яли грейпфрут. Кажете на Вашия лекар, ако сте яли грейпфрут или сте пили сок от грейпфрут през този период. Не пийте сок от грейпфрут и не яжте грейпфрут, докато приемате Коринкер. Сокът от грейпфрут може да доведе до повишаване нивата на нифедипин в кръвта. Този ефект може да продължи най-малко 3 дни след приема на грейпфрут.

#### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Може да използвате Коринкер само след консултация с Вашия лекар.

#### **Кърмене**

Вие не трябва да приемате Коринкер по време на кърмене. Ако Вашият лекар прецени, че лечението е абсолютно необходимо, то кърменето трябва да се преустанови, преди да започнете приема на Коринкер.

#### **Фертилитет**

Ако сте мъж, който не е могъл да стане баща чрез оплождане *in vitro*, имайте предвид, че лекарствата като Коринкер могат да увредят функцията на сперматозоидите.


#### **Шофиране и работа с машини**

Лечението с Коринкер може да Ви накара да се почувстввате замаяни, слаби, много уморени или да причини зрителни смущения. Не шофирайте и не работете с машини, ако сте повлияни по този начин. Това важи особено в началото на лечението, при смяна на лекарствения продукт, както и при едновременната употреба на алкохол.

### **3. Как да приемате Коринкер**

Винаги приемайте Коринкер точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

**Високо кръвно налягане:** Началната доза е 1 таблетка (20 mg) веднъж дневно.



**Стабилна стенокардия:** Дозировката се определя строго индивидуално, и лекуващия Ви лекар ще определи подходящата за Вас доза.

Продължителността на лечението се определя от лекуващия лекар.

**Кога и как трябва да приемате Коринкер**

Таблетките трябва да се погълнат цели (като при никакви обстоятелства не трябва да се дъвчат или чупят), с чаша вода, със или без храна. Не приемайте Коринкер със сок от грейпфрут. Приемайте дозата по едно и също време всеки ден, за предпочтение сутрин.

**Употреба при деца и юноши**

Употребата на Коринкер при деца и юноши под 18 год. не е препоръчителна, поради недостатъчните данни за безопасността и ефикасността при тази възрастова група.

**Ако сте приемали повече от необходимата доза Коринкер**

Потърсете незабавно лекарска помощ. Ако е възможно, вземете със себе си таблетките или кутията, за да ги покажете на лекаря.

Приемането на големи количества Коринкер може да доведе до рязко спадане на кръвното налягане, ускорен или забавен сърден ритъм. Това също така може да предизвика повишаване нивото на кръвната захар или повишаване киселинността на кръвта, натрупване на течност в белите дробове, ниски нива на кислород в кръвта и замъгяване на съзнанието, с възможно изпадане в безсъзнание.

**Ако сте пропуснали да приемате Коринкер**

Приемете незабавно забравената доза Коринкер, като се придържате към Вашата схема на дозиране, изчаквайки най-малко 12 часа, преди да приемате следващата доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако се колебаете, обърнете се за съвет към Вашия лекар.

**Ако сте спрели приема на Коринкер**

Не спирайте приема на Коринкер преди Вашия лекар да Ви каже, дори и да се чувствате по-добре.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте Вашия лекар.

#### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Свържете се незабавно с Вашия лекар и не приемайте следващата доза Коринкер, ако забележите следните симптоми, които може да са признания на тежка нежелана реакция:

- тежка, внезапна, генерализирана алергична реакция, която в редки случаи включва алергичен шок (напр. затруднено дишане, понижение на кръвното налягане, учестен пулс), оток (включително животозастрашаващ оток на дихателните пътища);
- други алергични реакции, изразявачи се в оток на подкожната тъкан (потенциално тежък и включващ оток на ларингса, който може да бъде фатален);
- ускорен сърден ритъм (тахикардия);
- задух (с неизвестна честота) или затруднено дишане;
- леки до умерени алергични реакции;
- сърбеж (в някои случаи тежък), обрив или уртикария (копривна треска).



Свържете се незабавно с Вашия лекар, преди да продължите лечението с Коринкер, защото това може да са първите признания на тежка алергична реакция:

- кожна реакция или появя на мехури/лющене на кожата и/или лигавиците (в устата/носа или по половите органи) (токсична епидермална некролиза).

Освен горепосочените нежелани реакции, по-долу е даден списък с възможни нежелани реакции, изброени според тяхната честота:

*Чести* (могат да засегнат до 1 на 10 души);

*Нечести* (могат да засегнат до 1 на 100 души);

*Редки* (Могат да засегнат до 1 на 1 000 души);

*С неизвестна честота* (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

*Чести нежелани реакции:*

- главоболие;
- зачевряване;
- усещане за общо неразположение;
- запек;
- подуване, особено на глезните и краката.

*Нечести нежелани реакции:*

- коремна болка;
- неспецифична болка;
- втискане;
- понижаване на кръвното налягане при изправяне (симптомите включват слабост, световъртеж, замаяност, слабо главоболие, сърдебиене, замъглено зрение и понякога обърканост);
- припадък;
- неправилен сърден ритъм (*сърдебиене*);
- сухота в устата;
- нарушен храносмилане;
- газове (*метеоризъм*);
- гадене;
- мускулни крампи (спазми);
- подуване на ставите;
- нарушения на съня;
- беспокойство или нервност;
- зачевряване на кожата;
- кръвотечение от носа;
- назална конгестия;
- световъртеж;
- мигрена;
- замаяност;
- треперене;
- чести позиви за уриниране;
- болезнено или трудно уриниране;
- импотентност;
- замъглено зрение;
- преходно повишаване на чернодробни ензими.

*Редки нежелани реакции:*

- изтръпване/мравучкане;
- възпаление, подуване или кървене на венците.



*Нежелани реакции с неизвестна честота:*

- стомашна болка или дистрес причинени от чужда маса намерена в стомаха, което може да изисква оперативно отстраняване;
- затруднено преглъщане;
- коремна болка, причинена от запушване на червата или язва на стомаха;
- повръщане;
- намаляване на броя на белите кръвни клетки (левкопения);
- силно намаляване на броя на определени бели кръвни клетки (агранулоцитоза);
- повищена кръвна захар (хипергликемия);
- понижена кожна сетивност (хипоестезия);
- сънливост;
- болка в окото;
- болка в гърдите (стенокардия);
- киселини или лошо храносмилане (гастроезофагиална сфинктерна недостатъчност);
- пожълтяване на бялото на очите или кожата (жълтеница);
- повищена чувствителност към светлина (фоточувствителна алергична реакция);
- малки кръвоизливи по кожата (пурпура);
- болка в ставите;
- болка в мускулите.

Всички тези симптоми обикновено изчезват, след прекратяване на лечението с Коринкер.

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата  
ул. „Дамян Груев“ № 8  
1303 София  
Тел.: +359 2 8903417  
Уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

**5. Как да съхранявате Коринкер**

Да се съхранява под 25° С, на защитено от светлина и влага място.  
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.  
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.  
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.  
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

**6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**



**Какво съдържа Коринкер**

- Активното вещество е: нифедипин 20 mg.
- Другите съставки са:

**Във вътрешността:** микрокристална целулоза, натриев нишестен гликонат, манитол, натриев лаурил сулфат, силициев диоксид, колоиден, безводен, повидон (тип K), магнезиев стеарат, хидроксиметилцелулоза, макрогол 6000, макрогол 400, железен оксид червен (Е 172), титанов диоксид (Е 171), талк.

**Как изглежда Коринкер и какво съдържа опаковката:**

Всяка опаковка Коринкер съдържа 20 таблетки нифедипин 20 mg с удължено освобождаване, поставени в 2 блистера (Alu/Alu) x 10 таблетки.

**Притежател на разрешението за употреба и производител**

“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

бул.”Г. М. Димитров” № 1, София 1172,

България

тел: 02/ 962 54 54

факс: 02/ 960 37 03

e-mail: [info@tchaikapharma.com](mailto:info@tchaikapharma.com)

**Дата на последно преразглеждане на листовката февруари 2021.**

