

Листовка: информация за потребителя

ТАНАКАН 40 mg филмирани таблетки
TANAKAN 40 mg film-coated tablets
Суш стандартизиран екстракт от листа на Гинко
Ginkgo folium extractum siccum normatum (EGb 761)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява ТАНАКАН 40 mg и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ТАНАКАН 40 mg
3. Как да приемате ТАНАКАН 40 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ТАНАКАН 40 mg
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ТАНАКАН и за какво се използва

ТАНАКАН 40 mg се предписва за:

- Симптоматично лечение на нарушение в концентрацията и паметта при възрастни пациенти с изключение на потвърдена деменция, болест на Паркинсон и вторични когнитивни нарушения в следствие на депресия, съдово или метаболитно заболяване, или медикаментозно лечение.
 - Допълнително лечение на вертиго (чувство за замайване или световъртеж) от вестибуларен произход в допълнение към вестибуларната рехабилитация.
 - Симптоматично лечение на тинитус (шум в ушите).

2. Какво трябва да знаете преди да приемете ТАНАКАН

Не приемайте ТАНАКАН

Ако сте алергични към екстракта от листа на Гинко билоба или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

- Ако приемате други лекарства моля прочетете и раздела "Други лекарства и ТАНАКАН"

Други лекарства и ТАНАКАН

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. ТАНАКАН може да повлияе действието на някои други лекарства.

Примери за лекарства, които могат да засегнат действието на ТАНАКАН, са:

- Алфентанил и фентанил (опиоидни лекарства за облекчение на болка)
- Циклоспорин, сиролимус и такролимус (лекарства за потискане на имунната система)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТ	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	2001053
Разрешение №	
ВГ/МА/МР -	71372 09-03-2026
Одобрение №	



- Дихидроерготамин и ерготамин (алкалоиди на моравото рогче, използвани за лечение на мигрена)
- Пимозид (използван за лечение на психични заболявания)
- Хинидин (използван за лечение на нарушения на сърдечния ритъм)

Все пак имайте предвид, че този списък не е изчерпателен.

ТАНАКАН с храна, напитки и алкохол

ТАНАКАН се приема по време на хранене.

Бременност, кърмене и фертилитет

Трябва да избягвате да приемате ТАНАКАН, ако сте бременна или кърмите. Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна, планирате бременност или кърмите, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Някои хора могат да почувстват замаяност след използването на ТАНАКАН. Ако това Ви се случи, не шофирайте и не използвайте машини.

Важна информация относно някои от съставките на ТАНАКАН

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) за една таблетка, което по същество означава, че не съдържа натрий.

3. Как да приемате ТАНАКАН

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

3 таблетки дневно, разпределени през деня.

Таблетките трябва да се приемат с половин чаша вода по време на хранене.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Резюме на профила на безопасност

Най-честите нежелани реакции са: коремна болка, диария и виене на свят.

Ако получите тежка алергична реакция (ангиоедем), която причинява подуване на лицето, устните, езика или гърлото, спрете незабавно приема на това лекарство и потърсете спешна медицинска помощ.

Други възможни нежелани реакции:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

- алергична реакция;
- затруднено дишане;
- главоболие;



- припадък;
- лошо храносмилане;
- гадене;
- екзема;
- сърбеж.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

- копривна треска;
- обрив.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване

Изпълнителната агенция по лекарствата

ул. "Дамян Груев" № 8

1303 София

тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ТАНАКАН

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за защита от светлина и влага.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите видими белези на нарушаване на целостта на блистера.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ТАНАКАН

- Активното вещество е: **сух стандартизиран екстракт от листа на Гинко (Ginkgo biloba L.) (EGb 761)**
- Другите съставки са: таблетно ядро - микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат; обвивка - макрогол 6 000, хипромелоза, червен железен диоксид.

Как изглежда ТАНАКАН и какво съдържа опаковката

Кръгли, двойноизпъкнали червено-кафяви филмирани таблетки в блистер от алуминий – PVC или алуминий-PVC-PVdC, съдържащ 15 таблетки. Всяка картонена кутия съдържа 30 или 90 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

MAYOLY PHARMA FRANCE, 3 Place Renault, 92500 Rueil-Malmaison, ФРАНЦИЯ



Производител, освободил партидата, за страната от която е внесен лекарствения продукт:
MAYOLY INDUSTRIE, 20 Rue Ethe Virton, 28100 Dreux, Франция

Притежател на разрешението за паралелен внос:
“Беста Мед” ЕООД, ул. “Кънчо Скорчев” №8, 5350 Трявна, България

Производител, отговорен за преупаковане и освобождаването на партиди след преупаковане:
“Адисан Фарма” ЕООД, ул. „Недялка Шилева” № 31, 4023 Пловдив, България
“Беста Фармасютикълс” ЕООД, бул. “Цариградско шосе” №425, Сграда 1, район Панчарево, София, България

Дата на последно преразглеждане на листовката: 08/2025

